



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. 3848 της 30ής ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2004
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ Ι

Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

Αριθμός 357

**ΟΙ ΠΕΡΙ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ
(ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΣ)
ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1993 ΕΩΣ 2002 ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ
(ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2001**

Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 30

Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής
Ένωσης με τίτλο-

«Οδηγία 1998/67/ΕΚ της Επιτροπής της 7/9/1998
Οδηγία 1998/64/ΕΚ της Επιτροπής της 19/9/1998
Οδηγία 1998/88/ΕΚ της Επιτροπής της 13/11/1998
Οδηγία 1999/27/ΕΚ της Επιτροπής της 6/5/1999
Οδηγία 1999/76/ΕΚ της Επιτροπής της 6/8/1999
Οδηγία 1999/79/ΕΚ της Επιτροπής της 7/8/2000
Οδηγία 2000/45/ΕΚ της Επιτροπής της 13/7/2000
Κανονισμός της Επιτροπής 2200/2001/ΕΚ της 17/10/2001
Κανονισμός της Επιτροπής 2205/2001/ΕΚ της 14/11/2001
Κανονισμός της Επιτροπής 2380/2001/ΕΚ της 5/12/2001
Κανονισμός της Επιτροπής 256/2002/ΕΚ της 12/2/2002
Οδηγία 2002/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της
7/5/2002

Κανονισμός της Επιτροπής 1041/2002/ΕΚ της 14/6/2002
 Κανονισμός της Επιτροπής 1252/2002/ΕΚ της 11/7/2002
 Οδηγία 2002/70/ΕΚ της Επιτροπής της 6/8/2002
 Κανονισμός της Επιτροπής 1876/2002/ΕΚ της 21/10/2002
 Κανονισμός της Επιτροπής 2188/2002/ΕΚ της 9/12/2002
 Οδηγία 2003/7/ΕΚ της Επιτροπής της 24/1/2003
 Κανονισμός της Επιτροπής 162/2003/ΕΚ της 30/1/2003
 Κανονισμός της Επιτροπής 261/2003/ΕΚ της 12/2/2003
 Κανονισμός της Επιτροπής 316/2003/ΕΚ της 19/2/2003
 Κανονισμός της Επιτροπής 355/2003/ΕΚ της 20/2/2003
 Κανονισμός της Επιτροπής 666/2003/ΕΚ της 11/4/2003
 Κανονισμός της Επιτροπής 668/2003/ΕΚ της 11/4/2003
 Κανονισμός της Επιτροπής 676/2003/ΕΚ της 14/4/2003
 Κανονισμός της Επιτροπής 871/2003/ΕΚ της 20/5/2003
 Κανονισμός της Επιτροπής 877/2003/ΕΚ της 21/5/2003
 Κανονισμός της Επιτροπής 1334/2003/ΕΚ της 25/7/2003
 Κανονισμός της Επιτροπής 1801/2003/ΕΚ της 14/10/2003
 Κανονισμός της Επιτροπής 1847/2003/ΕΚ της 20/10/2003
 Κανονισμός της Επιτροπής 1852/2003/ΕΚ της 21/10/2003
 Κανονισμός της Επιτροπής 2112/2003/ΕΚ της 1/12/2003
 Κανονισμός της Επιτροπής 2154/2003/ΕΚ της 10/12/2003».

13(I) του 1993
 34(I) του 2001
 53(I) του 2002
 Επίσημη
 Εφημερίδα
 Παράρτημα
 Τρίτο (I)
 19.3.2001

Ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει το άρθρο 30, των Περί Ζωοτροφών και Προσθετικών των Ζωοτροφών (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Χρήσεως) Νόμων του 1993 έως 2002 και ο Κανονισμός 39 των Περί Ζωοτροφών και Προσθετικών των Ζωοτροφών (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Χρήσεως) Κανονισμών του 2001, εκδίδει το ακόλουθο διάταγμα:

Συνοπτικός
 τίτλος

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το Περί Ζωοτροφών και Προσθετικών των Ζωοτροφών (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Χρήσεως) (Τροποποίηση Παραρτημάτων) Διάταγμα του 2002.

Ερμηνεία

Επίσημη
 Εφημερίδα
 Παράρτημα
 Τρίτο (I)
 19.3.2001
 Τρίτο II)
 24.5.2002

2. Στο παρόν Διάταγμα-
 «Επιτροπή» σημαίνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
 «Κανονισμοί» σημαίνει τους Περί Ζωοτροφών και Προσθετικών των Ζωοτροφών (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Χρήσεως) Κανονισμούς του 2001.

Τροποποίηση
του Μέρους Α
του
Παραρτήματος
I
Πίνακας I

3. Το Μέρος Α, του Παραρτήματος I των Κανονισμών, τροποποιείται όπως καθορίζεται στην παρούσα παράγραφο και στον Πίνακα 1, του Παρόντος Διατάγματος, ο οποίος προσδιορίζει τις τροποποιήσεις και αποτελεί την τελική μορφή για τις πιο κάτω κατηγορίες πρώτων υλών του Μέρους Α του Παραρτήματος I των Κανονισμών ως εξής:

- (α) Προσθήκη στην κατηγορία «1 ΣΠΟΡΟΙ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΥΤΩΝ» των εξής πρώτων υλών καθώς και της έννοιας και των υποχρεωτικών δηλώσεων που αντιστοιχούν σ' αυτές:
 - (i) Πρωτεΐνη κριθής με τον κωδικό αριθμό 1.06
 - (ii) Αλεσμένο ρύζι για ζωτροφές με τον κωδικό αριθμό 1.08*
 - (iii) Προζελατινοποιημένο άμυλο σίτου με τον κωδικό αριθμό 1.31*
- (β) Αντικατάσταση στην κατηγορία «2 ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ, ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΡΠΟΙ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΥΤΩΝ» με τον κωδικό αριθμό 2.18 της πρώτης ύλης «Σογιέλαιο» με την πρώτη ύλη «Φυτικό λάδι» καθώς και της έννοιας και των υποχρεωτικών δηλώσεων για το σογιέλαιο με εκείνες που αναφέρονται στο φυτικό λάδι.
- (γ) Προσθήκη στην κατηγορία «11- ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΥΛΕΣ» των εξής πρώτων υλών καθώς και της έννοιας και των υποχρεωτικών δηλώσεων που αντιστοιχούν σ' αυτές:
 - (i) Φωσφορικό μαγνήσιο με τον κωδικό αριθμό 11.15*
 - (ii) Φωσφορικά άλατα νατρίου, ασβεστίου και μαγνησίου με τον κωδικό αριθμό 11.16*
 - (iii) Φωσφορικό νάτριο με τον κωδικό αριθμό 11.17*
 - (iv) Δισανθρακικό νάτριο με τον κωδικό αριθμό 11.18.

Τροποποίηση
του Μέρους Β
του
Παραρτήματος
I
Πίνακας II

4. Το Μέρος Β του Παραρτήματος 1 των Κανονισμών, τροποποιείται όπως καθορίζεται στην παρούσα παράγραφο και στον Πίνακα II, του παρόντος Διατάγματος, ο οποίος προσδιορίζει τις πιο κάτω τροποποιήσεις και αποτελεί την τελική μορφή για τις πιο κάτω κατηγορίες πρώτων υλών και των υποχρεωτικών δηλώσεων γ' αυτές του Μέρους Β' του Παραρτήματος I των Κανονισμών ως εξής:

- (α) Καταχώρηση αύξοντος αριθμού από το 1-18 στις κατηγορίες πρώτων υλών με την ίδια σειρά που αναφέρονται στο Μέρος Β του Παραρτήματος I και μετά την κατάργηση της κατηγορίας «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΛΟΥΣΙΑ ΣΕ ΛΑΚΤΟΖΗ».
- (β) Αντικατάσταση της κατηγορίας «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ» με την κατηγορία «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ» με υποχρεωτικές δηλώσεις της πρωτεΐνης, της υγρασίας όταν είναι >5% και της λακτόζης όταν είναι >10%.
- (γ) Κατάργηση της κατηγορίας «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΛΟΥΣΙΑ ΣΕ ΛΑΚΤΟΖΗ» με την εισαγωγή της κατηγορίας «15. Προϊόντα χερσαίων ζώων» με υποχρεωτικές δηλώσεις της πρωτεΐνης όταν είναι >10% και του λίπους όταν είναι >5%.
- (δ) Προσθήκη της κατηγορίας «16 ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΑ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΥΤΩΝ» με υποχρεωτικές δηλώσεις της πρωτεΐνης όταν είναι >10% και του λίπους όταν είναι >5%.
- (ε) Προσθήκη της Κατηγορίας «17 ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΥΛΕΣ» με υποχρεωτικές δηλώσεις τα σχετικά ανόργανα στοιχεία.
- (στ) Προσθήκη της κατηγορία «18 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ» με υποχρεωτικές δηλώσεις της πρωτεΐνης όταν είναι >10%, της κυτταρίνης όταν είναι >10%, του άμυλου όταν είναι >30% και του ολικού σακχάρου σε ισοδύναμο σουκρόζης όταν είναι >10%.

Τροποποίηση
του Μέρους Γ
του
Παραρτήματος
I
Πίνακας III

5. Το Μέρος Γ του Παραρτήματος 1 των Κανονισμών τροποποιείται όπως καθορίζεται στην παρούσα παράγραφο και αντικαθίσταται από τον Πίνακα III του παρόντος Διατάγματος ο οποίος προσδιορίζει και τις κατά αλφαβητική σειρά προσθήκες των τις πιο κάτω μεθόδων επεξεργασίας των πρώτων υλών στο Μέρος Γ' του Παραρτήματος 1 ως εξής:

(α) προσθήκη του όρου «Αποσακχάρωση»

(β) προσθήκη του όρου «Συμπύκνωση»

(γ) προσθήκη του όρου «Σύνθλιψη»

(δ) προσθήκη του όρου «Υδρογόνωση»

(ε) προσθήκη του όρου «Υδρόλυση»

με τις αντίστοιχες περιγραφές και κοινές ονομασίες και χαρακτηρισμούς

Πίνακας IV

6. Το Μέρος Α του Παραρτήματος 6 των Κανονισμών τροποποιείται όπως καθορίζεται στην παρούσα παράγραφο και στον Πίνακα IV του παρόντος Διατάγματος ο οποίος προσδιορίζει και τις τροποποιήσεις των πιο κάτω κατηγοριών ανεπιθύμητων ουσιών στο Μέρος Α του Παραρτήματος 6 ως εξής:

(α) αντικατάσταση στην κατηγορία «I Ανόργανα στοιχεία ή ιόντα», στην στήλη I, της λέξης «νιτρικά» με την λέξη «νιτρώδη».

(β) αντικατάσταση της κατηγορίας «IV Υπολείμματα φυτοφαρμάκων» με την κατηγορία «IV Υπολείμματα φυτοφαρμάκων και άλλες ουσίες».

(γ) στην προαναφερθείσα κατηγορία «IV Υπολείμματα φυτοφαρμάκων και άλλες ουσίες».

(i) το μέγιστο επιτρεπτό επίπεδο των 0.005mg του βήτα-ισομερούς του εξαχλωροκυκλοεξανίου ανά kg σύνθετης ζωοτροφής με υγρασία 12% για αγελάδες γαλακτοπαραγωγής επεκτείνεται στις σύνθετες ζωοτροφές όλων των ζώων γαλακτοπαραγωγής·

(ii) καθορίζεται μέγιστο επίπεδο διοξίνης στην πούλπα εσπεριδοειδών, ίσον προς 500pgl TEQ/kg ζωοτροφής με 12% υγρασία.

Τροποποίηση του Παραρτήματος 13 Πίνακας V

7. Το Παράρτημα 13 των Κανονισμών τροποποιείται όπως καθορίζεται στην παρούσα παράγραφο και στον Πίνακα V του παρόντος Διατάγματος, ο οποίος προσδιορίζει και τις τροποποιήσεις όσον αφορά τις μεθόδους ανάλυσης στο Παράρτημα αυτό ως εξής:

(α) Αντικατάσταση των εξής μεθόδων ανάλυσης:

(i) προσδιορισμού των λιπών και λαδιών με την μέθοδο που περιγράφεται στην Οδηγία 98/64/EK της Επιτροπής που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L257 της 19.9.1998 σελίδα 14·

(ii) προσδιορισμού του κοκκιδιοστατικού Ampolium με τη μέθοδο που περιγράφεται στην Οδηγία 99/27/EK της Επιτροπής που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L118 της 6.5.1999 σελίδα 36·

- (iii) της πολωσιμετρικής μεθόδου ανάλυσης του αμύλου με τη μέθοδο που περιγράφεται στην Οδηγία 99/79/EK της Επιτροπής που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L209 της 7.8.1999 σελίδα 23·
 - (iv) ανάλυση της βιταμίνης Α με τη μέθοδο που περιγράφεται στην Οδηγία 2000/45/EK της Επιτροπής που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L174 της 13.7.2000 σελίδα 30.
- (Β) Προσθήκη των εξής μεθόδων ανάλυσης:
- (i) προσδιορισμού όλων των αμινοξέων (πλην της θρυπτοφάνης) που περιγράφεται στην Οδηγία 98/64/EK της Επιτροπής, που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L257 της 19.9.1998 σελίδα 14·
 - (ii) προσδιορισμού του olaquinox, που περιγράφεται στην Οδηγία 98/64/EK της Επιτροπής που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L257 της 19.9.1998·
 - (iii) μικροσκοπική ταυτοποίηση για προσδιορισμό συστατικών ζωϊκής προέλευσης στις ζωοτροφές που περιγράφεται στην Οδηγία 98/88/EK της Επιτροπής που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L318 της 13.11.1998 σελίδα 98·
 - (iv) προσδιορισμού του carbadox που περιγράφεται στην Οδηγία 99/27/EK της Επιτροπής που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L118 της 6.5.1999 σελίδα 36·
 - (v) προσδιορισμού της δικλαζουρίλης που περιγράφεται στην Οδηγία 99/27/EK της Επιτροπής που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L118 της 6.5.1999 σελίδα 36·
 - (vi) προσδιορισμού του Lasalocid sodium που περιγράφεται στην Οδηγία 99/76/EK της Επιτροπής που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L207 της 6.8.1999 σελίδα 13·

- (vii) προσδιορισμοί της θρυπτοφάνης που περιγράφεται στην Οδηγία 2000/45/ΕΚ της Επιτροπής, που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L174 της 13.7.2000 σελίδα 32.
- (viii) προσδιορισμού της βιταμίνης Ε(9-τοκοφερόλη) που περιγράφεται στην Οδηγία 2000/45/ΕΚ της Επιτροπής που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L209 της 6.8.2002 σελίδα 15.
- (ix) προσδιορισμού διοξινών, φουρανίων και παρόμοιων με τις διοξίνες PCB που περιγράφεται στην Οδηγία 2002/70/ΕΚ της Επιτροπής που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L209 της 6.8.2002 σελίδα 15.

Τροποποίηση
του Μέρους Α
του
Παραρτήματος
15
Πίνακας VI

8. Το Μέρος Α του Παραρτήματος 15 των Κανονισμών τροποποιείται όπως καθορίζεται στην παρούσα παράγραφο και αντικαθίσταται από τον Πίνακα VI του παρόντος Διατάγματος ο οποίος προσδιορίζει και τις τροποποιήσεις των πιο κάτω κατηγοριών προσθετικών ουσιών του Μέρους Α του Παραρτήματος 15 ως εξής:

- (α) στην κατηγορία «Α. Αντιβιοτικά»:
 - i) στο αντιβιοτικό με αριθμό Ε. 7 12 φλαβοφωσφολιπόλη, η κατηγορία ζώων «Λοιπά πουλερικά εκτός χήνων, πατιών και περιστερών» αντικαθίσταται από την κατηγορία ζώων «κοτόπουλα παχυνόμενα». Επίσης διαγράφεται η κατηγορία ζώων «ζώα για γούνα εκτός των κουνελιών»
 - ii) να προστεθεί το αντιβιοτικό με αριθμό Ε717 Αβιλαμυκίνη στη συγκέντρωση των 200g/kg (Maxus G200, Maxus 200) και 100g/kg (Maxus G100) της Eli Lilly and Company Ltd. για χρήση στις γαλοπούλες στη δόση των 5-10 mg/kg πλήρους ζωοτροφής, με διάρκεια χρήσης μέχρι την 20.1.2013
- (β) στην κατηγορία «Δ. Κοκκιδιοστατικά και λοιπές φαρμακευτικές ουσίες»
 - (i) διαγραφή των ακόλουθων προσθετικών:
 - με αριθμό Ε750 «Αμπρόλιουμ»
 - με αριθμό Ε751 «Αμπρόλιουμ/Εθοπαμπέιτ»
 - με αριθμό Ε765 «Μετικλορπιντόλη»
 - με αριθμό Ε755 «Μετικλορπιντόλη/μεθυλοβενζοκάτη»
 - με αριθμό Ε768 «Νικαρπαζίνη»
 - (ii) προσθήκη της ουσίας με αριθμό Ε766 Σαλινομυκινικό νάτριο 120g/kg (Sacox 120) της εταιρείας Intervet

International BV για χρήση στις όρνιθες αυγοπαραγωγής με διάρκεια χρήσης μέχρι 11.11.2013.

- (iii) προσθήκη της ουσίας με αριθμό E770 α-μαντουραμυκινικό αμμόνιο 1g/100g (cygro 1%) της εταιρείας Alpharma AS, για χρήση στις γαλοπούλες ηλικίας μέχρι 16 εβδομάδες στη δόση των 5mg/kg πλήρους ζωτροφής, με διάρκεια χρήσης μέχρι την 15.12.2011.
 - (γ) Στην κατηγορία «Στ-χρωστικές ουσίες» υποκατηγορία «Ι. Καροτινοειδή και ξανθοφύλλες», η μέγιστη επιτρεπτή περιεκτικότητα της κανθαξανθίνης (αριθμός E161g) μειώνεται από 80 στα 25 mg/kg για τα πουλερικά πλην των ορνίθων αυγοπαραγωγής, στα 8mg/kg για τις όρνιθες αυγοπαραγωγής και στα 25mg/kg για τους σολομούς και πέστροφες και παραμένει απροσδιόριστη για σκύλους, γάτους ψάρια ενυδρείου. Η χρήση στις ζωτροφές της κανθαξανθίνης που επιτρέπεται στα τρόφιμα είναι η ίδια με την προαναφερθείσα κανθαξανθίνη.
 - (δ) στην κατηγορία «Θ. Ιχνοστοιχεία».
 - (i) να προστεθεί το υπ' αριθμό E5 τετροξειδιο του τριμαγγανίου ($MnOMn_2O_3$) για χρήση, χωρίς χρονικό περιορισμό, σ' όλα τα ζώα στη μέγιστη ολική δόση των 150mg/kg πλήρους ζωτροφής
 - (ii) οι ολικές μέγιστες επιτρεπτές δόσεις σε mg/kg πλήρους ζωτροφής η ανά ημέρα, να μειωθούν ως εξής:
- | | |
|----------|--|
| Σίδηρος | Για χοίρους στα 500mg/kg πλήρους ζωτροφής για χοιρίδια στα 250 mg/ημέρα για ζώα συντροφιάς στα 250mg/kg πλήρους ζωτροφής για λοιπά είδη στα 600mg/kg πλήρους ζωτροφής. |
| Κοβάλτιο | Για όλα τα ζώα στα 2mg/kg πλήρους ζωτροφής. |
| Χαλκός | Για χοιρίδια μέχρι 12 εβδομάδων 170mg/kg πλήρους ζωτροφής για λοιπούς χοίρους 25mg/kg πλήρους ζωτροφής για βοοειδή πριν την έναρξη του μηρυκασμού 15mg/kg υποκατάστατου γάλακτος ή πλήρους ζωτροφής για λοιπά βοοειδή 35mg/kg πλήρους ζωτροφής |

για πρόβατα 15mg/kg πλήρους ζωτροφής
για ψάρια 25mg/kg πλήρους ζωτροφής
για μαλακόστρακα 50mg/kg πλήρους
ζωτροφής
για λοιπά είδη 25mg/kg πλήρους ζωτροφής
Μαγγάνιο Για ψάρια 100 mg/kg πλήρους ζωτροφής
για λοιπά είδη 150mg/kg πλήρους ζωτροφής
Ψευδάργυρος Για ζώα συντροφιάς 250mg/kg πλήρους
ζωτροφής για ψάρια 200mg/kg πλήρους
ζωτροφής στα υποκατάστατα γάλακτος
200mg/kg πλήρους ζωτροφής
για άλλα είδη 150mg/kg πλήρους ζωτροφής.

(ε) στην κατηγορία «ΙΔ Ένζυμα» να προστεθεί το παρασκεύασμα ενζύμων με αριθμό E1601 Ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάση ΕΚ 3.2.1.6 και Ενδο-1,4-β-ξυλανάση ΕΚ 3.2.1.8, για χρήση χωρίς χρονικό περιορισμό στα κοτόπουλα πάχυνσης στη δόση των 138 IU/kg πλήρους ζωτροφής για τη γλυκανάση και 200 IU/kg πλήρους ζωτροφής για τη ξυλανάση.,

(στ) στην κατηγορία «Ι.Ε. Μικροοργανισμοί», να προστεθούν για μόνιμη χρήση (χωρίς χρονικό περιορισμό):

- (i) ο μικροοργανισμός με αριθμό E1701 *Bacillus cereus* var τογοί για χρήση σε χοιρίδια μέχρι ηλικίας 2 μηνών στη δόση 1×10^9 cfu/kg πλήρους ζωτροφής και στις γουρούνες από 1 εβδομάδα πριν τη γέννα μέχρι τον απογαλακτισμό στη δόση των 0.5×10^9 έως 2×10^9 CFU/kg πλήρους ζωτροφής και
- (ii) ο μικροοργανισμός με αριθμό E1702 *Saccharomyces cerevisiae* NCYC SC 47, για χρήση στα παχυνόμενα βοοειδή στη δόση των 4×10^9 έως 8×10^9 CFU/kg πλήρους ζωτροφής
- (iii) ο μικροοργανισμός με αριθμό E1703 *Sacharomyces cerevisiae* CNCM 1-1079 στα χοιρίδια στη δόση 2×10^9 έως 6×10^9 CFU/kg πλήρους ζωτροφής.

Τροποποίηση
του Μέρους Β
του
Παραρτήματος
15
Πίνακας VII

9. Το Μέρος Β του Παραρτήματος των Κανονισμών, τροποποιείται όπως καθορίζεται στην παρούσα παράγραφο και αντικαθίσταται από τον Πίνακα VII, του Παρόντος Διατάγματος ο οποίος προσδιορίζει και τις τροποποιήσεις των πιο κάτω κατηγοριών προσθετικών ουσιών του Μέρους Β του Παραρτήματος ως εξής:

(α) Στη κατηγορία «Δ. Κοκκιδιοστατικά και λοιπές φαρμακευτικές ουσίες» να προστεθεί με αριθμό 29 το κοκκιδιοστατικό σεμδουραμυκινικό νάτριο (Aviax 5%) της Phibro Animal Health s.p.a. για χρήση μέχρι 1.6.2006 στα παχυνόμενα κοτόπουλα στη δόση των 20 έως 25mg/kg πλήρους ζωτροφής,

- (β) στην κατηγορία «Στ-Χρωστικές ουσίες» ως εξής:
- (i) στην υποκατηγορία «Ι. Καροτινοειδή και ξανθοφύλλες» της β-καροτίνης για καναρίνια, της κανθαξανθίνης για πουλιά συντροφίας και της *Phaffia rhodozyma* πλούσιας σε ασταξανθίνη (ATCC 74219) για σολωμούς και πέστροφες σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που καθορίζονται για τα ζώα αυτά στον Πίνακα VII του Παρόντος Διατάγματος,
 - (ii) στην υποκατηγορία «2 Άλλες χρωστικές» της ταρζανίνης του κίτρινου πορτοκαλλί FCF, του πρότυπου κυανού και σύμπλοκου χαλκού – χλωροφύλλης για χρήση μέχρι 30.9.2001 στα ζώα συντροφίας με βάση τις λεπτομέρειες που καθορίζονται στον Πίνακα VII του Παρόντος Διατάγματος.
- (γ) στην κατηγορία «Ζ Συντηρητικά» να προστεθεί με αριθμό 1, το παρασκεύασμα που αποτελείται από:
 Βενζοϊκό νάτριο 140g/kg
 Προπιονικό οξύ 370g/kg
 Προπιονικό νάτριο 110g/kg
 για χρήση μέχρι την 1.8.2006 στους χοίρους και αγελάδες γαλακτοπαραγωγής στη δόση από 3000 έως 22000 mg/kg πλήρους ζωοτροφής για διατήρηση σπόρων με υγρασία >15%
- (δ) στην κατηγορία «Θ.Ιχνοστοιχεία» να προστεθεί το ιχνοστοιχείο θειϊκό σύμπλοκο χαλκού-λυσίνης για όλα τα ζώα (εκτός μόσχων πριν τον απογαλακτισμό και των προβάτων) σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που καθορίζονται για τα ζώα αυτά στον Πίνακα VII του παρόντος Διατάγματος
- (ε) στην κατηγορία «Ι. Ουσίες προάγουσες την ανάπτυξη», για την υπ'αριθμό 1 ουσία, Διμυρμηγκικό κάλιο να αυξηθεί η μέγιστη επιτρεπόμενη δόση από 6000mg/kg πλήρους ζωοτροφής και στα 12000 mg για τους παχυνόμενους χοίρους με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 30.6.2005
- (στ) στην κατηγορία «ΙΒ Συνδετικές αντισυσσωματικές και πηκτικές ουσίες» προσθήκη των εξής προσθετικών για χρήση σε καθοριζόμενα ζώα σύμφωνα με όλες τις αντίστοιχες πρόνοιες που καθορίζονται για τα ζώα αυτά στον Πίνακα VII του παρόντος Διατάγματος:
- (i) Κλινοπτιλόλιθος ηφαιστειακής προέλευσης για χοίρους, κουνέλια και πουλερικά
 - (ii) κλινοπτιλόλιθος ορυκτής προέλευσης για χρήση

Πίνακας VII

Πίνακας VII

στους παχυνόμενους χοίρους, παχυνόμενα
κοτόπουλα, βοοειδή και σολομούς

- (iii) σιδηροκυανιούχο νάτριο (E535) και σιδηροκυανιούχο κάλιο (E536) για χρήση μέχρι την 1.3.2006 σ' όλα τα είδη και κατηγορίες ζώων με μέγιστη περιεκτικότητα ίση προς 80mg σιδηροκυανιούχου ιόντος/kg NaCl στη ζωοτροφή
- (ζ) στην κατηγορία «ΙΓ. Ρυθμιστές οξύτητας» προστίθεται με αριθμό E210 η ουσία βενζοϊκό οξύ για χρήση στους παχυνόμενους χοίρους από 5000-10000 mg/kg σύνθετης ζωοτροφής με διάρκεια ισχύος μέχρι 25.5.2007.
- (η) στην κατηγορία «ΙΔ Ένζυμα», με την παραχώρηση προσωρινής άδειας χρήσης των πιο κάτω ενζύμων για χρήση στα καθορισμένα ζώα και συνδυασμών ενζύμων για διάφορα ζώα σύμφωνα με όλες τις αντίστοιχες πρόνοιες που καθορίζονται στον Πίνακα VII, ο οποίος διαλαμβάνει τις τροποποιήσει του Μέρους Β' του Παραρτήματος 15 των Κανονισμών ως εξής:
 - (i) του ενζύμου 3-φυτάση EC 3.1.8 με αριθμό 2 για χρήση στα χοιρίδια, χοίρους παχυνόμενους, κοτόπουλα παχυνόμενα και όρνιθες αυγοπαραγωγής
 - (ii) του ενζύμου α-γαλακτοσιδάση EC 3.2.1.22 με αριθμό 3 για χρήση στα κοτόπουλα
 - (iii) του ενζύμου Ενδο-1,3 (4)-β-γλυκανάση EC3.2.1.6 με αριθμό 4 για χρήση στα χοιρίδια και κοτόπουλα παχυνόμενα
 - (iv) του ενζύμου Ενδο-1,4-β-ξυλανάση EC3.2.1.8 με αριθμός για χρήση στα κοτόπουλα παχυνόμενα, γάλους παχυνόμενους και στα χοιρίδια
 - (v) του παρασκευάσματος ενζύμων με αριθμό 6 αποτελούμενο από
Ενδο-1,4 -β-ξυλανάση EC3.2.1.8 και
Ενδο-1,4 -β-γλυκανάση EC3.2.1.4
για χρήση στα παχυνόμενα κοτόπουλα, χοιρίδια και παχυνόμενους χοίρους
 - (vi) του παρασκευάσματος ενζύμων με αριθμό 7 αποτελούμενο από
Ενδο-1,4-β-ξυλανάση EC3.2.1.8
Ενδο-1,4(4)-β-γλυκανάση EC3.2.1.4
για χρήση στα παχυνόμενα κοτόπουλα, χοιρίδια, παχυνόμενοι γάλοι και όρνιθες αυγοπαραγωγής

- (vii) του παρασκευάσματος ενζύμων με αριθμό 8 αποτελούμενο από
Ενδο-1,4(4)-β-γλυκανάση EC3.2.1.4
Ενδο-1,4-β-ξυλανάση EC3.2.1.8
για χρήση στα παχυνόμενα κοτόπουλα, χοιρίδια και
όρνιθες αυγοπαραγωγής
- (viii) του ενζύμου Ενδο-1,4-β-ξυλανάση EC3.2.1.8 με
αριθμό 9 για χρήση στα παχυνόμενα κοτόπουλα,
όρνιθες αυγοπαραγωγής και παχυνόμενοι γάλοι
- (ix) του ενζύμου α-αμυλάση EC3.2.1.1
με αριθμό 10 για χρήση στα χοιρίδια, παχυνόμενους
χοίρους και στις γουρούνες.
- (x) του παρασκευάσματος ενζύμων με αριθμό 12
αποτελούμενο από
Ενδο-1,4-β-γλυκανάση EC3.2.1.4
Ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάση EC3.2.1.6
Ενδο-1,4-β-ξυλανάση EC3.2.1.8
για χρήση στα παχυνόμενα κοτόπουλα, όρνιθες
αυγοπαραγωγής και γάλοι παχυνόμενοι
- (xi) του παρασκευάσματος ενζύμων με αριθμό 13
αποτελούμενο από
Ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάση EC3.2.1.6
Ενδο-1,4-β-ξυλανάση EC3.2.1.8
για χρήση στα παχυνόμενα κοτόπουλα, όρνιθες
αυγοπαραγωγής και παχυνόμενους γάλους
- (xii) του ενζύμου Ενδο-1,4-β-ξυλανάση EC3.2.1.8 με
αριθμό 14 για χρήση στα παχυνόμενα κοτόπουλα και
παχυνόμενες γαλοπούλες
- (xiii) του ενζύμου Ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάση EC3.2.1.6 με
αριθμό 15 για χρήση στα παχυνόμενα κοτόπουλα
- (xiv) του ενζύμου Ενδο-1,4(4)-β-γλυκανάση EC3.2.1.4 με
αριθμό 16 για χρήση στα παχυνόμενα κοτόπουλα,
όρνιθες αυγοπαραγωγής, χοιρίδια και παχυνόμενοι
χοίροι
- (xv) του ενζύμου Ενδο-1,4-β-ξυλανάση EC3.2.1.8 με
αριθμό 17 για χρήση στα παχυνόμενα κοτόπουλα,
όρνιθες αυγοπαραγωγής, χοιρίδια και παχυνόμενους
χοίρους

- (xvi) του ενζύμου Ενδο-1,3(4)-β γλυκανάση EC3.2.16 με αριθμό 18 για χρήση στα παχυνόμενα κοτόπουλα
- (xvii) του ενζύμου Ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάση EC3.2.1.6 με αριθμό 19 για χρήση στα παχυνόμενα κοτόπουλα
- (xviii) του ενζύμου Ενδο-1,4-β-ξυλανάση EC3.2.1.8 με αριθμό 21 για χρήση στα παχυνόμενα κοτόπουλα
- (xix) του ενζύμου Ενδο-1,4-β-ξυλανάση EC3.2.1.8 με αριθμό 21 για χρήση στα παχυνόμενα κοτόπουλα
- (xx) του ενζύμου Ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάση EC3.2.1.6 με αριθμό 22 για παχυνόμενα κοτόπουλα
- (xxi) του παρασκευάσματος ενζύμων με αριθμό 24 αποτελούμενο από
Ενδο-1,4-β-ξυλανάση EC3.2.1.8
Ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάση EC3.2.1.6
για χρήση στα παχυνόμενα κοτόπουλα, τις όρνιθες αυγοπαραγωγής και τις παχυνόμενες γαλοπούλες
- (xxii) του παρασκευάσματος ενζύμων με αριθμό 25 αποτελούμενο από
Ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάση EC3.2.1.6
Ενδο-1,4-β-ξυλανάση EC3.2.1.8
για χρήση στα παχυνόμενα κοτόπουλα και όρνιθες αυγοπαραγωγής
- (xxiii) του ενζύμου Ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάση EC3.2.1.6 με αριθμό 26 για χρήση στα παχυνόμενα κοτόπουλα και στα χοιρίδια
- (xxiv) του ενζύμου Ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάση EC3.2.1.6 με αριθμό 29 για χρήση στα παχυνόμενα κοτόπουλα
- (xxv) του παρασκευάσματος ενζύμων με αριθμό 36 αποτελούμενο από
Ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάση EC3.2.1.6
Ενδο-1,4-β-ξυλανάση
για χρήση στα παχυνόμενα κοτόπουλα και όρνιθες αυγοπαραγωγής
- (xxvi) του παρασκευάσματος ενζύμων με αριθμό 37 αποτελούμενο από
Ενδο-1,4-β-ξυλανάση EC3.2.1.8
Σουμπιλισίνη EC3.4.21.62
για χρήση στα παχυνόμενα κοτόπουλα και στους γάλους

- (xxvii) του παρασκευάσματος ενζύμων με αριθμό 38
αποτελούμενο από
Ενδο-1,4-β-ξυλανάση EC3.2.1.8
Σουμπτιλίσίνη EC 3.4.21.62
για χρήση στα χοιρίδια
- (xxviii) του παρασκευάσματος ενζύμων με αριθμό 39
αποτελούμενο από
Ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάση EC3.2.1.6
Ενδο-1,4-β-ξυλανάση EC3.2.1.8
για χρήση στους παχυνόμενους χοίρους
- (xxix) του παρασκευάσματος ενζύμων με αριθμό 40
αποτελούμενο από
Ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάση EC3.2.1.6
Ενδο-1,4-β-ξυλανάση EC3.2.1.8
Σουμπτιλίσίνη EC 3.4.21.62
για χρήση στα παχυνόμενα κοτόπουλα
- (xxx) του παρασκευάσματος ενζύμων με αριθμό 41
αποτελούμενο από
Ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάση EC3.2.1.6
Ενδο-1,4-β-ξυλανάση EC3.2.1.8
Σουμπτιλίσίνη EC 3.4.21.62
για χρήση στα παχυνόμενα κοτόπουλα και στις
όρνιθες αυγοπαραγωγής
- (xxxi) του ενζύμου Ενδο-1,4-β-ξυλανάση EC 3.2.1.8 με
αριθμό 42 για χρήση στα χοιρίδια και στους
παχυνόμενους χοίρους
- (xxxi) του παρασκευάσματος ενζύμων με αριθμό 43
αποτελούμενου από
Ενδο-1,4-β-ξυλανάση EC3.2.1.8
Ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάση EC3.2.1.6
α αμυλάση EC3.2.1.1
για χρήση στα χοιρίδια
- (xxxi) του παρασκευάσματος ενζύμων με αριθμό 44
αποτελούμενου από
Ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάση EC3.2.1.6
Ενδο-1,4-β-ξυλανάση EC3.2.1.8
α αμυλάση EC3.2.1.1
για χρήση στα χοιρίδια
- (xxxi) του παρασκευάσματος ενζύμων με αριθμό 45
αποτελούμενου από
Ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάση EC3.2.1.6
Ενδο-1,4-β-ξυλανάση EC3.2.1.8
α αμυλάση EC3.2.1.1
για χρήση στα χοιρίδια

- (xxxv) του παρασκευάσματος ενζύμων με αριθμό 46
αποτελούμενου από
Ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάση EC3.2.1.6
Ενδο-1,4-β-ξυλανάση EC3.2.1.8
πολυγαλακτουροντίδη EC3.2.1.15
για χρήση στους παχυνόμενους χοίρους
- (xxxvi) του παρασκευάσματος ενζύμων με αριθμό 47
αποτελούμενου από
Ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάση EC3.2.1.6
Ενδο-1,4-β-ξυλανάση EC3.2.1.8
πολυγαλακτουρονάση EC3.2.1.15
για χρήση στα χοιρίδια
- (xxxvii) του παρασκευάσματος ενζύμων με αριθμό 48
αποτελούμενου από
α αμυλάση EC3.2.1.1
Ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάση EC3.2.1.6
για χρήση στα παχυνόμενα κοτόπουλα και
παχυνόμενους γάλους
- (xxxviii) του παρασκευάσματος ενζύμων με αριθμό 49
αποτελούμενου από
Ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάση EC3.2.1.6
Ενδο-1,4-β-ξυλανάση EC3.2.1.8
α αμυλάση EC3.2.1.1
Βακιλλολυσίνη EC3.4.24.28
Πολυγαλακτουρονάση EC3.2.1.15
για χρήση στα παχυνόμενα κοτόπουλα και όρνιθες
αυγοπαραγωγής
- (xxix) του ενζύμου 6-φυτάση EC3.1.3.26 με αριθμό 50 για
χρήση στα παχυνόμενα κοτόπουλα, τις όρνιθες
αυγοπαραγωγής, στους παχυνόμενους γάλους, στα
χοιρίδια στους παχυνόμενους χοίρους και στους
θηλυκούς χοίρους
- (xi) του ενζύμου Ενδο-1,4-β-ξυλανάση E.C. 3.2.1.8 με
αριθμό 51 για χρήση στους παχυνόμενους χοίρους
- (xlii) του παρασκευάσματος ενζύμων με αριθμό 52
αποτελούμενου από
Ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάση EC3.2.1.6
Ενδο-1,4(4)-β-γλυκανάση EC3.2.1.4
α αμυλάση EC3.2.1.1
για χρήση στα παχυνόμενα κοτόπουλα
- (xlii) του παρασκευάσματος ενζύμων με αριθμό 53

αποτελούμενου από
 Ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάση EC3.2.1.6
 Ενδο-1,4(4)-β-γλυκανάση EC3.2.1.4
 α αμυλάση EC3.2.1.1
 Βακιλλολυσίνη EC3.4.24.28
 Ενδο-1,4-β-ξυλανάση EC3.2.1.8
 για χρήση στα χοιρίδια και στα παχυνόμενα
 κοτόπουλα

- (xliii) του παρασκευάσματος ενζύμων με αριθμό 54
 αποτελούμενου από
 Ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάση EC3.2.1.6
 Ενδο-1,4(4)-β-γλυκανάση EC3.2.1.4
 α αμυλάση EC3.2.1.1
 Ενδο-1,4-β-ξυλανάση EC3.2.1.8
 για χρήση στα παχυνόμενα κοτόπουλα
- (xliv) του παρασκευάσματος ενζύμων με αριθμό 55
 αποτελούμενου από
 Ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάση EC3.2.1.6
 Ενδο-1,4(4)-β-γλυκανάση EC3.2.1.4
 α αμυλάση EC3.2.1.1
 Βικιλλολυσίνη EC3.4.24.28
 για χρήση στα χοιρίδια, παχυνόμενους χοίρους
 παχυνόμενα κοτόπουλα και όρνιθες αυγοπαραγωγής
- (xlv) του παρασκευάσματος ενζύμων με αριθμό 56
 αποτελούμενου από
 Ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάση EC3.2.1.6
 Ενδο-1,4-β-γλυκανάση EC3.2.1.4
 α αμυλάση EC3.2.1.1
 Βακιλλολυσίνη EC 3.4.24.28
 για χρήση στα παχυνόμενα κοτόπουλα
- (xlvi) του παρασκευάσματος ενζύμων με αριθμό 57
 αποτελούμενου από
 Ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάση EC3.2.1.6
 Ενδο-1,4(4)-β-γλυκανάση EC3.2.1.4
 α αμυλάση EC3.2.1.1
 Βακιλλολυσίνη EC 3.4.24.28
 για χρήση στα παχυνόμενα κοτόπουλα
- (xlvii) του παρασκευάσματος ενζύμων με αριθμό 58
 αποτελούμενου από
 Ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάση EC3.2.1.6
 Ενδο-1,4(4)-β-γλυκανάση EC3.2.1.4
 α αμυλάση EC3.2.1.1
 Βακιλλολυσίνη EC3.4.24.28
 για χρήση στα χοιρίδια

Πίνακα VII

- (ε) Αντικατάσταση της κατηγορίας «ΙΕ Μικροοργανισμοί» με την παραχώρηση άδειας χρήσης και προσθήκη των πιο κάτω Μικροοργανισμών και συνδυασμών μικροοργανισμών σύμφωνα με όλες τις αντίστοιχες πρόνοιες που καθορίζονται στον Πίνακα VII, ο οποίος διαλαμβάνει τις τροποποιήσεις του Μέρους Β του Παραρτήματος 15 των κανονισμών ως εξής:
- (i) του *Bacillus cereus* var. *toyoi* NCIMB 40112/CNCM 1-1012 με αριθμό 1 για χρήση στα παχυνόμενα κοτόπουλα, όρνιθες αυγοπαραγωγής, στα δαμάλια, στους παχυνόμενους μόσχους, στις κουνέλες αναπαραγωγής και στα παχυνόμενα κουνέλια
 - (ii) του "*Saccharomyces cerevisiae* CNCM 1-1079" με αριθμό 6 για χρήση στις γουρούνες και χοιρίδια
 - (iii) του "*Saccharomyces cerevisiae* CNCM 1-1077" με αριθμό 7 για χρήση στις αγελάδες γαλακτοπαραγωγής και στα παχυνόμενα βοοειδή
 - (iv) του παρασκευάσματος μικροοργανισμών με αριθμό 8 αποτελούμενου από
 "Enterococcus Faecium ATCC53519
 Enterococcus Faecium ATCC55593" (σε αναλογία 1:1)
 για χρήση στα παχυνόμενα κοτόπουλα
 - (v) του "*Rediococcus acidilactics* CNCM MA 18/4R με αριθμό 9 για χρήση στα παχυνόμενα κοτόπουλα, χοιρίδια και παχυνόμενους χοίρους
 - (vi) του "*Enterococcus Faecium* NCIMB 10415" με αριθμό 10 για χρήση στα παχυνόμενα κοτόπουλα, παχυνόμενους χοίρους, γουρούνες, παχυνόμενα βοοειδή και δαμάλια
 - (vii) του "*Enterococcus Faecium* DSM5464" με αριθμό 11 για χρήση στα χοιρίδια, κοτόπουλα παχυνόμενα και δαμάλια
 - (viii) του "*Lactobacilla Farciminis* CNCM MA 67/4R" με αριθμό 12 για χρήση στα χοιρίδια
 - (ix) του "*Enterococcus Faecium* IVC IMB 10415" με αριθμό 13 για χρήση στα χοιρίδια, δαμάλια, παχυνόμενα κοτόπουλα και παχυνόμενους γάλους
 - (x) του "*Saccharomyces cererisiue* MUCL 39885" με

αριθμό 14 για χρήση στα χοιρίδια και παχυνόμενα βοοειδή

- (xi) του "Enterococcus Faecium NCIMB 11181" με αριθμό 15 για χρήση στα δαμάλια και στα χοιρίδια
- (xii) του παρασκευάσματος μικροοργανισμών με αριθμό 16 αποτελούμενου από "Enterococcus Faecium DSM 7134" "Lactobacillus rhamnosus DSM 7233" για χρήση στα Δαμάλια και χοιρίδια
- (xiii) του παρασκευάσματος μικροοργανισμών με αριθμό 17 αποτελούμενου από "Lactobacillus casei NCIMB 30096 Enterococcus Faecium NCIMB30098" για χρήση στα δαμάλια
- (xiv) του "Enterococcus Faecium CECT4515" με αριθμό 18 για χρήση στα χοιρίδια και δαμάλια.
- (xv) του παρασκευάσματος μικροοργανισμών με αριθμό 19 αποτελούμενου από "Streptococcus in Fantarius CNCM 1-841 Lactobacillus plantarum CNCM 1-840" για χρήση στα δαμάλια
- (xvi) του Enterococcus Faecium DSM 7134 με αριθμό 22 για χρήση στα χοιρίδια, χοίρους παχυνόμενοι και στις χοιρομητέρες
- (xvii) του Lactobacillus acidophilus D2/CSL CECT4 529 με αριθμό 23 για χρήση στις όρνιθες αυγοπαραγωγής

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι
(Παράγραφος 3)
ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1, ΜΕΡΟΣ Α, ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ, ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ

1. ΣΠΟΡΟΙ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΥΤΩΝ

Κωδικός αριθμός	Ονομασία	Έννοια	Υποχρεωτικές δηλώσεις ⁽¹⁾
1	2	3	4
1.01	Βρώμη	Σπόροι του φυτού <i>Avena sativa</i> L. και άλλων καλλιεργούμενων ποικιλιών βρώμης.	
1.02	Νιφάδες βρώμης	Προϊόν που λαμβάνεται από απολεπυρωμένη βρώμη η οποία υποβάλλεται σε επεξεργασία με ατμό και κυλίνδριση και το οποίο ενδέχεται να περιέχει λέπτυρα βρώμης σε μικρή αναλογία.	Άμυλο
1.03	Ψιλά πίτυρα βρώμης (oat middlings)	Υποπροϊόν το οποίο λαμβάνεται κατά την επεξεργασία κοσκινισμένης και απολεπυρωμένης βρώμης σε αδρό άλεσμα και άλευρο βρώμης και το οποίο αποτελείται κυρίως από πίτυρο βρώμης και μέρος του ενδοσπέρμιου.	Κυτταρίνη
1.04	Φλοιοί και πίτυρα βρώμης (λεπυροπίτυρα βρώμης)	Υποπροϊόν το οποίο λαμβάνεται κατά την επεξεργασία κοσκινισμένης βρώμης σε αδρό άλεσμα βρώμης και το οποίο αποτελείται κυρίως από εξωτερικά περιβλήματα του σπόρου βρώμης και πίτυρα.	Κυτταρίνη
1.05	Κριθάρι	Σπόροι του <i>Hordeum vulgare</i> L. εμπορικά καθαροί όπως παράγονται.	
1.06	Πρωτεΐνη κριθής	Αποξηραμένο υποπροϊόν αμυλοποιείου κριθής. Αποτελείται κυρίως από πρωτεΐνες οι οποίες λαμβάνονται κατά τη διάρκεια του διαχωρισμού του αμύλου.	Πρωτεΐνη Άμυλο
1.07	Ψιλά πίτυρα κριθαριού	Υποπροϊόν το οποίο λαμβάνεται κατά την επεξεργασία κοσκινισμένου αποφλοιωμένου κριθαριού σε μαργαριταρώδες κριθάρι, σιμιγδάλι ή αλεύρι.	Κυτταρίνη

Κωδικός αριθμός	Ονομασία	Έννοια	Υποχρεωτικές δηλώσεις
1	2	3	4
1.08	Άλεσμένο ρύζι για ζωοτροφές	Προϊόν το οποίο λαμβάνεται από το άλεσμα ρυζιού για ζωοτροφές που αποτελείται, είτε από ανώριμους πράσινους ή κρητιδώδεις σπόρους, μετά από κοσκίνισμα, κατά τη διάρκεια της βιομηχανικής επεξεργασίας του αποφλοιωμένου ρυζιού, είτε από φυσιολογικούς κηλιδωμένους ή κίτρινους σπόρους ρυζιού, αποφλοιωμένους.	Άμυλο
1.09	Θραύσματα ρυζιού	Υποπροϊόν που προκύπτει κατά την παρασκευή γυαλισμένου ή στίλβωμένου ρυζιού <i>Oryza sativa</i> L. το οποίο αποτελείται κυρίως από μικρομεγέθεις ή/και θραυσμένους κόκκους.	Άμυλο
1.10	Πίτυρα ρυζιού (καστανόχρωμα)	Υποπροϊόν που προκύπτει κατά την πρώτη στίλβωση αποφλοιωμένου ρυζιού και το οποίο αποτελείται κυρίως από αργυρόχρωα περιβλήματα, τμήματα του αλευρώδους στρώματος του ενδοσπέρμιου και του φύτρου.	Κυτταρίνη
1.11	Πίτυρα ρυζιού (λευκά)	Υποπροϊόν που προκύπτει κατά τη δεύτερη στίλβωση αποφλοιωμένου ρυζιού και το οποίο αποτελείται κυρίως από τμήματα του ενδοσπέρμιου, του αλευρώδους στρώματος και του φύτρου.	Κυτταρίνη
1.12	Πίτυρα ρυζιού με ανθρακικό ασβέστιο	Υποπροϊόν που προκύπτει κατά τη στίλβωση αποφλοιωμένου ρυζιού και το οποίο αποτελείται κυρίως από αργυρόχρωα περιβλήματα, τμήματα του αλευρώδους στρώματος, του ενδοσπέρμιου, του φύτρου και μικρή ποσότητα ανθρακικού ασβεστίου που προκύπτει από τη χρησιμοποίησή του στη βιομηχανική διαδικασία (μέγιστη περιεκτικότητα σε CaCO_3 : 3%).	Κυτταρίνη

Κωδικός αριθμός	Ονομασία	Έννοια	Υποχρεωτικές δηλώσεις
1	2	3	4
1.13	Κτηνάλευρο μερικώς βρασμένου ρυζιού	Υποπροϊόν που προκύπτει κατά τη στίλβωση αποφλοιωμένου μερικώς βρασμένου ρυζιού και το οποίο αποτελείται κυρίως από αργυρόχρονα περιβλήματα, τμήματα του αλευρώδους στρώματος, του ενδοσπέρμιου, του φύτρου και μικρή ποσότητα ανθρακικού ασβεστίου που προκύπτει από τη χρησιμοποίηση του στη βιομηχανική διαδικασία (μέγιστη περιεκτικότητα σε CaCO_3 : 3%).	Κυτταρίνη
1.14	Πλακούντας ⁽²⁾ έκθλιψης φύτρων ρυζιού	Υποπροϊόν της ελαιουργίας, το οποίο λαμβάνεται με έκθλιψη φύτρων ρυζιού στα οποία έχει παραμείνει μέρος του ενδοσπέρμιου και των περιβλημάτων.	Πρωτεΐνη Λάδι Κυτταρίνη
1.15	Άλεσμα εκχύλισης φύτρων ρυζιού	Υποπροϊόν της ελαιουργίας, το οποίο λαμβάνεται με εκχύλιση φύτρων ρυζιού στα οποία έχει παραμείνει μέρος του ενδοσπέρμιου και των περιβλημάτων.	Πρωτεΐνη
1.16	Άμυλο ρυζιού	Τεχνικώς καθαρό άμυλο ρυζιού.	Άμυλο
1.17	Κεχρί	Σπόροι του <i>Panicum miliaceum</i> L. εμπορικά καθαροί, όπως παράγονται.	
1.18	Σίκαλη	Σπόροι του <i>Secale cereale</i> L. εμπορικά καθαροί, όπως παράγονται.	
1.19	Ψιλά πίτυρα σίκαλης (rye middlings)	Υποπροϊόν της αλευροποιίας το οποίο, λαμβάνεται από κοσκινισμένη σίκαλη και αποτελείται κυρίως από τμήματα του ενδοσπέρμιου με λεπτά θραύσματα των εξωτερικών περιβλημάτων και μερικά υπολείμματα κόκκων.	Κυτταρίνη
1.20	Κτηνάλευρο σίκαλης (rye feed)	Υποπροϊόν της αλευροποιίας το οποίο λαμβάνεται από κοσκινισμένη σίκαλη και αποτελείται κυρίως από τμήματα των εξωτερικών περιβλημάτων και από τεμαχίδια σπόρων από τα οποία έχει αφαιρεθεί μικρότερη ποσότητα ενδοσπέρμιου απ' όπi στα πίτυρα σίκαλης.	Κυτταρίνη

Κωδικός αριθμός	Ονομασία	Έννοια	Υποχρεωτικές δηλώσεις
1	2	3	4
1.21	Πίτυρα σίκαλης (rye bran)	Υποπροϊόν της αλευροποίησης το οποίο λαμβάνεται από κοσκινισμένη σίκαλη και αποτελείται κυρίως από τμήματα των εξωτερικών περιβλημάτων και από τεμαχίδια σπόρων από τα οποία έχει αφαιρεθεί το μεγαλύτερο μέρος του ενδοσπέρμιου.	Κυτταρίνη
1.22	Σόργο	Σπόροι του <i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench s.l. εμπορικά καθαροί, όπως παράγονται.	
1.23	Σιτάρι	Σπόροι των <i>Triticum aestivum</i> L., <i>Triticum durum</i> Desf. και άλλων καλλιεργούμενων ποικιλιών σιταριού εμπορικά καθαροί, όπως παράγονται.	
1.24	Ψιλά πίτυρα σιταριού (wheat middlings)	Υποπροϊόν της αλευροποίησης, το οποίο λαμβάνεται από κοσκινισμένους σπόρους σιταριού, ή αποφλοιωμένου σιταριού σπέλτα και αποτελείται κυρίως από τμήματα του ενδοσπέρμιου με λεπτά θραύσματα των εξωτερικών περιβλημάτων και μερικά υπολείμματα κόκκων.	Κυτταρίνη
1.25	Κτηνάλεуро σιταριού (wheat feed)	Υποπροϊόν της αλευροποίησης το οποίο λαμβάνεται από κοσκινισμένους σπόρους σιταριού ή αποφλοιωμένου σιταριού σπέλτα και αποτελείται κυρίως από θραύσματα των εξωτερικών περιβλημάτων και από τμήματα σπόρων από τα οποία έχει αφαιρεθεί μικρότερο μέρος του ενδοσπέρμιου από ότι στα πίτυρα σιταριού.	Κυτταρίνη
1.26	Πίτυρα σιταριού ⁽³⁾ (wheat bran)	Υποπροϊόν της αλευροποίησης, το οποίο λαμβάνεται από κοσκινισμένους σπόρους σιταριού ή αποφλοιωμένου σιταριού σπέλτα και το οποίο αποτελείται κυρίως από τμήματα των εξωτερικών περιβλημάτων και από τμήματα σπόρων από τα οποία έχει αφαιρεθεί το μεγαλύτερο μέρος του ενδοσπέρμιου.	Κυτταρίνη

Κωδικός αριθμός	Ονομασία	Έννοια	Υποχρεωτικές δηλώσεις
1	2	3	4
1.27	Φύτρα σιταριού	Υποπροϊόν της αλευροποίησης το οποίο αποτελείται κυρίως από φύτρα σιταριού, κυλινδρισμένα ή όχι, στα οποία ενδέχεται να παραμένουν τμήματα του ενδοσπέρμιου και εξωτερικού περιβλήματος.	Πρωτεΐνη Λάδι
1.28	Γλουτένη σιταριού	Αποξηραμένο υποπροϊόν της παραγωγής αμύλου σιταριού, το οποίο αποτελείται κυρίως από γλουτένη που προκύπτει κατά το διαχωρισμό του αμύλου.	Πρωτεΐνη
1.29	Κτηνοτροφική γλουτένη σιταριού	Υποπροϊόν της παραγωγής αμύλου σιταριού, το οποίο αποτελείται κυρίως από πίτυρο και γλουτένη και στο οποίο ενδέχεται να προστίθενται συστατικά του υγρού εμβάπτισης και μικρή ποσότητα φύτρου από το οποίο έχει αφαιρεθεί το λάδι.	Πρωτεΐνη Άμυλο
1.30	Άμυλο σιταριού	Τεχνικώς καθαρό άμυλο σιταριού.	Άμυλο
1.31	Προζελατινοποιημένο άμυλο σίτου	Προϊόν που αποτελείται από άμυλο σίτου προζελατινοποιημένο σε μεγάλο βαθμό με θερμική επεξεργασία.	Άμυλο
1.32	Σίτος σπέλτα	Κόκκοι του σιταριού σπέλτα <i>Triticum spelta</i> L., <i>Triticum diococcum</i> Schrank, <i>Triticum monococcum</i> εμπορικά καθαροί, όπως παράγονται.	
1.33	Τριτικάλε	Σπόροι του υβριδίου <i>Triticum X Secale</i> , εμπορικά καθαροί, όπως παράγονται.	
1.34	Αραβόσιτος (καλαμπόκι)	Σπόροι του <i>Zea mays</i> L., εμπορικά καθαροί, όπως παράγονται.	
1.35	Ψιλά πίτυρα αραβόσιτου (maize middlings)	Υποπροϊόν της παραγωγής αλεύρου ή σιμιγδαλιού από αραβόσιτο, το οποίο αποτελείται κυρίως από τμήματα των εξωτερικών περιβλημάτων και από τμήματα σπόρων από τους οποίους έχει αφαιρεθεί μικρότερο μέρος του ενδοσπέρμιου από ότι στο πίτυρο αραβόσιτου.	Κυτταρίνη

Κωδικός αριθμός	Ονομασία	Έννοια	Υποχρεωτικές δηλώσεις
1	2	3	4
1.36	Πίτυρα αραβόσιτου (maize bran)	Υποπροϊόν της παραγωγής αλεύρου ή σιμιγδαλιού από αραβόσιτο, το οποίο αποτελείται κυρίως από τα εξωτερικά περιβλήματα και μερικά τμήματα του φύτρου του αραβόσιτου, με μερικά τμήματα ενδοσπέρμιου.	Κυτταρίνη
1.37	Πλακούντας έκθλιψης φύτρων αραβόσιτου	Υποπροϊόν της ελαιουργίας το οποίο λαμβάνεται με έκθλιψη από ξηρά ή υγρά επεξεργασμένα φύτρα αραβόσιτου στα οποία ενδέχεται να έχει παραμείνει μέρος του ενδοσπέρμιου και των περιβλημάτων.	Πρωτεΐνη Λάδι
1.38	Εκχυλισμένα φύτρα αραβόσιτου	Υποπροϊόν της ελαιουργίας το οποίο λαμβάνεται με εκχύλιση από ξηρά ή υγρά επεξεργασμένα φύτρα αραβόσιτου στα οποία ενδέχεται να έχει παραμείνει μέρος του ενδοσπέρμιου και των περιβλημάτων.	Πρωτεΐνη
1.39	Κτηνοτροφική γλουτένη αραβόσιτου ⁽⁴⁾	Υποπροϊόν της παραγωγής αμύλου αραβόσιτου, το οποίο αποτελείται από πτίτυρο και γλουτένη όπου ενδέχεται να προστίθενται συστατικά του υγρού εμβάπτισης και μικρή ποσότητα φύτρου από το οποίο έχει αφαιρεθεί το λάδι.	Πρωτεΐνη Άμυλο Λάδι όταν είναι >4,5%
1.40	Γλουτένη αραβόσιου	Αποξηραμένο υποπροϊόν της παραγωγής αμύλου αραβόσιτου, το οποίο αποτελείται κυρίως από γλουτένη που λαμβάνεται κατά το διαχωρισμό του αμύλου.	Πρωτεΐνη
1.41	Άμυλο αραβόσιτου	Τεχνικώς καθαρό άμυλο αραβόσιτου.	
1.42	Προζελατινο- ποιημένο άμυλο αραβόσιτου ⁽⁵⁾	Άμυλο αραβόσιτου που υποβλήθηκε σε θερμική επεξεργασία, το οποίο έχει την ιδιότητα να διογκώνεται σημαντικά όταν έρχεται σε επαφή με κρύο νερό.	Άμυλο
1.43	Ριζίδια βύνης	Υποπροϊόν της βυνοποίησης το οποίο αποτελείται κυρίως από αποξηραμένα ριζίδια σιτηρών που έχουν βλαστήσει.	Πρωτεΐνη
1.44	Αποξηραμένοι σπόροι ζυθοποιίας	Υποπροϊόν της ζυθοποιίας, το οποίο λαμβάνεται με αποξήρανση υπολειμμάτων ζυμωθέντων ή μη σιτηρών και άλλων αμυλούχων προϊόντων.	Πρωτεΐνη

Κωδικός αριθμός	Ονομασία	Έννοια	Υποχρεωτικές δηλώσεις
1	2	3	4
1.45	Αποξηραμένοι σπόροι απόσταξης	Υποπροϊόν της απόσταξης αλκοόλης, το οποίο λαμβάνεται με αποξήρανση των στερεών υπολειμμάτων σπόρων που έχουν υποστεί ζύμωση.	Πρωτεΐνη
1.46	Σπόροι απόσταξης σκοτεινού χρώματος ⁽⁶⁾	Υποπροϊόν της απόσταξης το οποίο λαμβάνεται με αποξήρανση των στερεών υπολειμμάτων ζυμωθέντων σπόρων σιτηρών στα οποία έχει προστεθεί το σιροπώδες κατάλοιπο της απόσταξης ή τα εξατμισμένα απόνερα εμβάπτισης.	Πρωτεΐνη
1.47	Άλεσμένο ή κυλινδρισμένο κριθάρι	Το προϊόν άλεσης ή κυλίνδρισης σπόρων κριθαριού εμπορικά καθαρών, όπως παράγονται.	Κυτταρίνη
1.48	Νιφάδες κριθαριού	Το προϊόν που λαμβάνεται με άτμιση και κυλίνδρισμα των απολεπυρωμένων σπόρων κριθαριού εμπορικά καθαρών, όπως παράγονται.	Άμυλο Κυτταρίνη
1.49	Άλεσμένο ή κυλινδρισμένο σιτάρι	Το προϊόν άλεσης ή κυλίνδρισης σπόρων σιταριού εμπορικά καθαρών, όπως παράγονται.	Κυτταρίνη
1.50	Άλεσμένο ή κυλινδρισμένο σόργο	Το προϊόν άλεσης ή κυλίνδρισης σπόρων σόργου εμπορικά καθαρών, όπως παράγονται.	Κυτταρίνη
1.51	Άλεσμένη ή κυλινδρισμένη βρώμη	Το προϊόν άλεσης ή κυλίνδρισης σπόρων βρώμης εμπορικά καθαρών, όπως παράγονται.	Κυτταρίνη
1.52	Άλεσμένος ή κυλινδρισμένος αραβόσιτος	Το προϊόν άλεσης ή κυλίνδρισης σπόρων αραβόσιτου εμπορικά καθαρών, όπως παράγονται.	Κυτταρίνη
1.53	Νιφάδες αραβόσιτου	Το προϊόν που λαμβάνεται με άτμιση ή κυλίνδριση σπόρων αραβόσιτου εμπορικά καθαρών, όπως παράγονται.	Κυτταρίνη Άμυλο

⁽¹⁾ Η ονομασία μπορεί να συμπληρώνεται από ένδειξη του τύπου του άλατος

⁽²⁾ Η λέξη πλακούντας μπορεί να αντικαθίσταται, όπου εμφανίζεται, με τη λέξη «πίττα».

⁽³⁾ Σε περίπτωση που αυτή η πρώτη ύλη ζωοτροφών έχει υποβληθεί σε λεπτότερη άλεση, είναι δυνατόν, είτε να προστίθεται ο όρος «λεπτή» στην ονομασία της, είτε η ονομασία αυτή να αντικαθίσταται από κάποια άλλη αντίστοιχη.

⁽⁴⁾ Η ονομασία αυτή μπορεί να αντικαθίσταται από τον όρο «Corn gluten feed».

⁽⁵⁾ Η ονομασία αυτή, δυνατόν να αντικαθίσταται από την ονομασία «άμυλο αραβόσιτου που είναι προϊόν εξώθησης».

⁽⁶⁾ Η ονομασία αυτή, δυνατόν να αντικαθίσταται από την ονομασία «αποξηραμένοι κόκκοι απόσταξης και διαλυτά συστατικά».

2. ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ, ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΡΠΟΙ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΥΤΩΝ

Κωδικός αριθμός	Ονομασία	Έννοια	Υποχρεωτικές δηλώσεις
1	2	3	4
2.01	Μερικώς αποφλοιωμένος φυστικοπλακούντας	Υποπροϊόν της ελαιουργίας το οποίο λαμβάνεται με έκθλιψη από μερικώς αποφλοιωμένα φυστίκια (<i>Arachis hypogaea</i> L.) και άλλα είδη <i>Arachis</i> (μέγιστη περιεκτικότητα σε κυτταρίνη: 16% επί της ξηρής ουσίας).	Πρωτεΐνη Λάδι Κυτταρίνη
2.02	Εκχυλισμένο, μερικώς αποφλοιωμένο φυστικάλευρο	Υποπροϊόν της ελαιουργίας το οποίο λαμβάνεται με εκχύλιση από μερικώς αποφλοιωμένες αραχίδες (μέγιστη περιεκτικότητα σε κυτταρίνη: 16% επί της ξηρής ουσίας).	Πρωτεΐνη Κυτταρίνη
2.03	Αποφλοιωμένος φυστικοπλακούντας	Υποπροϊόν της ελαιουργίας, το οποίο λαμβάνεται με έκθλιψη σπόρων αποφλοιωμένων αραχίδων.	Πρωτεΐνη Λάδι Κυτταρίνη
2.04	Εκχυλισμένο, αποφλοιωμένο φυστικάλευρο	Υποπροϊόν της ελαιουργίας το οποίο λαμβάνεται με εκχύλιση σπόρων αποφλοιωμένων αραχίδων.	Πρωτεΐνη Κυτταρίνη
2.05	Σπόροι ελαιοκράμβης ⁽¹⁾	Σπόροι της ελαιοκράμβης <i>Brassica napus</i> L. ssp. <i>oleifera</i> (Metzg.) Sinsk., της ινδικής ελαιοκράμβης <i>Brassica napus</i> L. var. <i>glauca</i> (Roxb.) O.E. Schulz και της ελαιοκράμβης <i>Brassica campestris</i> L. ssp. <i>oleifera</i> (Metzg.) Sinsk (ελάχιστη βοτανική καθαρότητα: 94%).	
2.06	Πλακούντας σπόρων ελαιοκράμβης ⁽¹⁾	Υποπροϊόν της ελαιουργίας, το οποίο λαμβάνεται με έκθλιψη σπόρων ελαιοκράμβης (ελάχιστη βοτανική καθαρότητα: 94%).	Πρωτεΐνη Λάδι Κυτταρίνη
2.07	Εκχυλισμένο άλευρο ελαιοκράμβης ⁽¹⁾	Υποπροϊόν της ελαιουργίας, το οποίο λαμβάνεται με εκχύλιση σπόρων ελαιοκράμβης (ελάχιστη βοτανική καθαρότητα: 94%).	Πρωτεΐνη
2.08	Φλοιοί σπόρων ελαιοκράμβης	Υποπροϊόν το οποίο λαμβάνεται κατά την αποφλοίωση των σπόρων ελαιοκράμβης.	Κυτταρίνη

⁽¹⁾ Η διευκρίνιση «χαμηλής περιεκτικότητας σε γλυκοζινολικές ενώσεις» μπορεί να προστίθεται στην ονομασία εφόσον κρίνεται απαραίτητο. Η έννοια της χαμηλής αυτής περιεκτικότητας νοείται όπως ορίζεται στην νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κωδικός αριθμός	Ονομασία	Έννοια	Υποχρεωτικές δηλώσεις
1	2	3	4
2.09	Εκχυλισμένο άλευρο μερικώς αποφλοιωμένων σπόρων ατρακτυλίδος	Υποπροϊόν της ελαιουργίας, το οποίο λαμβάνεται με εκχύλιση μερικώς αποφλοιωμένων σπόρων ατρακτυλίδος <i>Carthamus tinctorius</i> L.	Πρωτεΐνη Κυτταρίνη
2.10	Πλακούντας φοινικοκαρύδων (corga expeller)	Υποπροϊόν της ελαιουργίας, το οποίο λαμβάνεται με έκθλιψη από τον αποξηραμένο πυρήνα (ενδοσπέρμιο) και το εξωτερικό περίβλημα (καλυπτήρια στοιβάδα) του σπόρου της φοινικοκαρυάς <i>Cocos nucifera</i> L.	Πρωτεΐνη Λάδι Κυτταρίνη
2.11	Εκχυλισμένο άλευρο φοινικοκαρύδων (extracted corga)	Υποπροϊόν της ελαιουργίας, το οποίο λαμβάνεται με εκχύλιση από τον αποξηραμένο πυρήνα (ενδοσπέρμιο) και το εξωτερικό περίβλημα (καλυπτήρια στοιβάδα) του σπόρου της φοινικοκαρυάς.	Πρωτεΐνη
2.12	Πλακούντας ελαίδας (palm Kernel expeller)	Υποπροϊόν της ελαιουργίας, το οποίο λαμβάνεται με έκθλιψη από τα σπέρματα ελαίδας <i>Elaeis guineensis</i> Jacq., <i>Corozo oleifera</i> (H.B.K.) –L.H. Bailey (<i>Elaeis melanococca</i> auct.) από τα οποία έχει, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, αφαιρεθεί το σκληρό κέλυφος.	Πρωτεΐνη Λάδι Κυτταρίνη
2.13	Εκχυλισμένο άλευρο ελαίδας (extracted, palm Kemet)	Υποπροϊόν της ελαιουργίας, το οποίο λαμβάνεται με εκχύλιση από σπέρματα ελαίδας από τα οποία έχει, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, αφαιρεθεί το σκληρό κέλυφος.	Πρωτεΐνη Κυτταρίνη
2.14	Καβουρδισμένη (-α) (σπέρματα) σόγια (-ς)	Σπέρματα σόγιας <i>Glycine max.</i> (L) Merr. που έχουν υποβληθεί σε κατάλληλη θερμική επεξεργασία.	
2.15	Εκχυλισμένο, καβουρδισμένο σογιάλευρο	Υποπροϊόν της ελαιουργίας, το οποίο λαμβάνεται από σπέρματα σόγιας, με εκχύλιση και κατάλληλη θερμική επεξεργασία (μέγιστη περιεκτικότητα σε κυτταρίνη: 8% επί της ξηρής ουσίας).	Πρωτεΐνη Κυτταρίνη
2.16	Εκχυλισμένο καβουρδισμένο, αποφλοιωμένο σογιάλευρο	Υποπροϊόν της ελαιουργίας, το οποίο λαμβάνεται από αποφλοιωμένα σπέρματα σόγιας με εκχύλιση και κατάλληλη θερμική επεξεργασία.	Πρωτεΐνη

Κωδικός αριθμός	Ονομασία	Έννοια	Υποχρεωτικές δηλώσεις
1	2	3	4
2.17	Συμπύκνωμα πρωτεϊνών από (σπέρματα) σόγια (-ς)	Υποπροϊόν της ελαιουργίας, το οποίο λαμβάνεται από αποφλοιωμένα σπέρματα σόγιας τα οποία έχουν υποβληθεί σε εκχύλιση για να απομακρυνθεί το λίπος τους.	Πρωτεΐνη
2.18	Φυτικό λάδι ⁽²⁾	Λάδι που προέρχεται από σπέρματα σόγιας.	Υγρασία, εάν >1%
2.19	Φλοιοί σπερμάτων σόγιας	Υποπροϊόν το οποίο λαμβάνεται κατά την αποφλοίωση σπερμάτων σόγιας.	Κυτταρίνη
2.20	Βαμβακόσπορος	Σπόροι βάμβακος <i>Gossypium ssp.</i> από τους οποίους έχουν αφαιρεθεί οι ίνες, εμπορικά καθαροί, όπως παράγονται.	Πρωτεΐνη Κυτταρίνη Λάδι
2.21	Εκχυλισμένο, μερικώς αποφλοιωμένο άλευρο βαμβακόσπορου	Υποπροϊόν της ελαιουργίας, το οποίο λαμβάνεται με εκχύλιση βαμβακόσπορων από τους οποίους έχουν αφαιρεθεί οι ίνες και μέρος του φλοιού (μέγιστη περιεκτικότητα σε κυτταρίνη: 22,5% επί της ξηρής ουσίας).	Πρωτεΐνη
2.22	Πλακούντας βαμβακόσπορου	Υποπροϊόν της ελαιουργίας, το οποίο λαμβάνεται με έκθλιψη βαμβακόσπορων από τους οποίους έχουν αφαιρεθεί οι ίνες.	Πρωτεΐνη Κυτταρίνη Λάδι
2.23	Πλακούντας σπόρων της γουιζοτίας της ελαιοφόρου	Υποπροϊόν της ελαιουργίας, το οποίο λαμβάνεται με έκθλιψη σπόρων της γουιζοτίας της ελαιοφόρου <i>Guizotia abyssinica</i> (L.F.) Cass (τέφρα αδιάλυτη σε HCl: ανώτατο όριο 3,4%).	Πρωτεΐνη Κυτταρίνη Λάδι
2.24	Ηλιανθόσπορος	Σπόροι του ηλιάνθου <i>Helianthus annuus</i> L. εμπορικά καθαροί, όπως παράγονται.	
2.25	Εκχυλισμένο άλευρο ηλιανθόσπορου	Υποπροϊόν της ελαιουργίας, το οποίο λαμβάνεται με εκχύλιση από ηλιανθόσπορους.	Πρωτεΐνη
2.26	Εκχυλισμένο, μερικώς αποφλοιωμένο άλευρο ηλιανθόσπορου	Υποπροϊόν της ελαιουργίας, το οποίο λαμβάνεται με εκχύλιση ηλιανθόσπορου από τον οποίο έχει αφαιρεθεί μέρος των φλοιών (μέγιστη περιεκτικότητα ουσίας σε κυτταρίνη: 27,5% επί της ξηρής ουσίας).	Πρωτεΐνη Κυτταρίνη

Κωδικός αριθμός	Ονομασία	Έννοια	Υποχρεωτικές δηλώσεις
1	2	3	4
2.27	Λιναρόσπορος	Σπόροι λίνου <i>Linum usitatissimum</i> L. (ελάχιστη βοτανική καθαρότητα: 93%)	
2.28	Πλακούντας λιναρόσπορου	Υποπροϊόν της ελαιουργίας, το οποίο λαμβάνεται με έκθλιψη από λιναρόσπορο (ελάχιστη βοτανική καθαρότητα: 93%).	Πρωτεΐνη Κυτταρίνη Λάδι
2.29	Εκχυλισμένο άλευρο λιναρόσπορου	Υποπροϊόν της ελαιουργίας, το οποίο λαμβάνεται με εκχύλιση από λιναρόσπορο (ελάχιστη βοτανική καθαρότητα: 93%).	Πρωτεΐνη
2.30	Ελαιάλευρο (πούλπα ελαιόκαρπου)	Υποπροϊόν της ελαιουργίας, το οποίο λαμβάνεται με εκχύλιση από πιεσμένες ελιές <i>Olea europaea</i> L. και από το οποίο έχουν αφαιρεθεί κατά το μέγιστο δυνατό βαθμό μέρη του πυρήνα.	Πρωτεΐνη Κυτταρίνη
2.31	Πλακούντας σησαμόσπορου	Υποπροϊόν της ελαιουργίας, το οποίο λαμβάνεται με έκθλιψη από τους σπόρους του σησαμιού <i>Sesamum indicum</i> L. (τέφρα αδιάλυτη σε HCl: ανώτατο όριο 5%).	Πρωτεΐνη Κυτταρίνη Λάδι
2.32	Εκχυλισμένο, μερικώς αποφλοιωμένο άλευρο σπόρων κακάο	Υποπροϊόν της ελαιουργίας, το οποίο λαμβάνεται με εκχύλιση από αποξηραμένα και ψημένα σπέρματα του κακάο <i>Theobroma cacao</i> L. από τα οποία έχει αφαιρεθεί μέρος του φλοιού.	Πρωτεΐνη Κυτταρίνη
2.33	Φλοιοί κακάο	Λέπυρα των αποξηραμένων και ψημένων σπερμάτων του <i>Theobroma cacao</i> L.	Κυτταρίνη
2.34	Πλακούντας πυρήνων του φοίνικα <i>Macoya</i>	Υποπροϊόν ελαιουργίας, λαμβανόμενο με πίεση από τους σπόρους που αποχωρίστηκαν από τη σάρκα του καρπού των ακόλουθων ειδών του φοίνικα <i>Macoya</i> : <i>Acrocomia sclerocarpa</i> Mart και <i>Arcocomia totai</i> Mart.	Πρωτεΐνη Κυτταρίνη Λάδι
2.34	Εκχυλισθέντες πυρήνες του φοίνικα <i>Macoya</i>	Υποπροϊόν ελαιουργίας, λαμβανόμενο με εκχύλιση σπόρων που αποχωρίστηκαν από τη σάρκα του καρπού (πούλπα) του καρπού του φοίνικα <i>Macoya</i> .	Πρωτεΐνη Κυτταρίνη

Κωδικός αριθμός	Ονομασία	Έννοια	Υποχρεωτικές δηλώσεις
1	2	3	4
2.35	Πούλπα του φοίνικα Macoya	Υποπροϊόν ελαιουργίας, λαμβανόμενο με πίεση από τη σάρκα (πούλπα) του καρπού του φοίνικα Macoya.	Πρωτεΐνη Κυτταρίνη Λάδι
2.36	Πλακούντας των καρύων του φοίνικα Babassu	Υποπροϊόν ελαιουργίας, λαμβανόμενο με πίεση από τα κάρυα (μετά την απομάκρυνση όσον το δυνατό περισσότερου μέρους του σκληρού κελύφους) του Βραζιλιανού φοίνικα Babassu, Orbignya oleifera Burf και λοιπών ειδών του Orbignya.	Πρωτεΐνη Κυτταρίνη Λάδι

(1) Η διευκρίνιση «χαμηλής περιεκτικότητας σε γλυκοζινολικές ενώσεις» μπορεί να προστίθεται στην ονομασία εφόσον κρίνεται απαραίτητο. Η έννοια της χαμηλής αυτής περιεκτικότητας νοείται όπως ορίζεται στην νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(2) Το φυτικό είδος πρέπει να προστίθεται στην ονομασία.

3. ΣΠΕΡΜΑΤΑ ΨΥΧΑΝΘΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΥΤΩΝ

Κωδικός αριθμός	Ονομασία	Έννοια	Υποχρεωτικές δηλώσεις
1	2	3	4
3.01	Ρεβύθια	Σπέρματα του <i>Cicer arietinum</i> L. εμπορικά καθαρά, όπως παράγονται.	
3.02	Άλευρο εκχυλισμένων σπερμάτων κυάμωσης	Υποπροϊόν που λαμβάνεται από εκχύλιση του γλισχράσματος σπερμάτων του φυτού <i>Cyamopsis tetragonoloba</i> (L.) Taub.	Πρωτεΐνη
3.03	Ρόβη	Σπέρματα του <i>Ervum ervilia</i> L. εμπορικά καθαρά, όπως παράγονται.	
3.04	Λάφυθος ⁽¹⁾	Σπέρματα του <i>Lathyrus sativus</i> L., που έχουν υποστεί κατάλληλη θερμική επεξεργασία, εμπορικά καθαρά, όπως παράγονται.	
3.05	Φακή	Σπέρματα του <i>Lens culinaris</i> a.o. Medik. εμπορικά καθαρά, όπως παράγονται.	
3.06	Γλυκά λούπινα	Σπέρματα του <i>Lupinus</i> spp., χαμηλής περιεκτικότητας σε πικρά σπέρματα, εμπορικά καθαρά, όπως παράγονται.	
3.07	Καβουρδισμένα φασόλια	Σπέρματα του <i>Phaseolus</i> ή <i>Vigna</i> spp., τα οποία έχουν υποβληθεί σε κατάλληλη θερμική επεξεργασία για την καταστροφή των τοξικών λεκτινών, εμπορικά καθαρά, όπως παράγονται.	
3.08	Πιζέλι	Σπέρματα του <i>Pisum</i> spp. εμπορικά καθαρά, όπως παράγονται.	
3.09	Ψιλά πίτυρα πιζελιού	Υποπροϊόν το οποίο λαμβάνεται κατά την παραγωγή αλεύρου από πιζέλια και το οποίο αποτελείται κυρίως από τεμάχια των κοτυληδόνων και, σε μικρότερο βαθμό, των φλοιών.	Πρωτεΐνη Κυτταρίνη
3.10	Πίτυρο πιζελιού	Υποπροϊόν το οποίο λαμβάνεται κατά την παραγωγή χονδράλευρου από πιζέλια και το οποίο αποτελείται κυρίως από φλοιούς που απομακρύνονται με την αποφλοιώση και το καθάρισμα των πιζελιών.	Κυτταρίνη

⁽¹⁾ Η ονομασία αυτή μπορεί να συνοδεύεται από ένδειξη της φύσης της θερμικής επεξεργασίας

Κωδικός αριθμός	Ονομασία	Έννοια	Υποχρεωτικές δηλώσεις
1	2	3	4
3.11	Κουκκιά	Σπέρματα των <i>Vicia faba</i> L. ssp. <i>faba</i> var. <i>equina</i> Pers. and var. <i>minuta</i> (Alef.) Mansf. εμπορικά καθαρά, όπως παράγονται.	
3.12	Βίκος ο μόνανθος	Σπέρματα του <i>Vicia monanthos</i> Desf. εμπορικά καθαρά, όπως παράγονται.	
3.13	Βίκος	Σπέρματα του <i>Vicia sativa</i> L. var. <i>sativa</i> και άλλων ποικιλιών, εμπορικά καθαρά, όπως παράγονται.	
3.14	Καβουρδισμένα αλεσμένα φασόλια	Το προϊόν άλεσης, εμπορικά καθαρών φασολιών των ειδών <i>rhoseolus</i> spp. ή <i>Vigna</i> spp.	Πρωτεΐνη Κυτταρίνη
3.15	Αλεσμένα πιζέλια	Το προϊόν άλεσης, εμπορικά καθαρών πιζελιών του είδους <i>Pisum</i> spp.	Πρωτεΐνη Κυτταρίνη
3.16	Αλεσμένα κουκιά	Το προϊόν άλεσης, εμπορικά καθαρών κουκκιών του είδους <i>Vicia faba</i> .	Πρωτεΐνη Κυτταρίνη
3.17	Αλεσμένος βίκος	Το προϊόν άλεσης, εμπορικά καθαρού βίκου του είδους <i>Vicia sativa</i> L.	Πρωτεΐνη Κυτταρίνη

4. ΚΟΝΔΥΛΟΙ, ΡΙΖΕΣ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΥΤΩΝ

Κωδικός αριθμός	Ονομασία	Έννοια	Υποχρεωτικές δηλώσεις
1	2	3	4
4.01	Πούλπα (ζάχαρο) τεύτλων	Υποπροϊόν της ζαχαροποίησης, το οποίο αποτελείται από αποξηραμένα τεμάχια ζαχαροτεύτλων που προκύπτουν κατά την επεξεργασία της εκχύλισης του <i>Beta vulgaris</i> L. ssp. <i>vulgaris</i> var. <i>altissima</i> Doell (μέγιστη περιεκτικότητα σε τέφρα αδιάλυτη σε HCl: 3,5% επί της ξηρής ουσίας).	Ολικό σάκχαρο εκφρασμένο σε σουκρόζη όταν είναι >10,5% Αδιάλυτη τέφρα σε HCl, εάν >3,5% επί ξηρής ουσίας
4.02	Μελάσσα (ζάχαρο) τεύτλων	Υποπροϊόν το οποίο αποτελείται από το σιροπώδες υπόλειμμα που συλλέγεται κατά την παραγωγή ή τη διύλιση ζάχαρης από τεύτλα (μέγιστη περιεκτικότητα σε υγρασία: 25%).	Ολικό σάκχαρο εκφρασμένο σε σουκρόζη Υγρασία αν είναι >28%

Κωδικός αριθμός	Ονομασία	Έννοια	Υποχρεωτικές δηλώσεις
1	2	3	4
4.03	Μελασσωμένη πούλπα (ζάχαρο) τεύτλων	Υποπροϊόν της ζαχαροποίησης, το οποίο περιέχει αποξηραμένη πούλπα ζαχαροτεύτλων στην οποία έχει προστεθεί μελάσσα.	Ολικό σάκχαρο εκφρασμένο σε σουκρόζη τέφρα αδιάλυτη στο HCl, αν είναι >3,5% επί ξηρής ουσίας
4.04	Βινάσσα (ζάχαρο) τεύλων	Υποπροϊόν το οποίο λαμβάνεται μετά τη ζύμωση της μελάσσας ζαχαροτεύτλων κατά την παραγωγή αλκοόλης, ζύμης, κιτρικού οξέος ή άλλων οργανικών ενώσεων.	Πρωτεΐνη Υγρασία, αν >35%
4.05	Ζάχαρη (ζάχαρο) τεύτλων ⁽¹⁾	Ζάχαρη που λαμβάνεται από τα ζαχαρότευτλα.	Σουκρόζη
4.06	Γλυκοπατάτες	Κόνδυλο του <i>Ipomea batatas</i> L Poir, ανεξάρτητα από τη μορφή τους	Άμυλο
4.07	Μανιόκα (κασσάβα) ή ταπιόκα	Ρίζες του <i>Manihot esculenta</i> Crantz, ανεξάρτητα από τη μορφή τους.	Άμυλο
4.08	Προζελατινοποιημένο άμυλο μανιόκας	Άμυλο το οποίο λαμβάνεται από ρίζες μανιόκας, και το οποίο υποβάλλεται σε κατάλληλη θερμική επεξεργασία για να αυξηθεί πολύ ο όγκος του.	Άμυλο
4.09	Πούλπα γεωμήλων	Υποπροϊόν της εκχύλισης του αμύλου πατάτας <i>Solanum tuberosum</i> L.	
4.10	Άμυλο γεωμήλων	Τεχνικώς καθαρό άμυλο γεωμήλων.	Άμυλο
4.11	Πρωτεΐνη γεωμήλων	Αποξηραμένο υποπροϊόν της παραγωγής αμύλου, το οποίο αποτελείται κυρίως από πρωτεϊνούχες ουσίες που προκύπτουν μετά το διαχωρισμό του αμύλου.	Πρωτεΐνη
4.12	Νιφάδες γεωμήλων	Προϊόν που λαμβάνεται με περιστρεφόμενη αποξήρανση πλυμένων, ξεφλουδισμών ή μη ξεφλουδισμών και μερικώς βρασμένων γεωμήλων.	Άμυλο κυτταρίνη
4.13	Συμπυκνωμένος χυμός γεωμήλων	Κατάλοιπο της παραγωγής αμύλου από γεώμηλα, από το οποίο έχουν αφαιρεθεί ένα μέρος των πρωτεϊνών και του ύδατος.	Πρωτεΐνη Ακατέργαστη τέφρα
4.14	Προζελατινοποιημένο άμυλο γεωμήλων	Προϊόν το οποίο αποτελείται από άμυλο γεωμήλων, προζελατινοποιημένο σε μεγάλο βαθμό.	Άμυλο

⁽¹⁾ Η ονομασία αυτή μπορεί να αντικαθίσταται από την ονομασία «σουκρόζη».

5. ΑΛΛΟΙ ΣΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΙ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΥΤΩΝ

Κωδικός αριθμός	Ονομασία	Έννοια	Υποχρεωτικές δηλώσεις
1	2	3	4
5.01	Χαρουπάλευρο	Προϊόν το οποίο λαμβάνεται με σύνθλιψη του αποξηραμένου καρπού (λοβών) της χαρουπιάς <i>Ceratonia siliqua</i> L. απ' όπου έχουν αφαιρεθεί τα σπέρματα.	Κυτταρίνη
5.02	Πούλπα εσπεριδοειδών	Υποπροϊόν το οποίο λαμβάνεται με πίεση εσπεριδοειδών <i>Citrus</i> spp. κατά την παραγωγή χυμού εσπεριδοειδών.	Κυτταρίνη
5.03	Πούλπα μήλων	Υποπροϊόν το οποίο λαμβάνεται με πίεση μήλων <i>Malus</i> spp. κατά την παραγωγή τοματοχυμού.	Κυτταρίνη
5.04	Πούλπα τομάτας	Υποπροϊόν το οποίο λαμβάνεται με πίεση τοματών <i>Solanum Lychoopersicum</i> Karst. κατά την παραγωγή τοματοχυμού.	Κυτταρίνη
5.05	Πούλπα σταφυλιών	Υποπροϊόν της μεταποίησης των σταφυλιών <i>Vitis vinifera</i> L. το οποίο παραμένει μετά την έκθλιψη του χυμού.	Κυτταρίνη
5.06	Εκχυλισμένα γίγαρτα σταφυλιών	Υποπροϊόν της μεταποίησης των σταφυλιών, το οποίο αποτελείται από εκχυλισμένα γίγαρτα και είναι σχεδόν ελεύθερο άλλων συστατικών.	Κυτταρίνη

6. ΣΥΓΚΟΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΧΟΝΔΡΟΕΙΔΕΙΣ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΙΝΩΔΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ

Κωδικός αριθμός	Ονομασία	Έννοια	Υποχρεωτικές δηλώσεις
1	2	3	4
6.01	Μηδικάλευρο ⁽¹⁾	Προϊόν το οποίο λαμβάνεται με ξήρανση και άλεση νεαρών φυτών μηδικής <i>Medicago sativa</i> L. και <i>Medicago varia</i> Martyn (ελάχιστη βοτανική καθαρότητα: 80%) (τέφρα αδιάλυτη σε HCl: ανώτατο όριο 3,4%).	Πρωτεΐνη Κυτταρίνη Τέφρα αδιάλυτη στο υδροχλωρικό οξύ εάν είναι >3,5% επί ξηρής ουσίας

Κωδικός αριθμός	Ονομασία	Έννοια	Υποχρεωτικές δηλώσεις
1	2	3	4
6.04	Τριφυλλάλευρο ⁽¹⁾	Προϊόν το οποίο λαμβάνεται με ξήρανση και άλεση νεαρών φυτών τριφυλλίου <i>Trifolium</i> spp. (ελάχιστη βοτανική καθαρότητα: 80%) (τέφρα αδιάλυτη σε HCl: ανώτατο όριο 3,4%).	Πρωτεΐνη Κυτταρίνη Τέφρα αδιάλυτη στο HCl αν είναι >3,5% επί ξηρής ουσίας
6.05	Άλευρο χλόης ⁽¹⁾	Προϊόν το οποίο λαμβάνεται με ξήρανση και άλεση νεαρών κτηνοτροφικών φυτών (τέφρα αδιάλυτη σε HCl: ανώτατο όριο 3,4%).	Πρωτεΐνη Κυτταρίνη Τέφρα αδιάλυτη στο HCl αν είναι >3,5% επί ξηρής ουσίας
6.06	Άχυρο σιταριού	Άχυρο σιταριού.	
6.07	Επεξεργασμένο άχυρο δημητριακών ⁽²⁾	Προϊόν το οποίο λαμβάνεται με κατάλληλη επεξεργασία αχύρων δημητριακών	Πρωτεΐνη ΜΠΑ, αν έχει γίνει επεξεργασία με αμμωνία, Νάτριο, αν έχει γίνει επεξεργασία με NaOH.

⁽¹⁾ Ο όρος «άλευρο» είναι δυνατόν να αντικαθίσταται από τον όρο «σύμπηκτα». Η μέθοδος ξήρανσης μπορεί να αναφέρεται

⁽²⁾ Η ονομασία μπορεί να συμπληρώνεται με αναφορά στη φύση της χημικής επεξεργασίας

7. ΆΛΛΑ ΦΥΤΑ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΥΤΩΝ

7.01	Μελάσσα ζαχαροκάλαμου	Υποπροϊόν το οποίο αποτελείται από το σιροπώδες υπόλειμμα που συλλέγεται κατά την παραγωγή ή τη διύλιση ζάχαρης ζαχαροκάλαμου <i>Sacharum officinarum</i> L. (μέγιστη περιεκτικότητα σε υγρασία: 25%).	Ολικό σάκχαρο εκφρασμένο σε σουκρόζη Υγρασία, αν>30%
------	-----------------------	--	--

Κωδικός αριθμός	Ονομασία	Έννοια	Υποχρεωτικές δηλώσεις
1	2	3	4
7.02	Βινάσσα σαχαροκάλαμου	Υποπροϊόν το οποίο λαμβάνεται μετά τη ζύμωση της μελάσσας ζαχαροκάλαμου κατά την παραγωγή αλκοολών, ζύμης, κιτρικού οξέος ή άλλων οργανικών ενώσεων.	Πρωτεΐνη Υγρασία, αν>35%
7.03	Ζαχαρη (ζαχαροκάλαμου) ⁽¹⁾	Ζάχαρη που λαμβάνεται από το ζαχαροκάλαμο.	Σουκρόζη
7.04	Άλευρο φυκών	Προϊόν το οποίο λαμβάνεται με ξήρανση και σύνθλιψη φυκών, ιδίως φαιοφυκών. Το προϊόν αυτό είναι δυνατόν να έχει υποστεί πλύση για να μειωθεί η περιεκτικότητα του σε ιώδιο.	Ολική τέφρα

⁽¹⁾ Η ονομασία αυτή μπορεί να αντικαθίσταται από την ονομασία «σουκρόζη»

8. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

Κωδικός αριθμός	Ονομασία	Έννοια	Υποχρεωτικές δηλώσεις
1	2	3	4
8.01	Σκόνη αποβουτυρομένου γάλακτος (skimmed milk powder)	Προϊόν το οποίο λαμβάνεται με ξήρανση γάλακτος από το οποίο έχει αφαιρεθεί το μεγαλύτερο μέρος των λιπαρών ουσιών.	Πρωτεΐνη Υγρασία, αν >5%
8.02	Σκόνη βουτυρογάλακτος (buttermilk powder)	Προϊόν το οποίο λαμβάνεται με ξήρανση του βουτυρογάλακτος, δηλ. του υγρού που παραμένει μετά την επεξεργασία της κρέμας και την αφαίρεση του βουτύρου.	Πρωτεΐνες Λίπος Λακτόζη Υγρασία, αν>6% Ολική τέφρα
8.03	Σκόνη τυρογάλακτο (Σκόνη ορρού γάλακτος) (whey powder)	Προϊόν το οποίο λαμβάνεται με ξήρανση του υγρού που παραμένει μετά την παρασκευή τυριού, quark, καζείνης ή παρόμοιες επεξεργασίες.	Πρωτεΐνη Λακτόζη Υγρασία, αν>8% Ολική τέφρα
8.04	Σκόνη τυρογάλακτο χαμηλής περιεκτικότητας σε ζάχαρο	Προϊόν το οποίο λαμβάνεται με ξήρανση ορρού γάλακτος από την οποία έχει αφαιρεθεί μέρος της λακτόζης.	Πρωτεΐνη Λακτόζη Υγρασία, αν>8% Ολική τέφρα
8.05	Σκόνη πρωτεΐνης τυρογάλακτος ⁽¹⁾	Προϊόν το οποίο λαμβάνεται με ξήρανση των πρωτεϊνικών ενώσεων που λαμβάνονται από το τυρόγαλα ή το γάλα με χημική ή φυσική επεξεργασία.	Πρωτεΐνη Υγρασία, αν>8%

⁽¹⁾ Η ονομασία αυτή μπορεί να αντικαθίσταται από την ονομασία «σκόνη αλβουμίνης γάλακτος»

Κωδικός αριθμός	Ονομασία	Έννοια	Υποχρεωτικές δηλώσεις
1	2	3	4
8.06	Σκόνη καζείνης	Προϊόν το οποίο λαμβάνεται από αποκορυφωμένο γάλα ή βουτυρόγαλα δια ξηράνσεως καζείνης που κατακρημνίζεται με τη βοήθεια οξέων ή πυτιάς.	Πρωτεΐνη Υγρασσία, αν>10%
8.07	Σκόνη λακτόζης	Σάκχαρο, διαχωριζόμενο από το γάλα ή το τυρόγαλα με καθαρισμό και ξήρανση.	Λακτόζη Υγρασσία, αν>5%

⁽¹⁾ Η ονομασία αυτή μπορεί να αντικαθίσταται από την ονομασία «σκόνη αλβουμίνης γάλακτος»

9. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΖΩΩΝ

Κωδικός αριθμός	Ονομασία	Έννοια	Υποχρεωτικές δηλώσεις
1	2	3	4
9.01	Κρεατάλευρο	Προϊόν το οποίο λαμβάνεται από θέρμανση, ξήρανση και άλεση ολόκληρων σφαγίων ή μερών σφαγίων θερμόαιμων χερσαίων ζώων από τα οποία ενδέχεται να έχει αφαιρεθεί μέρος του λίπους με εκχύλιση ή με άλλο φυσικό διαχωρισμό. Το προϊόν αυτό πρέπει να είναι ουσιαστικά απαλλαγμένο από τρίχες, φτερά, κέρατα, οπλές, καθώς και από το περιεχόμενο του πεπτικού σωλήνα (ελάχιστη περιεκτικότητα σε ολικές αζωτούχες ουσίες, 50% επί της ξηρής ουσίας) (τέφρα αδιάλυτη σε HCl: ανώτατο όριο 2,2%).	Πρωτεΐνη Λίπος Ολική τέφρα
9.02	Οστεοκρεατάλευρο ⁽¹⁾	Προϊόν το οποίο λαμβάνεται από θέρμανση, ξήρανση και άλεση σφαγίων ή μερών σφαγίων θερμόαιμων χερσαίων ζώων από τα οποία ενδέχεται να έχει αφαιρεθεί μέρος του λίπους με εκχύλιση ή με άλλο φυσικό διαχωρισμό. Το προϊόν αυτό πρέπει να είναι ουσιαστικά απαλλαγμένο από τρίχες, φτερά, κέρατα, οπλές, καθώς και από το περιεχόμενο του πεπτικού σωλήνα.	Πρωτεΐνη Ολική τέφρα
9.03	Οστεάλευρο	Προϊόν το οποίο λαμβάνεται από θέρμανση, λεπτή άλεση και ξήρανση οστών θερμόαιμων χερσαίων ζώων από τα οποία έχει αφαιρεθεί μεγάλο μέρος του λίπους με εκχύλιση ή με άλλο φυσικό διαχωρισμό. Το προϊόν αυτό πρέπει να είναι ουσιαστικά απαλλαγμένο από τρίχες, φτερά, κέρατα, οπλές, καθώς και από το περιεχόμενο του πεπτικού σωλήνα.	Πρωτεΐνη Ολική τέφρα

Κωδικός αριθμός	Ονομασία	Έννοια	Υποχρεωτικές δηλώσεις
1	2	3	4
9.04	Υπολείμματα βιομηχανίας ζωικού λίπους	Υπόλειμμα που απομένει στη βιομηχανία βοείου λίπους και άλλων ζωικών λιπών μετά την αφαίρεσή τους με εκχύλιση ή με άλλο φυσικό διαχωρισμό.	Πρωτεΐνη Λίπος
9.05	Υπολείμματα σφαγίων πουλερικών ⁽¹⁾	Προϊόν το οποίο λαμβάνεται με ξήρανση και άλεση υπολειμμάτων από σφαγμένα πουλερικά. Το προϊόν αυτό πρέπει να είναι ουσιαστικά απαλλαγμένο από φτερά. (τέφρα αδιάλυτη σε HCl: ανώτατο όριο 3,3%).	Πρωτεΐνη Λίπος Ολική τέφρα Τέφρα αδιάλυτη στο HCl, αν>3,3% Υγρασία, αν>8%
9.06	Υδρολυμένο πετράλευρο	Προϊόν το οποίο λαμβάνεται με ξήρανση του αίματος σφαγμένων θερμόαιμων ζώων. Το προϊόν αυτό πρέπει να είναι ουσιαστικά απαλλαγμένο από ξένες προσμίξεις.	Πρωτεΐνη Υγρασία, αν>8%
9.07	Αιματάλευρο	Προϊόν το οποίο λαμβάνεται με ξήρανση του αίματος σφαγμένων θερμόαιμων ζώων. Το προϊόν αυτό πρέπει να είναι ουσιαστικά απαλλαγμένο από ξένες προσμίξεις.	Πρωτεΐνη Υγρασία, αν>8%
9.08	Ζωικό λίπος ⁽²⁾	Προϊόν το οποίο αποτελείται από λίπος από θερμόαιμα χερσαία ζώα.	Υγρασία, αν>1%

⁽¹⁾ Προϊόντα των οποίων η περιεκτικότητα σε λίπος υπερβαίνει το 13% επί της ξηρής ουσίας, πρέπει να ονομάζονται «πλούσια σε λίπος».

⁽²⁾ Η ονομασία αυτή να συμπληρώνεται από ακριβέστερη ένδειξη του είδους του ζωικού λίπους σε συνάρτηση με την προέλευσή του, ή του τρόπου με τον οποίο λαμβάνεται (βόειο λίπος, χοιρινό λίπος, λίπος οστών, λιωμένο λίπος κλπ).

10. ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΑ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΥΤΩΝ

Κωδικός αριθμός	Ονομασία	Έννοια	Υποχρεωτικές δηλώσεις
1	2	3	4
10.01	Ιχθυάλευρο ⁽¹⁾	Προϊόν το οποίο λαμβάνεται με επεξεργασία ολόκληρων ψαριών ή μερών αυτών από τα οποία ενδέχεται να έχει αφαιρεθεί μέρος του λαδιού και στα οποία ενδέχεται να έχουν επαναπροστεθεί τα διαλυτά συστατικά ψαριών	Πρωτεΐνη Λίπος Ολική τέφρα, αν>20% Υγρασία, αν>8%

Κωδικός αριθμός	Ονομασία	Έννοια	Υποχρεωτικές δηλώσεις
1	2	3	4
10.02	Συμπυκνωμένα διαλυτά συστατικά ψαριών	Σταθεροποιημένο προϊόν το οποίο αποτελείται από το υγρό πρέσσεως που προκύπτει κατά την παραγωγή ιχθυαλεύρου αφού αφαιρεθούν απ' αυτό μεγάλο μέρος του λαδιού και μέρος του νερού.	Πρωτεΐνη Λίπος Υγρασία, αν>5%
10.03	Ιχθυέλαιο	Λάδι που λαμβάνεται από τα ψάρια	Υγρασία, αν>1%
10.04	Ραφινρισμένο και υδρογονωμένο (σκληρυνθέν) ιχθυέλαιο	Ιχθυέλαιο το οποίο λαμβάνεται από ψάρια και το οποίο έχει διυλισθεί και υποβληθεί σε υδρογόνωση	Βαθμός ιωδίου Υγρασία, αν>1%

⁽¹⁾ Προϊόντα τα οποία περιέχουν άνω του 75% ολικών αζωτούζων ουσιών επί της ξηρής ουσίας μπορεί να ονομάζονται «πλούσια σε πρωτεΐνη».

11. ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΥΛΕΣ

Κωδικός αριθμός	Ονομασία	Έννοια	Υποχρεωτικές δηλώσεις
1	2	3	4
11.01	Ανθρακικό ασβέστιο ⁽¹⁾	Προϊόν το οποίο λαμβάνεται με άλεση από υλικά που αποτελούν πηγές αθρακικού ασβεστίου, όπως είναι ο ασβεστόλιθος, τα όστρακα των στρειδιών και των μυδιών, ή με καθίζηση από όξινο διάλυμα	Ασβέστιο Τέφρα αδιάλυτη στο HCl, αν >5%
11.02	Ανθρακικό ασβέστιο και μαγνήσιο	Φυσικό μίγμα ανθρακικού ασβεστίου και ανθρακικού μαγνησίου	Ασβέστιο Μαγνήσιο
11.03	Ασβεστούχα θαλάσσια φύκη (Maërl)	Προϊόν φυσικής προελεύσεως, το οποίο λαμβάνεται από ασβεστούχα φύκη που έχουν αλεσθεί ή κοκκοποιηθεί	Ασβέστιο Τέφρα αδιάλυτη στο HCl, αν>5%
11.04	Οξείδιο του μαγνησίου	Τεχνικώς καθαρό οξείδιο του μαγνησίου (MgO)	Μαγνήσιο
11.05	Θεικό μαγνήσιο	Φυσικό θεικό μαγνήσιο (MgSO ₄ ·H ₂ O) (MgSO ₄ ·7H ₂ O)	Μαγνήσιο Θειάφι
11.06	Φωσφορικό διασβέστιο ⁽²⁾	Μονόξινο φωσφορικό ασβέστιο που λαμβάνεται με καθίζηση από οστά ή ανόργανες πηγές (CaHPO ₄ ·x H ₂ O)	Ασβέστιο Ολικός φώσφορος

⁽¹⁾ Η μέθοδος παρασκευής μπορεί να περιλαμβάνεται στην ονομασία.

⁽²⁾ Η φύση της πηγής δυνάτον να αντικαθιστά ή να συμπληρώνει επιπλέον την ονομασία.

Κωδικός αριθμός	Ονομασία	Έννοια	Υποχρεωτικές δηλώσεις
1	2	3	4
11.07	Φωσφορικό μονοδιασβέστιο	Προϊόν το οποίο λαμβάνεται χημικώς και αποτελείται από ίσα μέρη φωσφορικού διασβεστίου και μονοασβεστίου [CaHPO ₄ – Ca (H ₂ PO ₄) ₂ ·H ₂ O]	Ολικός φώσφορος Ασβέστιο
11.08	Αποφθοριωμένο ορυκτό φωσφορικό άλας	Προϊόν το οποίο λαμβάνεται με άλεση καθαρισμένων και καταλλήλως αποφθοριωμένων φυσικών φωσφορικών αλάτων	Ολικός φώσφορος Ασβέστιο
11.09	Αποζελατινοποιημένο οστεάλευρο	Προϊόν το οποίο λαμβάνεται με αποζελατινοποίηση, αποστείρωση και άλεση οστών από τα οποία έχει αφαιρεθεί το λίπος	Ολικός φώσφορος Ασβέστιο
11.10	Φωσφορικό μονασβέστιο	Τεχνικώς καθαρό φωσφορικό μονασβέστιο [Ca (H ₂ PO ₄) ₂ ·xH ₂ O]	Ολικός φώσφορος Ασβέστιο
11.11	Φωσφορικό άλας ασβεστίου-μαγνησίου	Τεχνικώς καθαρό φωσφορικό άλας ασβεστίου - μαγνησίου	Ασβέστιο Μαγνήσιο Ολικός φώσφορος
11.12	Φωσφορικό μοναμμώνιο	Τεχνικώς καθαρό φωσφορικό μονοαμμώνιο (NH ₄ H ₂ PO ₄)	Ολικό άζωτο Ολικός φώσφορος
11.13	Χλωριούχο νάτριο ⁽¹⁾	Τεχνικώς καθαρό χλωριούχο νάτριο ή προϊόν το οποίο λαμβάνεται με άλεση φυσικών πηγών χλωριούχου νατρίου, όπως είναι το ορυκτό και το θαλασσινό αλάτι	Νάτριο
11.14	Προπιονικό μαγνήσιο	Τεχνικώς καθαρό προπιονικό μαγνήσιο	Μαγνήσιο
11.15	Φωσφορικό μαγνήσιο	Προϊόν το οποίο αποτελείται από φωσφορικό μαγνήσιο (MgHPO ₄ ·xH ₂ O)	Ολικός φώσφορος Μαγνήσιο
11.16	Φωσφορικά άλατα νατρίου, ασβεστίου, μαγνησίου	Προϊόν το οποίο αποτελείται από φωσφορικά άλατα νατρίου, ασβεστίου, μαγνησίου	Ολικός φωσφόρος Μαγνήσιο Ασβέστιο Νάτριο
11.17	Φωσφορικό νάτριο	Φωσφορικό νάτριο (NaH ₂ PO ₄ · H ₂ O), τεχνικώς καθαρό	Ολικός φώσφορος Νάτριο
11.18	Δισανθρακικό νάτριο	Δισανθρακικό νάτριο (NaHCO ₃) χημικώς καθαρό	Νάτριο

⁽¹⁾ Η φύση της πηγής δυνατόν να αντικαθιστά ή να συμπληρώνει επιπλέον την ονομασία.

12. ΔΙΑΦΟΡΑ

Κωδικός αριθμός	Ονομασία	Έννοια	Υποχρεωτικές δηλώσεις
1	2	3	4
12.01	Υπολείμματα αρτοποιίας και της βιομηχανίας ζυμαρικών ⁽¹⁾	Υποπροϊόν που λαμβάνεται κατά την παραγωγή μπισκότων, γλυκισμάτων τύπου κέικ, ψωμιού και ζυμαρικών	Άμυλο Ολικό σάκχαρο εκφρασμένο σε σουκρόζη
12.02	Σακχαρώδη προϊόντα και υποπροϊόντα σαχαροπλαστικής	Υποπροϊόν που λαμβάνεται κατά την παραγωγή σοκολάτας καραμελών και άλλων ειδών ζαχαροπλαστικής	Άμυλο Ολικό σάκχαρο εκφρασμένο σε σουκρόζη
12.03	Προϊόντα και υποπροϊόντα ζαχαροπλαστικής και παγωτών	Προϊόντα ή υποπροϊόντα που λαμβάνονται κατά την παραγωγή προϊόντων ζαχαροπλαστικής, γλυκών ή παγωτών	Άμυλο Ολικό σάκχαρο εκφρασμένο σε σουκρόζη Λίπος
12.04	Λιπαρά οξέα	Υποπροϊόν που λαμβάνεται από λάδια και λίπη μη προσδιοριζόμενης φυτικής ή ζωικής προέλευσης, κατά την εξουδετέρωση των οξέων τους με χρήση καυστικών αλκάλων ή με απόσταξη	Λίπος Υγρασία, αν>1%
12.05	Άλατα λιπαρών οξέων ⁽¹⁾	Προϊόν που λαμβάνεται με σαπωνοποίηση λιπαρών οξέων με υδροξείδιο του ασβεστίου, του νατρίου ή του καλίου.	Λίπος Ca (ή Na ή K, ανάλογα με την περίπτωση)

⁽¹⁾ Η ονομασία μπορεί να συμπληρώνεται από ένδειξη του τύπου του άλατος.

ΠΙΝΑΚΑΣ II
(Παράγραφος 4)
ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1, ΜΕΡΟΣ Β, ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ
ΜΗ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΜΕΡΟΣ Α

Α/Α	Κατηγορία πρώτων υλών	Υποχρεωτικές δηλώσεις ⁽¹⁾
	1	2
1.	Σπόροι σιτηρών	
2.	Προϊόντα και υποπροϊόντα σπόρων σιτηρών	Άμυλο, όταν είναι >20% Πρωτεΐνη, όταν είναι >10% Λίπος, όταν είναι >5% Κυτταρίνη
3.	Ελαιούχοι σπόροι, ή καρποί	
4.	Προϊόντα και υποπροϊόντα ελαιούχων σπόρων ή καρπών	Πρωτεΐνη, όταν είναι >10% Λίπος όταν είναι >5% Κυτταρίνη
5.	Σπέρματα ψυχανθών	
6.	Προϊόντα και υποπροϊόντα σπερμάτων ψυχανθών	Πρωτεΐνη, όταν είναι >10% Λίπος
7.	Κόνδυλοι, ρίζες	
8.	Προϊόντα και υποπροϊόντα κονδύλων και ριζών	Άμυλο Κυτταρίνη Τέφρα αδιάλυτη στο HCl, όταν είναι >3,5%
9.	Προϊόντα και υποπροϊόντα βιομηχανικής μεταποίησης σακχαρότευτλων	Κυτταρίνη, όταν είναι >15% Ολικό σάκχαρο εκφρασμένο σε σουκρόζη Τέφρα αδιάλυτη στο HCl, όταν είναι >3,5%
10.	Άλλοι σπόροι και καρποί, προϊόντα και υποπροϊόντα αυτών	Πρωτεΐνη Κυτταρίνη Λίπος, όταν είναι >10%
11.	Συγκομιζόμενες χονδροειδείς ζωοτροφές και ινώδη υπολείμματα	Πρωτεΐνη, όταν είναι >10% Κυτταρίνη
12.	Άλλα φυτά, προϊόντα και υποπροϊόντα αυτών	Πρωτεΐνη, όταν είναι >10% Κυτταρίνη
13.	Προϊόντα και υποπροϊόντα της βιομηχανικής μεταποίησης του σακχαροκάλαμου	Πρωτεΐνη, όταν είναι >15% Ολικό σάκχαρο εκφρασμένο σε σουκρόζη
14.	Προϊόντα γάλακτος και υποπροϊόντα γάλακτος	Πρωτεΐνη Υγρασία, όταν είναι >5% Λακτόζη, όταν είναι >10%
15.	Προϊόντα χερσαίων ζώων	Πρωτεΐνη όταν είναι >10% Λίπος όταν είναι >5%
16.	Ψάρια και άλλα θαλάσσια ζώα, προϊόντα και υποπροϊόντα αυτών	Πρωτεΐνη, όταν είναι >10% Λίπος, όταν είναι >5%
17.	Ανόργανες ύλες	Σχετικά ανόργανα στοιχεία
18.	Διάφορες πρώτες ύλες	Πρωτεΐνη, όταν είναι >10% Κυτταρίνη όταν είναι >10% Άμυλο, όταν είναι >30% Ολικό σάκχαρο εκφρασμένο σε σουκρόζη, όταν είναι >10%

⁽¹⁾ Να εκφράζονται επί τοις εκατό του βάρους του υλικού στην κατάσταση που βρίσκεται.

ΠΙΝΑΚΑΣ III
(Παράγραφος 5)
ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1, ΜΕΡΟΣ Γ, ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ
ΥΛΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΜΕΡΗ Α ΚΑΙ Β ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ
ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4

Μέθοδος επεξεργασίας	Περιγραφή	Κοινή ονομασία/ χαρακτηρισμός
1	2	3
Αλευροποίηση	Φυσική επεξεργασία των σπόρων των σιτηρών με σκοπό τη μείωση του μεγέθους των σωματιδίων και τη διευκόλυνση του διαχωρισμού τους σε συστατικά κλάσματα (κυρίως: αλεύρι, πτίτρο και ψιλά πτίτυρα).	Αλεύρι, πτίτυρα, ψιλά πτίτυρα
Αποσακχάρωση	Πλήρης ή μερική εξαγωγή των μόνο ή δισακχαριτών της μελάσσας και άλλων ουσιών οι οποίες περιλαμβάνουν ζάχαρη, με χημικές ή φυσικές μεθόδους.	Αποσακχαροποιημένο, μερικώς αποσακχαροποιημένο
Αποφλοιώση ⁽¹⁾	Αφαίρεση των περιβλημάτων από κόκκους, σπόρους, φρούτα και καρπούς διάφορους.	Αποφλοιωμένο
Εκχύλιση	Χρήση οργανικών διαλυτών για την αφαίρεση του λίπους ή του λαδιού από ορισμένες ουσίες ή υδατικού διαλύτη για την αφαίρεση της ζάχαρης και άλλων υδατοδιαλυτών συστατικών. Όταν χρησιμοποιείται οργανικός διαλύτης, το τελικό προϊόν πρέπει να είναι τεχνικώς απαλλαγμένο από το διαλύτη αυτόν.	Εκχυλισμένο (στην περίπτωση των ελαιούχων υλικών). Μελάσσα, πούλπα (στην περίπτωση προϊόντων που περιέχουν ζάχαρη ή άλλα υδατοδιαλυτά συστατικά).
Εξώθηση	Συμπίεση ή ώθηση υλικών μέσα από ειδικά ανοίγματα υπό πίεση. (Βλέπε επίσης προζελατινο-ποίηση).	Προϊόν εξώθησης

⁽¹⁾ Ο όρος «αποφλοιώση» είναι δυνατόν να αντικαθίσταται από τους όρους «αποκελύφωση» ή «απολεπύρωση», ανάλογα με την περίπτωση. Επομένως η κοινή ονομασία/χαρακτηρισμός πρέπει να είναι αντίστοιχα «αποκελύφωμένο», «απολεπυρωμένο».

Μέθοδος επεξεργασίας	Περιγραφή	Κοινή ονομασία/ χαρακτηρισμός
1	2	3
Θερμική Επεξεργασία/ θέρμανση	Γενικός όρος ο οποίος καλύπτει ορισμένο αριθμό θερμικών επεξεργασιών οι οποίες εκτελούνται υπό ορισμένες συνθήκες με σκοπό να υπάρξει επίδραση επί της δομής του υλικού ή της θρεπτικής αξίας.	Καβουρδισμένο, ψημένο, διογκωμένο, βρασμένο, θερμικά επεξεργασμένο.
Καθαρισμός (ραφινάρισμα)	Απομάκρυνση των ξένων προσμίξεων από σάκχαρα, έλαια και άλλα φυσικά υλικά με χημική/φυσική επεξεργασία.	Καθαρισμένο (ραφινάρισμένο)
Νιφαδοποίηση	Κυλίνδριση υλικού το οποίο έχει υποβληθεί σε επεξεργασία με υγρή θερμότητα.	Νιφάδες, νιφαδοποιημένο.
Ξήρανση	Τεχνητή ή φυσική αφυδάτωση με σκοπό τη διατήρηση του προϊόντος.	Αποξηραμένο (στον ήλιο ή με τεχνητό τρόπο).
Πίεση	Απομάκρυνση μέσω μηχανικής πίεσης (είτε με κοχλία, είτε με κάποιο άλλο είδος πιεστηρίου) και, ενδεχομένως, κάποιας θερμικής επεξεργασίας, των λιπών και των ελαίων από ελαιούχα υλικά, ή του χυμού από φρούτα ή άλλα φυτικά προϊόντα.	Πλακούντες έκθλιψης ⁽²⁾ (στην περίπτωση ελαιούχων υλικών)
Προζελατινοποίηση	Τροποποίηση του αμύλου με σκοπό να βελτιωθούν σημαντικά οι διογκωματικές του ιδιότητες μέσα σε κρύο νερό.	Προζελατινοποιημένο
Σύμψηξη	Επεξεργασία για δημιουργία συμπτήκτων.	Σύμψηκτο (pellet)
Συμπύκνωση	Αύξηση της περιεκτικότητας σε ορισμένες ουσίες δι' απομακρύνσεως του ύδατος ή άλλων συστατικών.	Συμπύκνωμα
Σύνθλιψη	Μηχανική μεταποίηση των σπόρων ή άλλων πρώτων υλών ζωοτροφών, αποσκοπώντας στη μείωση του μεγέθους τους.	Θραύσμα, σύνθλιψη

⁽²⁾ Ανάλογα με την περίπτωση, ο όρος «πλακούς έκθλιψης» μπορεί να αντικαθίσταται από τον όρο «πίπτα».

Μέθοδος επεξεργασίας	Περιγραφή	Κοινή ονομασία/ χαρακτηρισμός
1	2	3
Υγρή άλεση	Μηχανικός διαχωρισμός των συστατικών μερών του πυρήνα/ κόκκου σιτηρών με εμβάπτιση στο νερό που μπορεί να περιέχει διοξείδιο του θείου για εκχύλιση του αμύλου.	Φύτρα, γλουτένη, άμυλο.
Υδρογόνωση	Επεξεργασία των λιπών και των ελαίων για την άνοδο του σημείου τήξεως αυτών.	Υδρογονωμένο (σκληρυνθέν), μερικώς υδρογονωμένο.
Υδρόλυση	Διάσπαση σε απλά χημικά συστατικά μέσω κατάλληλης επεξεργασίας με νερό και, ενδεχομένως, είτε με ένζυμα είτε με οξέα/αλκάλια.	Υδρολυμένο.

ΠΙΝΑΚΑΣ IV

(Παράγραφος 6)

ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6, ΜΕΡΟΣ Α, ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

ΜΕΓΙΣΤΑ ΕΠΙΤΡΕΠΤΑ ΟΡΙΑ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΟΥΣΙΩΝ
ΣΕ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ

Πρώτη τροποποίηση που αφορά τις εξής ουσίες: την αντικατάσταση των νιτρικών με τα νιτρώδη, το εξοχλωροκυκλοεξάνιο βήτα ισομερές και τη διοξίνη.

ΜΕΡΟΣ Α ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ

(1) Ουσία	(2) Ζωοτροφή	(3) μέγιστη περιεκτικότητα σε mg/kg ζωοτροφής με 12% υγρασία
--------------	-----------------	--

I. Ανόργανα στοιχεία ή ιόντα

Νιτρώδη	Ψαράλευρο	60 (εκφρασμένο σε νιτρώδες νάτριο).
	Πλήρεις ζωοτροφές, εκτός: - των προοριζομένων για ζώα συντροφιάς πλην των πτηνών και των ψαριών ενυδρείων	15 (εκφρασμένο σε νιτρώδες νάτριο)

IV. Υπολείμματα φυτοφαρμάκων και άλλες ουσίες

Εξαχλωροκυκλοεξάνιο (Hexachlorocyclohexane, HCH) 2.βήτα-ισομερές	Σύνθετες ζωοτροφές, εκτός:	0,01
	- των σύνθετων για ζώα γαλακτοπαραγωγής	0,005
	Πρώτες ύλες ζωοτροφών, εκτός:	0,01
	- λιπών	0,1
Διοξίνη (άθροισμα των PCDD and PCDF), εκφρασμένο σε διεθνή τοξικά ισοδύναμα (I-TEQ)	Πούλπα εσπεριδοειδών	500 pg I-TEQ/kg (ανώτατο ανιχνεύσιμο όριο) ⁽²⁾

⁽²⁾ Τα ανώτατα όριο συγκεντρώσεων υπολογίζονται με την παραδοχή ότι όλες οι τιμές των διαφόρων ομοειδών, οι οποίες είναι χαμηλότερες από το ανιχνεύσιμο όριο, είναι ίσες με το ανιχνεύσιμο όριο.

ΠΙΝΑΚΑΣ V
(Παράγραφος 7)

ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 13, ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

**Πρώτη Τροποποίηση και τελική διαμόρφωση του
Παραρτήματος μετά την τροποποίηση.**

Για σκοπούς του Κανονισμού 35(1) οι ουσίες ή τα αναλυτικά συστατικά που αναφέρονται πιο κάτω θα προσδιορίζονται με τις επίσημες μεθόδους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες καθορίζονται στις πιο κάτω οδηγίες που δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων [Official Journal (OJ) of European Communities] ως εξής:

1. Ετοιμασία δείγματος	OJ	L246,	29/8/81	p.32	81/680/EEC
2. Υδροκυανικό οξύ	OJ	L155,	12/7/71	p.13	71/250/EEC
3. Ασβέστιο (ογκομετρική μέθοδος)	»	»	»	»	»
4. Ανθρακικά	»	»	»	»	»
5. Τέφρα ακαθάριστη (crude ash)	»	»	»	»	»
6. Τέφρα αδιάλυτη στο υδροχλωρικό οξύ	»	»	»	»	»
7. Χλώριο από χλωριούχα (υδατοδιαλυτό)	»	»	»	»	»
8. Λάδι ελαιοκράμβης (mustard oil)	»	»	»	»	»
9. Λακτόζη	»	»	»	»	»
10. Κάλιο	»	»	»	»	»
11. Νάτριο	»	»	»	»	»
12. Σάκχαρο (μέθοδος Luff-Schoorl)	»	»	»	»	»
13. Θεοβρωμίνη	»	»	»	»	»
14. Ουρία	»	»	»	»	»
15. Αλκαλοειδή λουπίνων	»	»	»	»	»
16. Δραστικότητα ουρεάσης στο σογιάλευρο	»	»	»	»	»
17. Υγρασία	OJ	L279,	20/12/71	p.7	71/393/EEC
18. Πτητικές αζωτούχες βάσεις με μικροδιάχυση	»	»	»	»	»
19. Πτητικές αζωτούχες βάσεις με απόσταξη	»	»	»	»	»
20. Ολικός φώσφορος (φασματοφωτομετρική μέθοδος)	»	»	»	»	»
21. Αμυλο (πολωσιμετρική μέθοδος)	OJ	L209,	7/8/99	p.23	99/79/EC
22. Αμυλο (μέθοδος παγκρεατίνης)	OJ	L108,	22/4/74	p.7	74/203/EEC
23. Πρωτεΐνη	OJ	L179,	22/7/93	p.8	93/28/EEC
24. Πρωτεΐνη διαλυτή στην πεψίνη και στο υδροχλωρικό οξύ	OJ	L123,	12/5/72	p.6	72/199/EEC
25. Δραστικότητα πεψίνης	»	»	»	»	»
26. Ελεύθερη και ολική γοσσυπόλη	»	»	»	»	»
27. Ανίχνευση και ταυτοποίηση	»	»	»	»	»

αντιβιοτικών της ομάδας της τετρακυκλίνης					
28. Προσδιορισμός τετρακυκλίνης, οξυτετρα-κυκλίνης και χλωροτετρακυκλίνης	»	»	»	»	»
29. Προσδιορισμός ολεαντομυκίνης (oleandomycin)	»	»	»	»	»
30. Προσδιορισμός τυλοσίνης (tylosin)	»	»	»	»	»
31. Υγρασία σε ζωϊκά και φυτικά λίπη & λάδια	OJ	L83,	30/3/73	p.21	73/46/EEC
32. Μαγνήσιο (μέθοδος ατομικής απορρόφησης)	»	»	»	»	»
33. Κυτταρίνη (crude fibre)	OJ	L344,	26/11/92	p.35	92/89/EEC
34. Ρετινόλη (βιταμίνη Α)	OJ	L174,	13/7/2000	p.32	2000/45/EC
35. Θειαμίνη υδροχλωρική	OJ	L083	30/3/73	p.21	73/46/EEC
36. Ασκορβικό οξύ (βιταμίνη C)	»	»	»	»	»
37. Αμπρόλιουμ (Amprolium)	OJ	L108,	22/4/74	p.7	74/203//EEC
38. Εθοπαμτέϊτ (Ethopabate)	»	»	»	»	»
39. Δινιτολμίδιο (Dimitoimide, DOT)	»	»	»	»	»
40. Νικαρμπαζίνη (Nicarbazin)	»	»	»	»	»
41. Βιταμίνη Κ (μεναδιόνη)	»	»	»	»	»
42. Αφλατοξίνη B1					
-χρωματογραφία λεπτής στοιβάδας	OJ	L102,	15/4/76	p.8	76/372/EEC
-υγρή χρωματογραφία ψηλής απόδοσης ⁽¹⁾	OJ	L327,	13/11/92	p.54	92/95/EEC
43. Φλαβοφωσφολιπόλη (Flavophospholipol)	OJ	L206,	29/7/78	p.43	78/633/EEC
44. Σίδηρος, χαλκός, μαγγάνιο, ζιγκός	»	»	»	»	»
45. Αβοπαρσίνη (Avorparcin)	OJ	L257,	10/9/81	p.38	81/715/EEC
46. Μονενσινικό νάτριο (Monensin sodium)	OJ	L257,	10/9/81	p.38	81/715/EEC
47. Λίπη και λάδια των ζωοτροφών εκτός των ελαιούχων σπόρων	OJ	L015	18/1/84	p.28	84/4/EEC
48. Βιργινιαμυκίνη (Virginiamycin)	»	»	»	»	»
49. Ψευδαργυρούχος βακτριρακίνη (Zinc Bacitracin)	»	»	»	»	»
50. Σπειραμυκίνη (Spiramycin)	OJ	L238,	6/9/84	p.34	84/425/EEC
51. Αλοφουγινόνη (Halofuginone)	OJ	L234,	17/9/93	p.17	93/70/EEC
52. Ρομπενιτίνη (Robenitine)	OJ	L329,	30/12/93	p.54	93/117/EEC
53. Μεθυλοβενζοκάτη (Methyl benzoquate)	»	»	»	»	»
54. Αμινοξέα (κυστεΐνη, κυστίνη, μεθειονίνη, λυσίνη, θρεονίνη, αλανίνη, αργινίνη, ασπαργινικό οξύ,	OJ	L257,	19/9/98	p.14	98/64/EC

⁽¹⁾ Ανάλογα με τη ζωοτροφή χρησιμοποιείται και η κατάλληλη μέθοδος

	γλουταμινικό οξύ, γλυκίνη, ιστιδίνη, ισολευκίνη, λευκίνη, φατυλαλανίνη, προλίνη, σερίνη, τυροσίνη, βαλίνη).				
55.	Ολακουϊντόξη (olaquintox)	OJ	L257	19/9/98	p.14 98/64/EC
56.	Μικροσκοπική ταυτοποίηση για προσδιορισμό των συστατικών ζωικής προέλευσης στις ζωοτροφές	OJ	L318	13/11/98	p.45 98/88/EC
57.	Δικλαζουρίλη (Diclazuril)	OJ	L118	6/5/99	p.36 99/27/EC
58.	Καρμπαντόξη (Canbadox)	OJ	L118	6/5/99	p.36 »
59.	Λασαλοσινικό νάτριο (Lasalocid sodium)	OJ	L207	6/8/99	p.13 99/76/EC
60.	Βιταμίνη Ε (α-τοκοφερόλη)	OJ	L174	13/7/2000	p.32 2000/45/EC
61.	Θρυπτοφάνη	OJ	L174	13/7/2000	p.32 »
62.	Διοξίνες, φουράνια και παρόμοια με τις διοξίνες PCB	OJ	L209	6/8/2002	P15 2002/70/EC

ΠΙΝΑΚΑΣ VI
(Παράγραφος 8)

ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΜΕΡΟΣ Α, ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 15, ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΑ ΤΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΧΡΗΣΗ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ
ΒΑΣΗ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Δεύτερη Τροποποίηση που αφορά τις πιο κάτω κατηγορίες προσθετικών: Α. Αντιβιοτικά, Δ. Κοκκidioστατικά και λοιπές
φαρμακευτικές ουσίες, Στ. Χρωστικές ουσίες, Θ. Ιχνοστοιχεία, ΙΒ Συνδετικές, αντισυσσωματικές και πτηκτικές ουσίες,
ΙΔ Ένζυμα και ΙΕ Μικροοργανισμούς ως έχουν διαμορφωθεί μετά την τροποποίηση

Αριθμός Ε.Ε.	Επωνυμία και αριθμός καταχώρησης του υπεύθυνου κυκλοφορίας	Προσθετικό (εμπορική ονομασία)	Σύνθεση, χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη συγκέ- ντρωση	Μέγιστη συγκέ- ντρωση	Άλλες προνοιες	Διάρκεια έγκρισης
						mg δραστηκής ουσίας/ kg πλήρους ζωοτροφής			
Ε 712		<u>Α. Αντιβιοτικά</u> Φλαβοφωσφολιπόλη (Flavophosphorolipol)	C ₇₀ H ₁₂₄ O ₄₀ N ₈ P	Όρνιθες αυγοπαρα- γωγής Γάλοι Κοτόπουλα παχυνόμενα Χοιρίδια	- 26 βδομ. 16 βδομ. 3 μήνες 6 μήνες	2	5	-	
						11	20	-	
						10	20	-	
						1	25	-	
						6	20	-	

* Οι λοιπές κατηγορίες παραμένουν ως έχουν στην Κ.Δ.Π. 131/2001 και Κ.Δ.Π. 246/2002

Αριθμός Ε.Ε.	Επωνυμία και αριθμός καταχώρησης του υπεύθυνου κυκλοφορίας	Προσθετικό (εμπορική ονομασία)	Σύνθεση, χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη συγκέ- ντρωση	Μέγιστη συγκέ- ντρωση	Άλλες πρόνοιες	Διάρκεια έγκρισης
						mg δραστικής ουσίας/ kg πλήρους ζωοτροφής			
				Χοίροι	6 μήνες 6 μήνες	8	16 16	Υποκατάστατα γάλακτος μόνο	
				Δαμάκια		2		Να αναφέρεται στις	
				Βοειδή παχυνόμενα			10	οδηγίες χρήσης: "-Για συμπλή- ρωματικές ζωοτροφές η μέγιστη δόση στο σπέρμα δεν πρέπει να υπερβαίνει: - Για 100 kg σωματικό βάρος: 40mg. - Άνω των 100kg: πρόσθεσε 1.5mg για κάθε πρόσθετα 10kg σωματικού βάρους".	

Αριθμός Ε.Ε.	Επωνυμία και αριθμός καταχώρησης του υπεύθυνου κυκλοφορίας	Προσθετικό (εμπορική ονομασία)	Σύνθεση, χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη συγκέ- ντρωση		Μέγιστη συγκέ- ντρωση	Άλλες πρόνοιες	Διάρκεια έγκρισης
						mg δραστικής ουσίας/ kg πλήρους ζωοτροφής				
E 712	Hoechst Roussel Vet GmbH	Φλαβοφασφολιπόλη 80 g/kg (Flavomycin 80)	Σύνθεση προσθετικού: Φλαβοφασφολιπόλη: ≥80 g δραστικότητα/kg Διοξείδιο του πυριτίου: 50-150 g/kg Ανθρακικό ασβέστιο: 0-400 g/kg	Κουνέλια	-	2	4	-	-	30.9.2009
		Φλαβοφασφολιπόλη 40 g/kg (Flavomycin 40)	Φλαβοφασφολιπόλη: ≥40 g δραστικότητα/kg Διοξείδιο του πυριτίου: 20-120 g/kg Ανθρακικό ασβέστιο: 200-750 g/kg Δραστική ουσία: Φλαβοφασφολιπόλη, Αριθ. CAS:11015-37-5, (μειονομικίνη Α: C ₂₈ H ₁₀₈ N ₅ O ₃₄ P), φωσφογλυκολιπίδιο παραγόμενο με ζύμωση του Streptomyces ghanaensis (DSM 12218), αναλογία							

Αριθμός Ε.Ε.	Επωνυμία και αριθμός καταχώρησης του υπεύθυνου κυκλοφορίας	Προσθετικό (εμπορική ονομασία)	Σύνθεση, χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη συγκέ- ντρωση	Μέγιστη συγκέ- ντρωση	Άλλες πρόνοιες	Διάρκεια εγκρίσης
						mg δραστικής ουσίας/ kg πλήρους ζωοτροφής			
			αντιβιοτικών παραγόντων: μοενομυκίνη Α: 40-80% μοενομυκίνη Α _{1/2} : 0-20% μοενομυκίνη C ₁ : 0-20% μοενομυκίνη C ₂ : 5-25% μοενομυκίνη C ₄ : 0-15%						

Αριθμός Ε.Ε.	Επωνυμία και αριθμός καταχώρησης του υπεύθυνου κυκλοφορίας	Προσθετικό (εμπορική ονομασία)	Σύνθεση, χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη συγκέ- ντρωση		Μέγιστη συγκέ- ντρωση	Άλλες πρόνοιες	Διάρκεια έγκρισης
						mg ουσίας/ kg	ζωστροφής			
E 714		Μονενσινικό νάτριο (Monensin sodium)	$C_{38}H_{61}O_{11}Na$ (όλας νατρίου του πολυαιθερικού μονοκαρβοξυ-λικού οξέος παραγόμενου από τον <i>Streptomyces cinnamomensis</i>)	Βοειδή παχυνόμενα	-	10	40	Na αναφέρεται στις οδηγίες χρήσης: "- Για συμπλη- ρωματικές ζωστροφές η μέγιστη δόση στο σπέρμα δεν πρέπει να υπερβαίνει: - Για 100Kg σωματικό βάρος: 140mg - Άνω των 100Kg σωματικού βάρους: πρόσθεσε 6mg για κάθε πρόσθετα 10Kg σωματικού βάρους".		
E 716	Hoechst Roussel Vet GmbH	Σαλινομυκινικό νάτριο 120 g/kg (Salacin 120 micro Granulate)	Σύνθεση προσθετικού: Σαλινομυκινικό νάτριο: ≥120 g/kg Διοξείδιο του πυριτίου: 10-100 g/kg Ανθρακικό ασβέστιο: 350-700 g/kg	Χοιρίδια	4 μήνες	30	60	Οι οδηγίες χρήσης πρέπει να αναφέρουν: "Επικίνδυνο για τα πτηνοίδη". "Η τροφή αυτή περιέχει προσθε- τικό της ομάδας των ιονοφόρων"	30.9.2009	

Αριθμός Ε.Ε.	Επωνυμία και αριθμός καταχώρισης του υπεύθυνου κυκλοφορίας	Προσθετικό (εμπορική ονομασία)	Σύνθεση, χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη συγκέ- ντρωση	Μέγιστη συγκέ- ντρωση	Άλλες προνοιες	Διάρκεια έγκρισης
						mg δραστικής ουσίας/ kg πλήρους ζωοτροφής			
			Δραστική ουσία: Σαλινομυκινικό νάτριο, C ₄₂ H ₈₈ O ₁₇ Na, Αριθ. CAS: 53003-10-4, Άλας με νάτριο πολυαιθέρα μονοκαρβονικού οξέος, παραγόμενου με ζύμωση από τον Streptomyces albus (DSM 12217) Συγγενείς προσαρμίζεις: < 42 mg ελαιοφύλης/kg σαλινομυκινικού νατρίου, < 40 g 17-επι-20- δεοξυσαλινομυκίνης/kg σαλινομυκινικού νατρίου	Χοίροι παχυνόμενοι	6 μήνες	15	30	η ταυτόχρονη χορήγηση της με ορισμένα φάρμακα (την ταμουλίνη, για παράδειγμα) μπορεί να αντενδείκνυται". Οι οδηγίες χρήσης πρέπει να αναφέρουν: "Επικίνδυνο για τα ιπποειδή". "Η τροφή αυτή περιέχει προσθε- τικό της ομάδας των ιονοφόρων". η ταυτόχρονη χορήγηση της με ορισμένα φάρμακα (την ταμουλίνη, για παράδειγμα) μπορεί να αντενδείκνυται".	30.9.2009

Αριθμός Ε.Ε.	Επωνυμία και αριθμός καταχώρησης του υπεύθυνου κυκλοφορίας	Προσθετικό (εμπορική ονομασία)	Σύνθεση, χημικός τύπος, περίγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη συγκέντρωση		Μέγιστη συγκέντρωση ντρωση	Άλλες προνοιες	Διάρκεια έγκρισης
						mg δραστικής ουσίας/ kg πλήρους ζωοτροφής				
E 717	Eli Lilly and Company Ltd.	Αβιλαμικίνη 200 g/kg (Maxus G200, Maxus 200)	Σύνθεση προσθετικού: Αβιλαμικίνη: δραστικότητα 200 g/kg Έλαιο σόγιας ή ορυκτό λάδι: 5-30 g/kg Προϊόντα ελαιοσυγγείων σόγιας qs 1 kg	Χοιρίδια	4 μήνες	20	40		-	30.9.2009
		Αβιλαμικίνη 100 g/kg (Maxus G100, Maxus 100)	Αβιλαμικίνη: δραστικότητα 100 g/kg Έλαιο σόγιας ή ορυκτό λάδι: 5-30 g/kg Προϊόντα ελαιοσυγγείων σόγιας qs 1 kg	Χοιρίδια παχυνόμενα	6 μήνες	10	20		-	30.9.2009
			Δραστική ουσία: Αβιλαμικίνη, C ₅₇₋₆₂ H ₈₂₋₉₀ Cl ₁₋₂ O ₃₁₋₃₂ , Αριθ. CAS αβιλαμικίνης A: 69787-79-7, Αριθ. CAS αβιλαμικίνης B: 73240-30-9, Μείγμα ολιγοσακχαριτών της ομάδας της ορθοσομικλίνης παράγόμενο από Streptomyces viridochromogenes (NRRL	Κοτόπουλα παχυνόμενα	-	2,5	10		-	30.9.2009

Αριθμός Ε.Ε.	Επωνυμία και αριθμός καταχώρησης του υπεύθυνου κυκλοφορίας	Προσθετικό (εμπορική ονομασία)	Σύνθεση, χημικός τύπος, περίγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μένιστη ηλικία	Ελάχιστη συγκέ- ντρωση		Μένιστη συγκέ- ντρωση	Άλλες πρόνοιες	Διάρκεια εγκρίσης
						mg δραστικής ουσίας/ kg πλήρους ζωοτροφής				
			2860), σε κοκκώδη μορφή Αναλογία παραγόντων: Αβλαμυκίνη Α: ≥ 60% Αβλαμυκίνη Β: ≤ 18% Αβλαμυκίνης Α+Β: ≥70% Λοιπές αβλαμυκίνες, μόνες:≤8%							

Αριθμός Ε.Ε.	Επωνυμία και αριθμός καταχώρι- σης του υπεύθυνου κυκλοφορίας	Προσθετικό (εμπορική ονομασία)	Σύνθεση, χημικός τύπος, περίγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη συγκέ- ντρωση		Μέγιστη συγκέ- ντρωση	Άλλες πρόνοιες	Διάρκεια έγκρισης
						mg δραστικής ουσίας/ kg πλήρους ζωοτροφής				
		Αβλαμυκίνη: 200 g/kg (Maxus G200, Maxus 200)	Σύνθεση πρώτης ύλης: αβλαμυκίνη: 200g δραστικότητα/kg σονιέλαιο ή ορυκτέλαιο: 5 έως 30g/kg πρωτόντα ελαιουργείων σόγιας ικανή ποσότητα 1 kg αβλαμυκίνη: 100g δραστικότητα/Kg σονιέλαιο ή ορυκτέλαιο: 5 έως 30g/kg πρωτόντα ελαιουργείων σόγιας ικανή ποσότητα 1 kg	Γαλοπούλες	-	5	10	-	20.1.2013	
		Αβλαμυκίνη: 100g/kg (Maxus G 100 Maxus 100)	Δραστική ουσία: C ₅₇₋₆₂ H ₉₂₋₉₈ Cl ₁₋₃ O ₃₁₋₃₂ αριθμός CAS αβλαμυκίνης A: 69787-79-7, αριθμός CAS αβλαμυκίνης B: 73240-30-9 Μείγμα ολιγοσακχαριτών της ομάδας της ορθοαμυκίνης που παράγονται από τον Strepto- myces viridochromogenes, (NRRL 2860) σε κοκκώδη μορφή							
			Αναλογία παραγόντων αβλαμυκίνη A: ≥ 60% αβλαμυκίνη B: ≤18% αβλαμυκίνη A+B: ≥ 70% λοπές αβλαμυκίνες, μόνες≤6%							

Αριθμός Ε.Ε.	Επωνυμία και αριθμός καταχώρι- σης του υπεύθυνου κυκλοφορίας	Προσθετικό (εμπορική ονομασία)	Σύνθεση, χημικός τύπος, περίγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη συγκέ- ντρωση		Μέγιστη συγκέ- ντρωση	Άλλες προνοιες	Διάρκεια έγκρισης
						πρω δραστικής ουσίας/ kg πλήρους ζωοτροφής				
E 756		Δ. Κοκκιδιοστατικά και λοιπές φαρμακευτικές ουσίες Ντεκοκουϊνίτ (Decoquinat)	3-εθοξυκαρβονυλ-4-υδροξυ-6- δεκυλοξυ-7-εθοξικινολίνη	Κοτόπουλα παχυνόμενα	-	20		40	Απαγορεύεται η χρήση τουλάχιστο 3 μέρες πριν τη σφαγή	
E757		Μονενσινικό νάτριο (Monensin sodium)	$C_{38}H_{61}O_{11}Na$ (άλας νατρίου του πολυαιθερικού μονοκαρβο- ξυλικού αξέος παραγόμενου από τον <i>Streptomyces</i> <i>cinnameus</i>)	Κοτόπουλα εκτροφόμενα για αυγο- παραγωγή Γάλοι	16 βδομ. 16 βδομ.	100	100	125	Απαγορεύεται η χρήση τουλάχιστο 3 μέρες πριν τη σφαγή. Απαγορεύεται η χρήση τουλάχιστο 3 μέρες πριν τη σφαγή. Να αναφέρε- ται στις οδηγίες χρήσης για όλα τα ζώα: "- Επικίνδυνο για ιπποειδή. - Η τροφή αυτή περιέχει προσθετικό της ομάδας των ιονο- φόρων η ταυτόχρονη χορήγηση της με ορι- σμένα φάρμακα (την παμουλίνη, για παρά- δειγμα) μπορεί να αντενδείκνυται".	
						90		100		

Αριθμός Ε.Ε.	Επωνυμία και αριθμός καταχώρι- σης του υπεύθυνου κυκλοφορίας	Προσθετικό (εμπορική ονομασία)	Σύνθεση, χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη συγκέ- ντρωση		Μέγιστη συγκέ- ντρωση	Άλλες προνόμιες	Διάρκεια έγκρισης
						mg δραστικής ουσίας/	kg πλήρους ζωοτροφής			
E 758		Ρομπενιδίνη (Robenidine)	1,3-διζ[4 χλώρα βενζυλιδένιο]-αμινο] υδροχλωρική γουανιδίνη	κοτόπουλα παχυνόμενα, γάλοι	-	30	36	36	Απαγορεύεται η χρήση τουλάχιστο 5 μέρες πριν από τη σφαγή	
				κουνέλια παχυνόμενα	-	50	66	66	Απαγορεύεται η χρήση τουλάχιστο 5 μέρες πριν από τη σφαγή	
E 758	Roche Vitamins Europe Ltd.	Υδροχλωρική ρομπενιδίνη 66 g/kg (Cycostat 66 G)	Σύνθεση προσθετικού: Υδροχλωρική ρομπενιδίνη: 66 g/kg Λιγνοσουλφονική ένωση: 40 g/kg Διένυδρο θειικό ασβέστιο: 894 g/kg Δραστική ουσία: Υδροχλωρική ρομπενιδίνη, C ₁₈ H ₁₃ Cl ₂ N ₆ ·HCl, υδροχλωρική 1,3-διζ[π-χλωρο- βενζυλιδένιο] αμινο] γουανιδίνη), αριθ. CAS: 25875-50-7 Συγγενείς προσαρμείξεις: N,N''-τρις [(π-CI-βενζυλιδέν) αμινο]γουανιδίνη: ≤ 1% Δις-[4-CI-βενζυλιδέν]υδραζίνη: ≤ 1%	Κουνέλια για ανα- παραγωγή	-	50	66	66	Απαγορεύεται η χορήγηση τουλάχιστο πέντε ημέρες πριν από τη σφαγή	30.9.2009

Αριθμός Ε.Ε.	Επωνυμία και αριθμός καταχώρι- σης του υπεύθυνου κυκλοφορίας	Προσθετικό (εμπορική ονομασία)	Σύνθεση, χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη συγκέ- ντρωση	Μέγιστη συγκέ- ντωση	Άλλες πρόνοιες	Διάρκεια έγκρισης
E 763		Λασαλοσινικό νάτριο (Lasalocid sodium)	$C_{24}H_{33}O_8Na$ (άλας νατρίου του πολυαιθερικού μονοκαρβοξυλικού οξέος παραγόμενου από τον <i>Streptomyces lasaliensis</i>)	Κοτόπουλα παχυνόμενα Πουλλάδες αυγοπαρ- γωγής	- 16 βδομ.	75 75	125 125	Απαγορεύεται η χρήση τουλάχιστο 5 μέρες πριν τη σφαγή	
E 763	Produlits Roche SA	Λασαλοσινικό νάτριο Lasalocid A sodium 15 g/100 g (Avatec 15% cc)	Σύνθεση προσθετικού: Lasalocid A sodium: 15 g/100 g, Άλειρο από σπάρδικα αραβο- σίτου: 80,95 g/100 g, Λεκθίνη: 2 g/100 g, Σογιέλαιο: 2 g/100 g, Οξείδιο του τριθενούς σιδήρου: 0,05 g/100 g Δραστική ουσία: Lasalocid A sodium, $C_{24}H_{33}O_8Na$, Αριθ. CAS: 26999-20-6, άλας με νάτριο του 6-[(3R, 4S, 5S, 7R)- 7-(2S, 3S, 5S)-5-αιθυλ-5-[(2R, 5R, 6S)-5-αιθυλ-5-υδροξυ-6-με- θυλοτετραϋδρο-2H-πυραν-2-υλ]- τετραϋδρο-3-μεθυλο-2-φορυλ]- 4- υδροξυ-, 3, 5-διμεθυλ-6- οξευνεύλ]-2,3-οξυτολουλικού οξέος παραγόμενου από <i>Streptomyces lasaliensis</i> subsp. <i>lasaliensis</i> (ATCC 31180)	Γαλοπούλες	12 βδομ.	90	125	Απαγορεύεται η χορήγηση τουλάχιστο 5 ημέρες πριν από τη σφαγή. Οι οδηγίες χρήσης πρέπει να αναφέρουν: "Η τροφή αυτή περιέχει προσθετικό της ομάδας των ιονοφόρων η ταυτόχρονη χορήγηση της με ορισμένα φάρμακα μπορεί να αντενδείκνυται".	30.9.2009

Αριθμός Ε.Ε.	Επωνυμία και αριθμός καταχώρι- σης του υπεύθυνου κυκλοφορίας	Προσθετικό (εμπορική ονομασία)	Σύνθεση, χημικός τύπος, περίγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη συγκέ- ντρωση		Μέγιστη συγκέ- ντρωση	Άλλες προνοιες	Διάρκεια έγκρισης
						mg δραστικής ουσίας/ kg πλήρους ζωοτροφής	mg δραστικής ουσίας/ kg πλήρους ζωοτροφής			
			Συγγενείς προσμίξεις: Lasalocid sodium B-E: ≤ 10%							
E 764		Αλοφουζινόνη (Halofuginone)	di-trans-7-βρωμο-6-χλωρο -3-[-(3-υδροξυ-2-πιπεριδυλο) ακετονυλο] κιναζολινο-4-(3H)ένα υδροβρώμιο	Κοτόπουλα Γάλοι	- 12 βδομ.	2		3	Απαγορεύεται η χρήση τουλάχιστο 5 μέρες πριν τη σφαγή.	
E764	Hoechst Roussel Vet GmbH	Αλοφουζινόνη Halofuginone hydro- bromide 6 g/kg (Stenorol)	Σύνθεση προσθετικού: Υδροβρωμική αλοφουζινόνη: 6 g/kg, Ζελατίνη: 13,2 g/kg, Άμυλο: 19,2 g/kg, Γλυκόζη: 21,6 g/kg, Ανθρακικό σάββατο: 940 g/kg Δραστική ουσία: Υδροβρωμική αλοφουζινόνη, C ₁₆ H ₁₇ BrClN ₃ O ₃ , HBr, Υδροβρωμική Di-trans-7- βρωμο-6-χλωρο-3-(3-(3-υδροξυ- 2-πιπεριδυλ)ακετονυλ)κιναζολιν- 4(3H)-όνη Αριθ. CAS: 64924-67-0 Συγγενείς προσμίξεις: cis-ισομερές της αλοφουζι- νόνης: < 1,5%	Κοτόπουλα εκτρεφόμενα για αυγο- παραγωγή	16 βδομ.	2	3	- 30.9.2009		

Αριθμός Ε.Ε.	Επωνυμία και αριθμός καταχώρη- σης του υπεύθυνου κυκλοφορίας	Προσθετικό (εμπορική ονομασία)	Σύνθεση, χημικός τύπος, περίγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη συγκέ- ντρωση		Μείγωση συγκέ- ντωση	Άλλες προνοιες	Διάρκεια έγκρισης
						mg δραστικής ουσίας/	kg πλήρους ζωοστροφής			
E 765		Ναραζίνη (Narasin)	$C_{43}H_{72}O_{11}$ (Πολυαιθέρας μονοκαρβοξυλικού οξέος παραγόμενος από τον <i>Streptomyces aureofaciens</i>)	Κοτόπουλα παχυνόμενα	-	60	70		Απαγορεύεται η χρήση τουλάχιστο 5 μέρες πριν τη σφαγή. Να αναφέρεται στις οδηγίες χρήσης: "Επικίνδυνο για ιπποειδή. Η τροφή αυτή περιέχει προσθε- τικό της ομάδας των ιονοφόρων η ταυτό- χρονη χορήγηση της με ορισμένα φάρμακα (την παμουλίνη, για παραδειγμα) μπορεί να αντενδκύνεται".	
E 766		Σαλινομυκινικό νάτριο (Salinomycin sodium)	$C_{52}H_{96}O_{11}Na$ (άλας νατρίου του πολυαιθερικού μονοκαρβοξυλικού οξέος παραγόμενου από τον <i>Streptomyces albus</i>) Μείγωση περιεκτικότητα ανά kg άλατος: - Ελασιφυλίνη 42 mg, - 17-επι-20-δέσφου- σαλινομυκίνη 40g	Κοτόπουλα παχυνόμενα	-	50	70		Απαγορεύεται η χρήση τουλάχιστο 5 μέρες πριν από τη σφαγή. Να αναφέρεται στις οδηγίες χρήσης: "Επικίνδυνο για τα ιπποειδή".	

Αριθμός Ε.Ε.	Επωνυμία και αριθμός καταχώρι- σης του υπεύθυνου κυκλοφορίας	Προσθετικό (εμπορική ονομασία)	Σύνθεση, χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη συγκέ- ντρωση		Μέγιστη συγκέ- ντρωση	Άλλες πρόνοιες	Διάρκεια έγκρισης
						mg δραστικής ουσίας/	kg πλήρους ζωοτροφής			
				Χοιρίδια	4 μήνες	30	60		Αιταγορεύεται η χρήση τουλάχιστο 5 μέρες πριν τη σφαγή. Να αναφέρεται στις οδηγίες χρήσης: "-Επικίνδυνο για τα ιπποειδή." - Η τροφή αυτή περιέχει προσθετικό της ομάδας των ιονοφόρων η ταυτόχρονη χορήγηση της με ορισμένα φάρμα- κα (την τιμουλίνη, για παράδειγμα) μπορεί να αντενδείκνυται	
				Χοίροι	6 μήνες	15	30			
E 766	Intervet International BV	Σαλινομυκινικό νάτριο (Salinomycine sodium) 120 g/kg (Sacoax 120)	Σύνθεση Προσθετικού: Σαλινομυκινικό νάτριο: ≥ 120 g/kg, Διοξείδιο του πυριτίου: 10-100 g/kg, Ανθρακικό ασβέστιο: 350-700 g/kg Δραστική ουσία: Σαλινομυκινικό νάτριο $C_{42}H_{69}O_{11}Na$, αριθ. CAS: 53003-10-4 (όλας νατρίου του πολυαιθερικού μονοκαρβο-	Κουνέλια παχυνόμενα	-	20	25		Αιταγορεύεται η χρήση τουλάχιστο 5 μέρες πριν από τη σφαγή. Να αναφέρεται στις οδηγίες χρήσης: "-Επικίνδυνο για τα ιπποειδή." - Η τροφή αυτή περιέχει προσθετικό της ομά- δας των ιονοφόρων η ταυτόχρονη χορήγηση της με ορισμένα φάρμακα (την	31.5.2011

Αριθμός Ε.Ε.	Επωνυμία και αριθμός καταχώρι- σης του υπεύθυνου κυκλοφορίας	Προσθετικό (εμπορική ονομασία)	Σύνθεση, χημικός τύπος, περίγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μένιστη ηλικία	Ελάχιστη συγκέ- ντρωση	Μένιστη συγκέ- ντρωση	Άλλες πρόνοιες	Διάρκεια εγκρίσης
						mg δραστικής ουσίας/ kg πλήρους ζωστροφής	mg δραστικής ουσίας/ kg πλήρους ζωστροφής		
Ε766	Intervet Internationa l BV		ξυλικού οξέος παραγόμενου από τον <i>Streptomyces albus</i>) (DSM 12217)					τιαμουλίνη, για παρόδευμα) μπορεί να αντενδείκνυται".	
			Συγγενείς προσμίξεις: <42 mg ελαιοφιλίνης/kg σαλμονομυκινικού νατρίου <40g 17-επι-20-δεοξυ- σαλμονοκινίνης/kg σαλμο- μικινικού νατρίου						
				Ορνίθες αυγοπαράγω- γής	12 εβδομ.	50	50	Οι οδηγίες χρήσης πρέπει να περιέχουν τις ενδείξεις: «Επικίνδυνη για τα ιπποειδή και τις γαλατούλες» Η τροφή αυτή περιέχει πρόσθετο της ομάδας των ιονοφόρων ή ταυτόχρονη χορήγηση της με ορισμένα φάρμακα (για παρόδευμα την τιαμουλίνη) μπορεί να αντενδείκνυται.	

Αριθμός Ε.Ε.	Επωνυμία και αριθμός καταχώρη- σης του υπεύθυνου κυκλοφορίας	Προσθετικό (εμπορική ονομασία)	Σύνθεση, χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη συγκέ- ντρωση	Μέγιστη συγκέ- ντρωση	Άλλες προνοιες	Διάρκεια έγκρισης
						mg δραστικής ουσίας/ kg πλήρους ζωοτροφής	mg δραστικής ουσίας/ kg πλήρους ζωοτροφής		
E770	Alpharma AS	Μαντουραμυκινικό αμμώνιο άλφα: 1g/100g (Cygra 1%)	Σύνθεση προσθετικού: Μαντουραμυκινικό αμμώνιο άλφα 1g/100g Βενζυλική αλκοόλη: 5g/100g Χονδρασμένοι σπάδικες αραβοσίτου: qs 100g Δραστική ουσία: Μαντουραμυκινικό αμμώνιο άλφα $C_{47}H_{83}O_{17}N$ αριθμός CAS: 84878-61-5 αμμωνιακό άλας πολυαιθέρα μονοκαρβονικού οξέος, παραγόμενο από Actinomadura gammaeensis (ATCC 31585) (NRRL 12515) Συγγενείς προσμίξεις: β-μαντουραμυκινικό αμμώνιο: <10%	Γαλοπούλες	16 βδομά -δες	5	5	Απαγορεύεται η χρήση τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν από τη σφαγή Οι οδηγίες χρήσης πρέπει να αναφέρουν: «Επικίνδυνο για τα ιπποειδή» «Η τροφή αυτή περιέχει προσθετικό ομάδας των ιονοφόρων ή ταυτόχρονη χορήγηση της με ορισμένα φάρμακα (για παράδειγμα την ταμυλίνη) μπορεί να αντεδείκνυται»	15.12.2011

Αριθμός Ε.Ε.	Επωνυμία και αριθμός καταχώρη- σης του υπεύθυνου κυκλοφορίας	Προσθετικό (εμπορική ονομασία)	Σύνθεση, χημικός τύπος, περίγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη συγκέ- ντρωση mg kg ζωοτροφής	Μέγιστη συγκέ- ντρωση mg kg ζωοτροφής	Άλλες πρόνοιες	Διάρκεια έγκρισης
E 770	Roche Vitamins Europe Ltd.	Μαντουραμικινικό αμμώνιο άλφα: 1 g/100 g (Cygro 1%)	Σύνθεση προσθετικού: Μαντουραμικινικό αμμώνιο άλφα: 1g/100 g, Βενζυλική αλκοόλη: 5 g/100 g, Χονδρακασμένα σπάδικες αραβοσίτου qs 100 g Δραστική ουσία: Μαντουραμικινικό αμμώνιο άλφα: $C_{12}H_{19}O_{17}N$ Αριθ. CAS: 84878-61-5, αμμωνιακό άλας πολυαιθέρα μονοκαρβονικού οξέος, παραγόμενο από <i>Acetivomadura</i> <i>guyanaensis</i> (ATCC 31585) (NRRL 12515) Συγγενείς προσαρμείς: β-μαντουραμικινικό αμμώνιο : <10%	Κοτόπουλα παχυνόμενα	-	5	5	Απαγορεύεται η χορήγηση τουλάχιστον 5 ημέρες πριν από τη σφαγή. Οι οδηγίες χρήσης πρέπει να αναφέρουν: "Επικίνδυνο για τα ιπποειδή". "Η τροφή αυτή περιέχει προσθετικό της ομάδας των ιονοφόρων η ταυτόχρονη χορήγηση της με ορισμένα φάρμακα (την παμουλίνη, για παράδειγμα) μπορεί να αντενδείκνυται".	30.9.2009
E 771	Janssen Animal Health B.V.B.A.	Δικλαζουρλη 0,5 g/100 g (Clinacox 0,5% Premix)	Σύνθεση προσθετικού: Δικλαζουρλη: 0,5 g/100 g Σογιόλευρο: 99,25 g/100 g Πολυβιδόνη K 30: 0,2 g/100 g Υδροξείδιο του νατρίου: 0,0538 g/100 g	Κοτόπουλα παχυνόμενα	-	1	1	Απαγορεύεται η χορήγηση τουλάχιστον 5 ημέρες πριν από τη σφαγή.	30.9.2009

Αριθμός Ε.Ε.	Επωνυμία και αριθμός καταχώρη- σης του υπεύθυνου κυκλοφορίας	Προσθετικό (εμπορική ονομασία)	Σύνθεση, χημικός τύπος, περίγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη συγκέ- ντρωση	Μέγιστη συγκέ- ντρωση	Άλλες πρόνοιες	Διάρκεια έγκρισης
						mg δραστικής ουσίας/ kg πλήρους ζωστροφής	mg δραστικής ουσίας/ kg πλήρους ζωστροφής		
		Δικλαζουρίλη 0,2 g/100 g (Clinacox 0,2% Pre- mix)	Δικλαζουρίλη: 0,2 g/100 g Σογνάλευρο: 39,7 g/100 g Πολυβιδόνη K 30: 0,08 g/100 g Υδροξείδιο του νατρίου: 0,0215 g/100 g Πιτυρδάλευρα σίτου: 60 g/100 g Δραστική ουσία: Diclazuril, C ₁₇ H ₉ Cl ₃ N ₄ O ₂ , (±)-4-χλωροφαινυλ(2,6- διχλωρο-4-(2,3,4,5-τετραυδρο- 3,5-διοξυ-1,2,4-τριαζίν- 2-υλ)φαινυλ)ακετοντρίλιο, Αριθ. CAS: 101831-37-2 Συγγενείς προσμείξεις: Προϊόν διάσπασης (R084318): ≤ 0,2% Λοιπές συγγενείς προσμείξεις: (R066891, R066896, R068610, R070156, R088584, R070016): ≤ 0,5% μεμονωμένως Σύνολο προσμείξεων: ≤1,5%	Γάλοι	12 βδο- μάδες	1	1	Απαγορεύεται η χορήγηση τουλάχισ- τον 5 ημέρες πριν από τη σφαγή.	28.2.2011

Αριθμός Ε.Ε.	Επωνυμία και αριθμός καταχώρη- σης του υπεύθυνου κυκλοφορίας	Προσθετικό (εμπορική ονομασία)	Σύνθεση, χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη συγκέ- ντρωση		Μέγιστη συγκέ- ντρωση	Άλλες προνοιές	Διάρκεια εγκρίσης
						mg δραστικής ουσίας/	kg πλήρους ζωοτροφής			
	Janssen animal Health BVBA	Δικλαζουρίλη 0,5 g/100g (Clinacox 0,5% Premix)	Σύνθεση πρώτης ύλης: Δικλαζουρίλη: 0,5g/100g Σογιάλευρο: 99,25g/100g Πολυβιδόνη K 30: 0,2g/100g Υδροξείδιο του νατρίου: 0,0538g/100g	Όρνιθες αυγοπαργω γής	16 βδομά -δες	1	1	1		20.1.2013
		Δικλαζουρίλη 0,2g/100g (Clinacox 0,2% Premix)	Δικλαζουρίλη: 0,2 g/100g Σογιάλευρο: 39,7 g/100g Πολυβιδόνη K 30: 0,08g/100g Υδροξείδιο του νατρίου: 0,0215g/100g Πιρουπιδλευρα: 30/100g							
			Δραστική ουσία: Δικλαζουρίλη, $C_{17}H_{19}Cl_3N_4O_2$, (±)-4-χλωροφαινόλο [2,6- δichλωρο-4-(2,3,4,5-τετραυδρο- 3,5διοξο-1,2,4-τριαζίν-2- yl)φαινυλ]ακετονιτρίλιο. Αριθμός CAS: 101831-37-2 Συγγενείς προσαρτήσεις: Προϊόν διάσπασης (RO64318): ≤ 0,2% Άλλες συγγενείς προσαρτήσεις (RO66891, RO66896, RO68610, RO70156, RO68584, RO70016): ≤ 0,5% εκάστη Σύνολο προσαρτήσεων: ≤ 1,5%							

Αριθμός Ε.Ε.	Επωνυμία και αριθμός καταχώρη- σης του υπεύθυνου κυκλοφορίας	Προσθετικό (εμπορική ονομασία)	Σύνθεση, χημικός τύπος, περίγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη συγκέ- ντρωση mg δραστικής ουσίας/ kg πλήρους ζωοτροφής	Μέγιστη συγκέ- ντρωση	Άλλες πράξεις	Διάρκεια έγκρισης
E 772	Eli Lilly and Company Ltd.	Ναραζίνη 80 g/kg - Νικαρβαζίνη 80 g/kg (Maxiban G 160)	Σύνθεση προσθετικού: Ναραζίνη: δραστικότητα 80 g/kg Νικαρβαζίνη: 80 g/kg Έλαιο σόγιας ή ορυκτό λάδι: 10-30 g/kg Βερμικουλίτης: 0-20 g/kg Μικροχρηθέντης F-Red: 11 g/kg Χονδραλεσμένοι σπάδικες αρθροσίου ή φλοιό ρυζιού qs 1 kg Δραστική ουσία: α) Ναραζίνη, $C_{23}H_{22}O_{11}$, Αριθ. CAS: 55134-13-9, πολυαιθέρας μονοκαρβονικού οξέος, παράγόμενο από Streptomyces aureofaciens (NRRL 8092), σε κοκκώδη μορφή, δραστικότητα ναραζίνης Α: $\geq 85\%$ β) Νικαρβαζίνη, $C_{17}H_{18}N_6O_6$ Αριθ. CAS: 330-95-0 Ισομερικό σύμπλοκο 1,3-δης (4-νιτροφαινυλ) ουρίας και 4,6- διμεθυλοατριμιδινόλης-2, σε κοκκώδη μορφή Συγγενείς προσμίξεις: π-νιτρο-ανιλίνη: $\leq 1\%$	Κοτόπουλα ποχυνόμενα	-	80	100	Απαγορεύεται η χορήγηση τουλάχισ- τον 5 ημέρες πριν από τη σφαγή. Οι οδηγίες χρήσης πρέπει να αναφέρουν: "Επικίνδυνο για τα παιδιά". "Η τροφή αυτή περιέχει προσθετικό της ομάδας των ιονοφόρων η ταυτόχρονη χορήγηση της με ορισμένα φάρμακα (την παμουλίνη, για παράδειγμα) μπορεί να αντενδείκνυται".	30.9.2009

(1) Βιβλιογραφία: Fresenius Z. Anal. Chem. (1984) 318: 522-524, Springer-Verlag, 1984.

Αριθμός Ε.Ε.	Προσθετικό	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη συγκέντρωση		Μέγιστη συγκέντρωση	Άλλες προνοιες	Διάρκεια έγκρισης
					mg/ kg πλήρους ζωοτροφής				
E 160c E 160e E 160f E 161b E 161c E 161g	ΣΤ. Χρωστικές ουσίες 1. <u>Καροτινοειδή και</u> <u>ξανθοφύλλες</u> Κανθαξανθίνη β-απω-8-καροτενόλη β-απω καροτενοϊκός αιθυλεστέρι Λουτεΐνη (αχρίνη) Κρυπτοξανθίνη Κανθαξανθίνη	C ₄₀ H ₅₆ O ₃ C ₃₀ H ₄₀ O C ₃₂ H ₄₄ O ₂ C ₄₀ H ₅₆ O ₂ C ₄₀ H ₅₆ O C ₄₀ H ₅₂ O ₂	Πουλερικά Πουλερικά εκτός ορνίθων αυγοπαράγωγής Όρνιθες αυγοπαράγωγής	- - - - - -	- - - - - -	80 για ουσία μόνη της ή με άλλα (καροτινοειδή και ξανθοφύλλες) 25 8	- - - - - Η ανάμειξη κανθαξανθίνης με άλλα καροτινοειδή και ξανθοφύλλες επιτρέπεται εφόσον η συνολική συγκέντρωση του μίγματος δεν υπερβαίνει τα 80mg/kg στην πλήρη ζωοτροφή	Χωρίς χρονι- κό περιο- ρισμό	

Αριθμός Ε.Ε.	Προσθετικό	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη συγκέντρωση		Μέγιστη συγκέντρωση	Άλλες πρόνοιες	Διάρκεια έγκρισης
					mg/ kg πλήρους ζωοτροφής				
					-	-	25		
E 161h	Ζεαξανθίνη	C ₄₀ H ₅₆ O ₂	Σκύλοι, γάτες και ψάρια ευνδρείου	-	-	-	-	-	Χωρίς χρονι- κό περιο- ρισμό
E161i	Κιτταξανθίνη	C ₃₃ H ₄₄ O	Πουλερικά Όρνιθες ωοτοκίας	-	-	80 για ουσία μόνη της ή με άλλα καρπονοειδή ή και ξανθο- φύλλες	-		

Αριθμός Ε.Ε.	Προσθετικό	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Μέγιστη συγκέντρωση		Άλλες πρόνοιες	Διάρκεια έγκρισης
					Ελάχιστη συγκέντρωση	mg/ kg πλήρους ζωοτροφής		
E161j	Ασταξανθίνη	$C_{40}H_{52}O_4$	Σολωμός, πέστροφες	-	-	100	Επιτρέπεται μόνο μετά την ηλικία των έξι μηνών. Το μίγμα κανθαξανθίνης με ασταξανθίνη επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι η συνολική συγκέντρωση του μίγματος δεν υπερβαίνει τα 100mg/kg στις πλήρεις ζωοτροφές	Χωρίς χρονι- κό περιο- ρισμό
			Ψάρια ενυδρείου	-	-	-		

Αριθμός Ε.Ε.	Προσθετικό	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη συγκέντρωση		Μέγιστη συγκέντρωση	Άλλες πρόνοιες	Διάρκεια έγκρισης
					mg/ kg πλήρους ζωτροφής				
	3. Χρωστικές ουσίες που επιτρέπονται από τους κοινοτικούς κανονισμούς για το χρωματισμό των τροφίμων, εκτός από το Patent blue V και το πράσινο δέινο λαμπρό BS και της κανθαξανθίνης	-	Όλα τα είδη ή κατηγορίες ζώων με εξαίρεση τους σκύλους και τους γάτους	-	-	-	-	Επιτρέπεται στις ζωτροφές μόνο για επεξεργασμένα προϊόντα από: (i) υποπροϊόντα τροφίμων, ή (ii) άλλες πρώτες ύλες, εκτός των δημητριακών και αλεύρων μανιόκας, μεταυσιωμένες από αυτούς τους παράγοντες ή χρωματισμένες κατά την τεχνική επεξεργασία για εξασφάλιση της αναγκαίας ταυτοποίησης διαρκούσης της βιομηχανοποίησης	
			Σκύλοι, γάτοι	-	-	-	-		

Αριθμός Ε.Ε.	Προσθετικό	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη συγκέντρωση		Μέγιστη συγκέντρωση	Άλλες πράξεις	Διάρκεια έγκρισης
					mg/ kg πλήρους ζωοτροφής				
	3.1 Κανθαξανθίνη επιτρεπόμενη για τον χρωματισμό τροφίμων σύμφωνα με τους κανόνες της Κοινότητας		Όλα τα είδη ή οι κατηγορίες ζώων πλην πουλερικών, σολομών, πεστράφων, σκύλων και γάτων	-	-	-	-	Επιτρέπεται για ζωοτροφές μόνο σε μεταποιημένα προϊόντα από: i) υπολείμματα τροφίμων, ή ii) άλλες πρώτες ύλες, εκτός των δημητριακών και αλεύρων μανιόκας, μετουσιωμένες με τα εν λόγω μέσα ή χρωματισμένες στη διάρκεια της τεχνικής παρασκευής ώστε να διασφαλιστεί η αναγκαία ταυτοποίηση κατά τη βιοχημική παραγωγή	
			Σκύλοι	-	-	-	-		

Αριθμός Ε.Ε.	Προσθετικό	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Μέγιστη συγκέντρωση		Άλλες προνοιες	Διάρκεια έγκρισης
					Ελάχιστη συγκέντρωση	mg/ kg πλήρους ζωοτροφής		
			Γάτες			25	Επιτρέπεται για ζωοτροφές μόνο σε μεταποιημένα προϊόντα από: i) υπολείμματα τροφίμων, ή ii) άλλες πρώτες ύλες, εκτός των δημητριακών και αλεύρων μανιόκας, μετουσιωμένες με τα εν λόγω μέσα ή χρωματισμένες στη διάρκεια της τεχνικής παρασκευής ώστε να διασφαλίζεται η αναγκαία ταυτοποίηση κατά τη βιομηχανική παραγωγή	
			Πουλερικά εκτός ορνίθων αυγοπαραγωγής, σολομοί, πέστρες			8		
			όρνιθες αυγοπαραγωγής					

Αριθμός Ε.Ε.	Στοιχείο	Προσθετικό	Χημικός τύπος, περίγραφή	Μέγιστη περιεκτικότητα του στοιχείου σε mg/kg πλήρους ζωτροφής ή σε mg/ημέρα	Άλλες πρόνοιες	Διάρκεια εγκρίσης
E1	Θ. Ιχθυοστοιχεία Σίδηρος - Fe	Ένυδρο χηλικό σύμπλοκο σιδήρου- αμινοξέων Ανθρακικός σίδηρος Διχλωριούχος σίδηρος, τετραένυδρος Τριχλωριούχος σίδηρος, εξένυδρος Κίτρικος σίδηρος, εξένυδρος Φουμαρικός σίδηρος Γαλακτικός σίδηρος, τριένυδρος Τριοξείδιο του σιδήρου Θεικός σίδηρος, μονοένυδρος Θεικός σίδηρος, επταένυδρος	$\text{Fe}(\text{X})_{1-3} \cdot \text{nH}_2\text{O}$ (όπου x ανιόντα αμινοξέων παραγόμενων με υδρόλυση φυτικών πρωτεϊνών). Μοριακό βάρος μέχρι 1500 FeCO_3 $\text{FeCl}_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ $\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ $\text{Fe}_3(\text{C}_6\text{H}_5\text{O}_7)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ $\text{FeC}_4\text{H}_2\text{O}_4$ $\text{Fe}(\text{C}_3\text{H}_5\text{O}_3)_2 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ Fe_2O_3 $\text{FeSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$	Πρόβλεψη: 500 (σύνολο) mg/kg πλήρους ζωτροφής Ζώα συντροφιάς: 1 250 (σύνολο) mg/kg πλήρους ζωτροφής Χαίροι: -Χοιρίδια μέχρι μιας εβδομάδας πριν τον απογαλακτισμό: 250mg/ημέρα -Λοιποί χαίροι: 750 (σύνολο) mg/kg πλήρους ζωτροφής Λοιπά είδη: 750 (σύνολο) mg/kg πλήρους ζωτροφής.		

Αριθμός Ε.Ε.	Στοιχείο	Προσθετικό	Χημικός τύπος, περιγραφή	Μέγιστη περιεκτικότητα του στοιχείου σε mg/kg πλήρους ζωτροφής ή σε mg/ημέρα	Άλλες προνοιες	Διάρκεια έγκρισης
E2	Ιώδιο-I	Ιωδικό ασβέστιο, εξαένυδρο Ιωδικό ασβέστιο, άνυδρο Ιωδιούχο νάτριο Ιωδιούχο κάλιο	$\text{Ca}(\text{IO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ $\text{Ca}(\text{IO}_3)_2$ NaI KI	Ιπποειδή: 4 (ολικό) Ψάρια: 20 (ολικό) Άλλα είδη ή κατηγορίες ζώων: 10 (ολικό)	- - - -	
E3	Κοβάλτιο-Co	Οξικό κοβάλτιο, τετραένυδρο Βασικό ανθρακικό κοβάλτιο, ένυδρο Χλωριούχο κοβάλτιο, εξαένυδρο Θειικό κοβάλτιο, επταένυδρο Θειικό κοβάλτιο, μονοένυδρο Νιτρικό κοβάλτιο, εξαένυδρο	$\text{Co}(\text{CH}_3\text{COO})_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ $2\text{CoCO}_3 \cdot 3\text{Co}(\text{OH})_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ $\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ $\text{CoSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ $\text{CoSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ $\text{Co}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$	2 (ολικό)	- - - - - -	

Αριθμός Ε.Ε.	Στοιχείο	Προσθετικό	Χημικός τύπος, περιγραφή	Μέγιστη περιεκτικότητα του στοιχείου σε mg/kg πλήρους ζωτροφής ή σε mg/ημέρα	Άλλες πρόνοιες	Διάρκεια έγκρισης
E4	Χαλκός –Cu	Οξικός χαλκός, μονοένυδρος Βασικός ανθρακικός χαλκός, μονοένυδρος Χλωριούχος χαλκός, διένυδρος Μεθειονινικός χαλκός Οξείδιο του χαλκού Θειικός χαλκός, πενταένυδρος	$Cu(CH_3COO)_2 \cdot H_2O$ $CuCO_3 \cdot Cu(OH)_2 \cdot H_2O$ $CuCl_2 \cdot 2H_2O$ $Cu(C_2H_5NO_2S)_2$ CuO $CuSO_4 \cdot 5H_2O$	Χοίροι -χοιρίδια έως και 12 βδομάδων: 170 (σύνολο) -λοιποί χοίροι: 25 (σύνολο) Βοοειδή 1. –βοοειδή πριν από την έναρξη του μηρικούσμου: -υποκατάστατα γάλακτος: 15 (σύνολο) -λοιπές πλήρεις ζωτροφές: 15 (σύνολο) 2. –λοιπές πλήρεις ζωτροφές: 35 (σύνολο) Πρόβατα: 15 (σύνολο) Ψάρια: 25 (σύνολο) Μαλακόστρακα: 50 (σύνολο) Άλλα είδη: 25 (σύνολο)	Στην επισήμανση και στα συνοδευόντα έγγραφα πρέπει να δηλώνονται τα ακόλουθα: - Για τα πρόβατα: Όπου το επίπεδο του χαλκού στις ζωτροφές υπερβαίνει τα 10mg/kg: «το επίπεδο του χαλκού στη ζωτροφή αυτή μπορεί για ορισμένες φυλές προβάτων, να προκαλέσει δηλητηρίαση». - Για τα βοοειδή μετά την έναρξη του μηρικούσμου: Όπου το επίπεδο χαλκού στις ζωτροφές είναι μικρότερο από 20mg/kg: «το επίπεδο του χαλκού στη ζωτροφή αυτή μπορεί να προκαλέσει ελλείψεις σε χαλκό σε βοοειδή που βασκούν σε βοσκότοπους με υψηλή περιεκτικότητα σε μολυβδαίνιο ή θείο».	

Αριθμός Ε.Ε.	Στοιχείο	Προσθετικό	Χημικός τύπος, περιγραφή	Μέγιστη περιεκτικότητα του στοιχείου σε mg/kg πλήρους ζωτροφής ή σε mg/ημέρα	Άλλες πρόνοιες	Διάρκεια έγκρισης
E5	Μαγγάνιο-Mn	Ανθρακικό μαγγάνιο Χλωριούχο μαγγάνιο, τετραένυδρο Μονόξινο φωσφορικό μαγγάνιο, τριένυδρο Οξείδιο του μαγγανίου Τριοξείδιο του μαγγανίου Θεικό μαγγάνιο, τετραένυδρο Θεικό μαγγάνιο, μονοένυδρο Τετροξείδιο του τριμαγγανίου Μαγγανική χηλική ένωση αμινοξέων, ενυδατωμένη	MnCO_3 $\text{MnCl}_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ $\text{MnHPO}_4 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ MnO Mn_2O_3 $\text{MnSO}_4 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ $\text{MnSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ MnOMn_2O_3 $\text{Mn}(\chi)_{1,3} \cdot \text{nH}_2\text{O}$ (χ=ανιόν κάθε αμινοξέος παράγωγου πρωτεϊνών σύνταξης που έχουν υποβληθεί σε υδρόλυση) Μοριακό βάρος μικρότερο από 1500	- - - - - - - -	Κατ' ανώτατο όριο 40mg μαγγανίου/kg πλήρους ζωτροφής επιτρέπεται να προέρχονται από μαγγανική χηλική ένωση αμινοξέων, ενυδατωμένη	Χωρίς χρονικό περιορισμό

Αριθμός Ε.Ε.	Στοιχείο	Προσθετικό	Χημικός τύπος, περιγραφή	Μέγιστη περιεκτικότητα του στοιχείου σε mg/kg πλήρους ζωτροφής ή σε mg/ημέρα	Άλλες πρόνοιες	Διάρκεια έγκρισης
E6	Ψευδάργυρος- Zn	Γαλακτικός ψευδάργυρος, τριένυδρος Οξικός ψευδάργυρος, διένυδρος Ανθρακικός ψευδάργυρος Χλωριούχος ψευδα- ργυρος, μονοένυδρος Οξείδιο του ψευδα- ργύρου Θειικός ψευδάργυρος, επταένυδρος Θειικός ψευδάργυρος, μονοένυδρος	$Zn(C_3H_5O_3)_2 \cdot 3H_2O$ $Zn(CH_3COO)_2 \cdot 2H_2O$ $ZnCO_3$ $ZnCl_2 \cdot H_2O$ ZnO $ZnSO_4 \cdot 7H_2O$ $ZnSO_4 \cdot H_2O$	Ζώα συντροφίας: 250 (σύνολο) Ψάρια: 200 (σύνολο) Άλλα ζώα: 150 (σύνολο) Υποκατάστατα γλάκτος: 200 (σύνολο)	- - - - Μέγιστη περιεκτικότητα σε μόλυβδο 600 mg/kg	
E7	Μολυβδαίνιο-Mo	Χηλική ένωση αμινοξέων ψευδαργύρου ενυδατωμένη	$Zn(x)_1.3.nH_2O$ (x=ανιόν κάθε αμινοξέος παραγώγου πρωτεϊνών σύνθης που έχουν υποβληθεί σε υδρόλυση) Μοριακό βάρος μικρότερο από 1500	2,5 (ολικό)	Κατ' ανώτατο όριο 80mg ψευδάργυρου/kg πλήρους ζωτροφής επιτρέπεται να προέρχονται από χηλική ένωση αμινοξέων ψευδαργύρου, ενυδατωμένη	Χωρίς χρονικό περιορισμό
E8	Σελήνιο - Se	Μολυβδανικό αμιμόνιο Μολυβδανικό νάτριο Σεληνιώδες νάτριο Σεληνικό νάτριο	$(NH_4)_6MoO_7O_{24} \cdot 4H_2O$ $Na_2MoO_4 \cdot 2H_2O$ Na_2SeO_3 Na_2SeO_4	0,5 (ολικό)	- - - -	

Αριθ. καταχώρησης (ή αριθ. Ε.Κ.)	Προσθετικό	Σύνθεση, χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικότητα	Μέγιστη περιεκτικότητα	Άλλες πρόνοιες	Διάρκεια έγκρισης
					mg δραστικής ουσίας/kg πλήρους ζωοτροφής			
1.1	<u>ΙΒ. ΣΥΝΔΕΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΟΞΥΔΩΣΙΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΥΡΚΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ</u> 1. Συνδετικές ουσίες ραδιενεργού καϊσίου (¹³⁷ Cs και ¹³⁴ Cs) Σιδηροκυανιούχος (II) αμμωνιοσιδηρού (III)	NH ₄ Fe(III)[Fe(II)(CN) ₆]	Μηρυκαστικά	-	50	500	Να αναφέρεται στις οδηγίες χρήσης: «Μόνο για περιορισμένες γεωγραφικές περιοχές στην περίπτωση μόλυνσης από ραδιονουκλidia» «Η ποσότητα σιδηροκυανιούχου (II) αμμωνιοσιδηρού (III) στο ημερήσιο σιτηρέσιο πρέπει να είναι μεταξύ 10mg και 150mg για 10kg σωματικού βάρους»	
					50	500		
			Δαμάδια	-				

Αριθ. καταχώ- ρησης (ή αριθ. Ε.Κ.)	Προσθετικό	Σύνθεση, χημικός τύπος, περίγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτι- κότητα		Μένιστη περιεκτι- κότητα κόπτη	Άλλες πρόνοιες	Διάρκε- ια έγκρι- σης
					mg δραστικής ουσίας/kg πλήρους ζωοτροφής	κόπτη			
							50		
			Αρνιά πριν από την έναρξη μηρυκασμού	-	50	500		Na αναφέρεται στις οδηγίες χρήσης: «Μόνο για περιορισμένες γεωγραφικές περιοχές στην περίπτωση μόλυνσης από ραδιονουκλidia» «Η ποσότητα σιδηροκυανιούχου (II) αμμωνιοσιδήρου (III) στο ημερήσιο σπέρμα πρέπει να είναι μεταξύ 10mg και 150mg για 10kg σωματικού βάρους»	
			Ερίφια πριν από την έναρξη μηρυκασμού		50	500			
			Χοίροι		500	500			

Αριθ. καταχώρησης (ή αριθ. Ε.Κ.)	Προσθετικό	Σύνθεση, χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικότητα		Μέγιστη περιεκτικότητα	Άλλες προνοιες	Διάρκεια έγκρισης
					Μέγιστη ηλικία	Μέγιστη περιεκτικότητα			
Ε 1600	ΙΔ. Ένζυμα 3-φωτάση EC 3.1.3.8	Παρασκεύασμα 3-φωτάσης παραγόμενο από <i>Aspergillus niger</i> (CBS 114.94) με ελάχιστη δραστηριότητα: Στερεά μορφή: 5 000 FTU/g ⁰ Υγρή μορφή: 5 000 FTU/ml	Χοιρδία	2 μήνες	500 FTU	-	-	1. Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμύγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης και η σταθερότητα έναντι του σχηματισμού συσφαιρωμάτων 2. Συνιστώμενη δόση ανά kg πλήρους ζωοτροφής: 500 FTU 3. Για χρήση στις σύνθετες ζωοτροφές με συγκέντρωση πλάσιν του 0,23% σε φυτικά φωσφορικά άλατα	Χωρίς χρονικό περιορισμό

Αριθ. καταχώρησης (ή αριθ. Ε.Κ.)	Προσθετικό	Σύνθεση, χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικότητα		Μέγιστη περιεκτικότητα	Άλλες προνοιες	Διάρκεια έγκρισης
					mg δραστικής ουσίας/kg πλήρους ζωοτροφής				
			Χοίροι παχυνόμενοι	-	280 FTU	-	-	1. Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμήγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα έναντι του σχηματισμού συσφαιρωμάτων. 2. Συνιστώμενη δόση ανά kg πλήρους ζωοτροφής: 400-500 FTU 3. Για χρήση στις σύνθετες ζωοτροφές με συγκέντρωση πλέον του 0,23% σε φυτικά φωσφορικά άλατα	Χωρίς χρονικό περιορισμό

Αριθ. καταχώ-ρησης (ή αριθ. Ε.Κ.)	Προσθετικό	Σύνθεση, χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτι-κότητα	Μέγιστη περιεκτι-κότητα	Άλλες προνόμιες	Διάρκεια έγκρι-σης
			Χοιρομητέρες	-	375 FTU	mg δραστικής ουσίας/kg πλήρους ζωοτροφής	1. Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμύγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης και η σταθερότητα έναντι του σχηματισμού συσφαιρωμάτων 2. Συνιστώμενη δόση ανά kg πλήρους ζωοτροφής: 500 FTU 3. Για χρήση στις σύνθετες ζωοτροφές με συγκέντρωση πλέον του 0,23% σε φυτικά φωσφορικά άλατα	

Αριθ. καταχώρησης (ή αριθ. Ε.Κ.)	Προσθετικό	Σύνθεση, χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικότητα		Μέγιστη περιεκτικότητα	Άλλες προνοίες	Διάρκεια έγκρισης
					mg δραστικής ουσίας/kg πλήρους ζωοτροφής				
			Κατόπλουα παχυνόμενα		375	FTU	-	1. Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμηνματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης και η σταθερότητα έναντι του σχηματισμού συσφαιρωμάτων 2. Συνιστώμενη δόση ανά kg πλήρους ζωοτροφής 500-700 FTU 3. Για χρήση στις σύνθετες ζωοτροφές με συγκέντρωση πλέον του 0,23% σε φυτικά φωσφορικά άλατα	

Αριθ. καταχώ-ρησης (ή αριθ. Ε.Κ.)	Προσθετικό	Σύνθεση, χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτι-κότητα	Μένιστη περιεκτι-κότητα	Άλλες προνοιες	Διάρκεια έγκρι-σης
					mg δραστικής ουσίας/kg πλήρους ζωοτροφής			
			Ορνίθες ζωοκλάς		250FTU	-	1. Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμύγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα έναντι σχηματισμού συσφαιρωμάτων 2. Συνιστώμενη δόση ανά kg πλήρους ζωοτροφής: 300-400 FTU 3. Για χρήση στις σύνθετες ζωοτροφές με συγκέντρωση πλέον του 0,36% σε φυτικά φωσφορικά άλατα	Χωρίς Χρονι-σμό

Αριθ. καταχώρησης (ή αριθ. Ε.Κ.)	Προσθετικό	Σύνθεση, χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικότητα	Μέγιστη περιεκτικότητα	Άλλες προνοιες	Διάρκεια έγκρισης
					mg δραστικής ουσίας/kg πλήρους ζωοτροφής			
E1601	Ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάσχη EC 3.2.1.6 Ενδο-1,4-B-ξυλανάσχη EC 3.2.1.8	Παρασκευάσμα ενδο-1,3(4)-Β- γλυκανάσχη, και ενδο-1,4-B- ξυλανάσχη που παράγεται από Aspergillus niger (NRRL 25541) που παράγει ελάχιστη δραστικότητα: Ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάσχη 1 100 IU ⁽¹⁾ /g Ενδο-1,4-B-ξυλανάσχη 1 600 IU ⁽²⁾ /g	Κοτόπουλα παχυνόμενα	-	Ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάσχη: 138 IU Ενδο-1,4-B-ξυλανάσχη: 200 IU	-	1. Στις οδηγίες χρήσης και του προμνημύματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά kg πλήρους ζωοτροφής: Ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάσχη: 138U Ενδο-1,4-B-ξυλανάσχη: 200U 3. Προς χρήση σε συνθετικές ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινοξυλάνες και Β-γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 40% ίτα, τριτικάλη ή κριθάρι.	

Αριθμός Ε.Ε.	Προσθετικό	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη συγκέντρω- ση	Μέγιστη συγκέντρω- ση	Άλλες πρόνοιες	Διάρκεια έγκρισης
					Μονάδες δραστικότητας ανά kg πλήρους ζωοτροφής			
E 1701	ΙΕ. <u>Μικροοργανισμοί</u> Bacillus cereus var. toyoi NCIMB 40112/ CNCM 1-1012	Παρασκευάσματα του Bacillus cereus var. toyoi που περιέχει τουλάχιστον 1x10 ¹⁰ CFU/g Προσθετικού	Χοιρίδια	2 μήνες	1 x 10 ⁹	1 x 10 ⁹	Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμύγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη	
					0,5 x 10 ⁹	2 x 10 ⁹	Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμύγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη	

Αριθμός Ε.Ε.	Προσθετικό	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη συγκέντρω- ση	Μέγιστη συγκέντρω- ση	Άλλες προνοιές	Διάρκεια έγκρισης
					Μονάδες δραστικότητας ανά kg πλήρους ζωτροφής			
					4 x 10 ⁹	8 x 10 ⁹		
E1702	Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47	Παρασκευάσμα του Saccharomyces cerevisiae που περιέχει τουλάχιστον 5 x 10 ⁹ CFU/g προσθετικού	Βοοειδή παχυνόμενα	-			Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμύγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη. Οι οδηγίες χρήσης να αναφέρουν: «η ποσότητα του Saccharomyces cerevisiae στο καθημερινό σιτηρέσιο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2,5 x 10 ⁹ CFU για 100kg σωματικού βάρους και τα 0,5 x 10 ¹⁰ CFU για κάθε επιπλέον 100kg σωματικού βάρους».	

Αριθμός Ε.Ε.	Προσθετικό	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη συγκέντρω- ση	Μέγιστη συγκέντρω- ση	Άλλες προνοίες	Διάρκεια έγκρισης
					Μονάδες δραστικότητας ανά kg πλήρους ζωοτροφής			
E1703	Saccharomyces cerevisiae CNCM 1-1079	Παρασκεύασμα του Saccharomyces cerevisiae που περιέχει τουλάχιστον: 2 x 10 ¹⁰ CFU/g πρόσθετης ύλης	Χοιρίδια	-	2x10 ⁹	6 x 10 ⁸	Για χοιρίδια έως περίπου 35 kg. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμεινμάτος του πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης. η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη.	Χωρίς χρονικό περίοριο μδ.

(1) 1 ΓΤU είναι η ποσότητα ενζύμου που ελευθερώνει 1 μικρογραμμομόριο ανόργανου φωσφορικού άλατος από φυτικό νάτριο ανά λεπτό υπό pH 5,5 και σε θερμοκρασία 37°C.

(2) 1 IU είναι η ποσότητα ενζύμου που ελευθερώνει 1 μικρογραμμομόριο αναγόντων σακχάρων (ισοδυνάμων γλυκόζης) από Β-γλυκάνη κριθαριού ανά λεπτό σε pH 4,0 και 30°C.

(3) 1 IU είναι η ποσότητα ενζύμου που ελευθερώνει 1 μικρογραμμομόριο αναγόντων σακχάρων (ισοδυνάμων ξυλόζης) από ξυλάνη κριθαριού ανά λεπτό σε pH 4,0 και 30°C.

ΠΙΝΑΚΑΣ VII
(Παράρτημα Β)
ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΜΕΡΟΣ Β ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 15 ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΑ ΤΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΧΡΗΣΗ ΕΧΕΙ ΕΓΚΡΙΘΕΙ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Δεύτερη τροποποίηση που αφορά τις εξής κατηγορίες προσθετικών: Α. Κοκκιδιοστατικά και λοιπές φαρμακευτικές ουσίες, ΣΤ. Χρωστικές ουσίες, Ζ. Συντηρητικά, Θ. Ιχθυοκίτλια, ΙΒ. Συνδετικές, αντιπαρασωματικές και τμηκτικές ουσίες, ΙΓ. Ρυθμιστές οξύτητας, ΙΔ. Ένζυμα, ΙΕ. Μικροοργανισμούς, ως έχουν διαμορφωθεί μετά την τροποποίηση.

Αριθ. καταχώρησης της προσθ. ύλης	Επωνυμία αριθμός καταχώρησης του υπεύθυνου κυκλοφορίας της πρόσθετης ύλης	Προσθετικό	Σύνθεση, χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη συγκέντρωση	Μέγιστη συγκέντρωση	Άλλες πρόνοιες	Λήξη της περιόδου έγκρισης
						Μονάδα	mg/kg πλάηρους ζωοτροφής		
29	Phibro Animal Health, s.p.a	Α. "Κοκκιδιοστατικά και λοιπές φαρμακευτικές ουσίες Σεμδουραμυκινικό νάτριο (Aviact 5%)	Σύνθεση του προσθετικού: Σεμδουραμυκινικό νάτριο: 51,3 g/kg Ανθρακικό νάτριο: 40 g/kg Ορυκτέλαιο: 50 g/kg Αργιλοπυριπικό νάτριο: 20g/kg Προϊόντα ελαουργείων σόγιας: 838,7 g/kg Δραστική ουσία: Σεμδουραμυκινικό νάτριο C ₄₅ H ₇₆ O ₁₆ Na Αριθμός CAS 113378-31-7 όλος νάτριου ιονοφόρου πολυαιθέρα μονοκαρβοξυλικού οξέος που παράγεται με Acilino-madura roseonita (ATCC 53684). Συγγενείς προσμίξεις: Δεσκαρβοσεμδουραμυκίνη, 2% Δεσμεδοξιδουραμυκίνη ≤ 2% Υδροξιδουραμυκίνη, ≤ 2% Σύνολο προσμείξεων ≤ 5%	Κοτόπουλα Παχυνόμενα	-	20	25	Απαγορεύεται η χρήση τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν από τη σφαγή	1.6.2006

¹ Οι λοιπές κατηγορίες παραμένουν ως έχουν στην Κ.Δ.Π. 246/2002

Αριθμός Ε.Ε.	Προσθετικό	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη συγκέ- ντρωση Μονάδα δραστηριότητας mg/kg πλήρους ζωοτροφής	Μέγιστη συγκέ- ντρωση	Άλλες προναιες	Λήξη της περιόδου έγκρισης
	Στ. Χρωστικές ουσίες 1. Καροτινοειδή και ξανθοφύλλες							
E160a E 161g	β-καροτίνη Κανθαξανθίνη	$C_{40}H_{56}$ $C_{40}H_{42}O_2$	Καναρίνια Πτηνά συντροφικής και διακοσμητικά	- -	- -	- -	- -	30.4.2004 (*) 30.4.2004 (*)
12	Phaffia rhodozyma πλούσια σε ασταξανθίνη (ATCC 74219)	Συμπυκνωμένη βιομάζα μαγιάς Phaffia rhodozyma (ATCC 74219), νεκρής, η οποία περιέχει τουλάχιστον 4,0 g ασταξανθίνης ανά kg προσθετικού και μέγιστη περιεκτικότητα σε εθοξυκυλίνη 2 000 mg/kg	Σολομοί	-	-	100	Η μέγιστη περιεκτικότητα εκφράζεται όσον αφορά την ασταξανθίνη. Επιτρέπεται η χρήση μόνο μετά την ηλικία των έξι μηνών. Το μίγμα του προσθετικού με την κανθαξανθίνη επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι η συνολική ποσότητα της ασταξανθίνης και κανθαξανθίνης δεν υπερβαίνει τα 100 mg/kg πλήρους ζωοτροφής. Δηλώνεται η περιεκτικότητα σε εθοξυκυλίνη	30.4.2004 (*)
			Πίστρες	-	-	100	Η μέγιστη περιεκτικότητα εκφράζεται όσον αφορά την αστα- ξανθίνη. Επιτρέπεται η χρήση μόνο μετά την ηλικία των έξι μηνών. Το μίγμα του προσθετικού με την κανθαξανθίνη επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι η συνολική ποσότητα της ασταξανθίνης και κανθαξανθίνης δεν υπερβαίνει τα 100 mg/kg πλήρους ζωοτροφής. Δηλώνεται η περιεκτικότητα σε εθοξυκυλίνη	30.4.2004 (*)

Αριθμός Ε.Ε.	Προσθετικό	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη συγκέ- ντρωση · Μονάδα δραστηρότητας mg/kg πλήρους ζωοτροφής		Μέγιστη συγκέ- ντρωση · Μονάδα δραστηρότητας mg/kg πλήρους ζωοτροφής	Άλλες πρόνοιες	Λήξη της περιόδου έγκρισης
	2. Άλλες χρωστικές ύλες								
E 102	Ταρζανίνη	$C_{18}H_{16}N_4O_8S_2Na_3$	Σποροφάγα διακοσμητικά πτηνά	-	-	150	-	-	30.9.2004 (*)
			Μικρά τρωκτικά	-	-	150	-	-	30.9.2004 (*)
E 110	Κίτρινο πορτοκαλί FCF	$C_{18}H_{10}N_2O_7S_2Na_2$	Σποροφάγα διακοσμητικά πτηνά	-	-	150	-	-	30.9.2004 (*)
			Μικρά τρωκτικά	-	-	150	-	-	30.9.2004 (*)
E 131	Πρότυπο κυανού V	Άλς ασβεστίου του μ-υδροξυτετρα- αιθυλοδιαμινωφαινυλο- καρβινολο διασουλφονικού οξέος (ανυδρίτης)	Σποροφάγα διακοσμητικά πτηνά	-	-	150	-	-	30.9.2004 (*)
			Μικρά τρωκτικά	-	-	150	-	-	30.9.2004 (*)
E 141	Σύνθετο χαλκού χλωροφύλλης		Σποροφάγα διακοσμητικά πτηνά	-	-	150	-	-	30.9.2004 (*)
			Μικρά τρωκτικά	-	-	150	-	-	30.9.2004 (*)

Αριθμός Ε.Ε.	Προσθετικό	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη συνέ- ντρωση	Μέγιστη συνέ- ντρωση	Άλλες προνοιες	Λήξη της περιόδου εγκρίσης
					Μονάδα δραστηκότητας mg/kg πλήρους ζωοτροφής			
1	Ζ Συντηρητικά Βενζοϊκό νάτριο 140 g/kg Προπιονικό οξύ 370 g/kg Προπιονικό νάτριο 110 g/kg νάτριο 110 g/kg	Σύνθεση του προσθετικού Βενζοϊκό νάτριο: 140 g/kg Προπιονικό οξύ: 370 g/kg Προπιονικό νάτριο: 110 g/kg Νερό: 380 g/kg Δραστική ουσία: Βενζοϊκό νάτριο, C ₇ H ₅ O ₂ Na Προπιονικό οξύ, C ₃ H ₆ O ₂ Προπιονικό νάτριο, C ₃ H ₅ O ₂ Na	Χοίροι Αγελάδες αρμεγόμενες	-	3 000	22 000	Για τη διατήρηση σπάρων με περιεκτικότητα σε υγρασία άνω του 15%	1.8.2006
				-	3 000	22 000	Για τη διατήρηση σπάρων με περιεκτικότητα σε υγρασία άνω του 15%	1.8.2006

Αριθμός Ε.Ε.	Προσθετικό	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη συγκέ- ντρωση Μονάδες δραστηριότητας ανά kg πλήρους ζωοτροφής	Μέγιστη συγκέ- ντρωση Μονάδες δραστηριότητας ανά kg πλήρους ζωοτροφής	Άλλες προνοιες	Λήξη της περιόδου έγκρισης
E210	ΙΓ. Ρυθμιστές οξύτητας Βενζοϊκό οξύ	$C_7H_6O_2$	Χοίροι παχυνόμενοι	-	5 000	10 000		25.5.2007
1	ΙΔ. Ένζυμα 3-φυτάσης EC 3.1.3.8	Παρασκευάσμα 3-φυτάσης που παράγεται από τον <i>Aspergillus niger</i> (CBS 114.94) που παρουσιάζει ελάχιστη δραστηριότητα φυτάσης 5 000 FTU ⁽²⁾ /g για στερεά και υγρά παρασκευάσματα	Γάλοι	-	125 FTU	-	1. Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμυγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά kg πλήρους ζωοτροφής: 200-800 FTU 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές που περιέχουν τουλάχιστον 0,3% άλας φυτικού οξέος, π.χ. 20% σίτου.	30.4.2004 (*)
2	3-φυτάση EC 3.1.3.8	Παρασκευάσμα 3-φυτάσης που παράγεται από τον <i>Aspergillus oryzae</i> (DSM 10289) που παρουσιάζει ελάχιστη δραστηριότητα: Επικαλυμμένη μορφή: 2 500 FYT (%) Υγρή μορφή: 5000 FYT/g	Χοιρίδια	4 μήνες	250 FYT	1 000 FYT	1. Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμυγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά kg πλήρους ζωοτροφής: 500 FYT 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε άλατα φυτικού οξέος, π.χ. που περιέχουν πάνω από 40% σίτο (καλαμπόκι, κριθή, βρώμη, σίτο, σίκαλη, τριπλάλε), ελαιούχους σπόρους και όσπρια	30.6.2004 (*)
			Χοίροι παχυνόμενοι	-	400 FYT	1 000 FYT	1. Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμυγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά kg πλήρους ζωοτροφής: 500 FYT 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε άλατα φυτικού οξέος, π.χ. που περιέχουν πάνω από 40% σίτο (καλαμπόκι, κριθή, βρώμη, σίτο, σίκαλη, τριπλάλε), ελαιούχους σπόρους και όσπρια.	30.6.2004 (*)

Αριθμός Ε.Ε.	Προσθετικό	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη συνέ- ντρωση	Μέγιστη συνέ- ντρωση	Άλλες πρόνοιες	Λήξη της περίοδου έγκρισης
					Μονάδες δραστηκότητας ανά kg πλήρους ζωοτροφής	ανά kg πλήρους ζωοτροφής		
3	α-γαλακτοσι- δόση EC 3.2.1.22	Παρασκευάσμα α-γαλα- κτοσιδάσης που παράγεται από τον <i>Aspergillus oryzae</i> (DSM 10286) που παρασιστάει ελάχιστη δραστηκότητα: Υγρή μορφή: 1 000 GALU (*) /g	Κοτόπουλα παχυνόμενα	-	200 FYT	1 000 FYT	1. Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμίκματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά kg πλήρους ζωοτροφής: 500 FYT 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε άλατα φυτικού οξέος, π.χ. που περιέχουν πάνω από 40 % σιτηρά (καλμπόκι, κριθή, βρώμη, σίτο, σίκαλη, τριπλάλε), ελατούχους σπόρους και όσπρια.	30.6.2004 (*)
			Όνιδες αυγοπαραγω- γής	-	500 FYT	1 000 FYT	1. Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμίκματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά kg πλήρους ζωοτροφής: 750 FYT 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε άλατα φυτικού οξέος, π.χ. που περιέχουν πάνω από 40 % σιτηρά (καλμπόκι, κριθή, βρώμη, σίτο, σίκαλη, τριπλάλε), ελατούχους σπόρους και όσπρια.	30.6.2004 (*)
			Κοτόπουλα	-	300 GALU	1 000 GALU	1. Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμίκματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά kg πλήρους ζωοτροφής: 450 GALU 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε ολιγοσακχαρίτες, π.χ. που περιέχουν πάνω από 25% σιτηρά, ελατούχους σπόρους και όσπρια.	30.6.2004(*)

Αριθμός Ε.Ε.	Προσθετικό	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη συνέ- ντωση Μονάδες δραστηκότητας ανά kg πλήρους ζωοτροφής	Μέγιστη συνέ- ντωση Μονάδες δραστηκότητας ανά kg πλήρους ζωοτροφής	Άλλες προνοίες	Λήξη της περίοδου έγκρισης
4	Ενδο-1,3(4)-β- γλυκανάση EC 3.2.1.6	Παρασκευάσμα ενδο-1,3 (4)-β-γλυκανάσης που παράγεται από <i>Aspergillus aculeatus</i> (CBS 589.94) που παρουσιάζει ελάχιστη δραστικότητα: Επικαλυμμένη μορφή: 50 FBG (°)/g Υγρή μορφή: 120 FBG/ml	Χοιρίδια	4 μήνες	25 FBG	40 FBG	1. Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμینگματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά kg πλήρους ζωοτροφής: 25 FBG 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως β-γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 50% αραβόδατο ή κριθή	30.6.2004 (*)
			Κοτόπουλα παχυνόμενα	-	10 FBG	100 FBG	1. Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμینگματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά kg πλήρους ζωοτροφής: 20 FBG 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως β-γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 60% κριθή	1.4.2004 (*)

Αριθμός Ε.Ε.	Προσθετικό	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη συνέ- ντρωση	Μέγιστη συνέ- ντρωση	Άλλες πρόνοιες	Λήξη της περίοδου έγκρισης
					Μονάδες δραστηριότητας ανά kg πλήρους ζωοτροφής	ανά kg πλήρους ζωοτροφής		
5	Ενδο-1,4-β- ξυλανάση EC 3.2.1.8	Παρασκευάσμα ενδο-1,4- β-ξυλανάσης που παράγεται από Aspergillus oryzae (DSM 10287) που παρασκευάζεται ελάχιστη δραστικότητα: Επικαλυμμένη μορφή: 1 000 FXU(°)/g Υγρή μορφή: 650 FXU/ml	Κοτόπουλα παχυνόμενα	-	80 FXU	200 FXU	1. Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμینگματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά kg πλήρους ζωοτροφής: 150 EXU 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινοξυλάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 50% σίτο	30.6.2004 (*)
			Γάλα παχυνόμενοι	-	225 FXU	600 FXU	1. Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμینگματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά kg πλήρους ζωοτροφής: 225-600 FXU 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινοξυλάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 50% σίτο	30.6.2004 (*)
			Χοιρίδια	4 μήνες	200 FXU	-	1. Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμینگματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά kg πλήρους ζωοτροφής: 200 FXU 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινοξυλάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 50% σίτο	30.6.2004 (*)

Αριθμός Ε.Ε.	Προσθετικό	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη συγκέ- ντρωση ανά kg πλήρους ζωοτροφής	Μέγιστη συγκέ- ντρωση ανά kg πλήρους ζωοτροφής	Άλλες προνοιες	Λήξη της περίοδου έγκρισης
6	Ενδο-1,4-β- γλυκανάση EC 3.2.1.8 Ενδο-1,4-β- γλυκανάση EC 3.2.1.4	Παρασκευάσματα ενδο-1,4- β-γλυκανάσης και ενδο-1,4- β-γλυκανάσης που παράγεται από <i>Humicola</i> <i>insolens</i> (DSM 10442) που παρουσιάζει ελάχιστη δραστικότητα: Επικαλυμμένη μορφή: 800 FXU (g)/g 75 FBG (g)/g Μικρόκοκκοι: 800 FXU/g, 75 FBG/g Υγρή μορφή: 550 FXU/ml, 50 FBG/ml	Κοτόπουλα παχυνόμενα	-	200 FXU 19 FBG	1 000 FXU 94 FBG	1. Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμύγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά kg πλήρους ζωοτροφής: 400 FXU 38 FBG 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινογλυάνες και β-γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 30% κριθής ή/και βρώμης, σίτου	30.6.2004 (*)
			Χοιρίδια	4 μήνες	240 FXU 22 FBG	1 000 FXU 94 FBG	1. Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμύγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά kg πλήρους ζωοτροφής: 400 FXU 38 FBG 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινογλυάνες και β-γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 30% κριθής ή/και βρώμης, σίτου	30.6.2004 (*)

Αριθμός Ε.Ε.	Προσθετικό	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη συγκέ- ντρωση Μονάδες δραστηκότητας ανά kg πλήρους ζωοτροφής	Μέγιστη συγκέ- ντωση Μονάδες δραστηκότητας ανά kg πλήρους ζωοτροφής	Άλλες προνοίες	Λήξη της περίοδου έγκρισης
			Χοίροι παχυνόμενοι	-	200 FXU 19 FBG	800 FXU 75 FBG	1. Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμύγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά kg πλήρους ζωοτροφής: 400 FXU, 38 FBG 3. Προς χρήση σε συνθέτες ζωοτροφές (κυρίως αρβινοξυλάνες και β-γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 30% κριθής ή/και βρώμης, όλοιο	30.6.2004 (*)
7	Ενδο-1,4-β- γυλανόση EC 3.2.1.8 Ενδο-1,4(4)-β- γυλανόση EC 3.2.1.4	Παρασκευάσμα ενδο-1,4- β-γυλανόσης και ενδο-1,4- β-γυλικανόσης που παράγεται από <i>Aspergillus</i> <i>niger</i> (CBS 600.94) που παρασυστάζει ελάχιστη δραστικότητα: Επικαλυμμένη μορφή: 36 000 FXU (*) /g 15 000 BGU (*) /g Υγρή μορφή: 36 000 FXU/g 15 000 BGU/g	Κατόπουλα παχυνόμενα	-	3 600 FXU 1 500 BGU	12 000 FXU 5 000 BGU	1. Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμύγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά kg πλήρους ζωοτροφής: 3 600-6 000 FXU, 1 500-2 500 BGU 3. Προς χρήση σε συνθέτες ζωοτροφές (κυρίως αρβινοξυλάνες και β-γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 35% όλοιο και 20% κριθή	1.4.2004 (†)
			Χοιρίδια	4 μήνες	6 000 FXU 2 500 BGU	- -	1. Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμύγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά kg πλήρους ζωοτροφής: 6 000 FXU, 2 500 BGU 3. Προς χρήση σε συνθέτες ζωοτροφές (κυρίως αρβινοξυλάνες και β-γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 30% όλοιο και 30% κριθή	1.4.2004 (†)

Αριθμός Ε.Ε.	Προσθετικό	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη συγκέ- ντρωση	Μέγιστη συγκέ- ντρωση	Άλλες πρόνοιες	Λήξη της περιόδου έγκρισης
					Μονάδες δραστηριότητας ανά kg πλήρους ζωοτροφής	ανά kg πλήρους ζωοτροφής		
			Γάλοι παχυνόμενοι	-	6 000 FXU 2 500 BGU	12 000 FXU 5 000 BGU	1. Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμηνμάτος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά kg πλήρους ζωοτροφής: 6 000-12 000 FXU 2 500-5 000 BGU 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινοζυλάνες και β-γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 40% κριθή 1. Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμηνμάτος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά kg πλήρους ζωοτροφής: 12 000 FXU 5 000 BGU 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινοζυλάνες και β-γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 20% σίτο και 10% κριθή και 20% ηλιανθού	1.4.2004 (*)
			Ορνίθες αυγο- παραγωγής	-	12 000 FXU 5 000 BGU	-	1. Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμηνμάτος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά kg πλήρους ζωοτροφής: 12 000 FXU 5 000 BGU 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινοζυλάνες και β-γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 20% σίτο και 10% κριθή και 20% ηλιανθού	1.4.2004 (*)
		Παρασκευάσμα ενδο-1,4- Β-γλυκανάσας και ενδο-1,4- Β-γλυκανάσας που παράγεται από <i>Aspergillus niger</i> (CBS 600.94) που παρασχηματίζει ελάχιστη δραστικότητα: Στερεή μορφή: 36 000 FXU (g)/g 15 000 BGU (g)/g	Κοτόπουλα παχυνόμενα	-	3 600 FXU 1 500 BGU	12 000 FXU 5 000 BGU	1. Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμηνμάτος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά kg πλήρους ζωοτροφής: 3 600-6 000 FXU 1 500-2 500 BGU 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινοζυλάνες και β-γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 35% σίτο και 20% κριθή.	30.9.2004(*)

Αριθμός Ε.Ε.	Προσθετικό	Χημικός τύπος, περίγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη συγκέ- ντρωση		Μέγιστη συγκέ- ντρωση	Άλλες προνοιές	Λήξη της περιόδου έγκρισης
					Μονάδες δραστηριότητας ανά kg πλήρους ζωοτροφής				
			Χοιρίδια	4 μήνες	6 000 FXU 2 500 BGU	- -	-	1. Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμυγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη. 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά kg πλήρους ζωοτροφής: 6 000 FXU 2 500 BGU 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινοζυλάνες και Β-γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 30% αίθο και 30% κριθή.	30.9.2004 (*)
		Γάλα παχυνόμενοι	-	-	6 000 FXU 2 500 BGU	12 000 FXU 5 000 BGU	-	1. Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμυγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά kg πλήρους ζωοτροφής: 6 000-12 000 FXU 2 500-5 000 BGU 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινοζυλάνες και Β-γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 40% κριθή.	30.9.2004 (*)
		Όρνιθες αυγοπαταγω- γής	-	-	12 000 FXU 5 000 BGU	- -	-	1. Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμυγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά kg πλήρους ζωοτροφής: 12 000 FXU 5 000 BGU 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινοζυλάνες και Β-γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 20% αίθο και 10% κριθή και 20% ηλιανθάσπασου.	30.9.2004 (*)

Αριθμός Ε.Ε.	Προσθετικό	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη συγκέ- ντρωση Μονάδες δραστηκότητας ανά kg πλήρους ζωοτροφής	Μέγιστη συγκέ- ντρωση	Άλλες προνοιες	Λήξη της περιόδου έγκρισης
8	Ενδο-1,4(4)-β- γλυκανάσχη EC 3.2.1.4 Ενδο-1,4-β- γλυκανάσχη EC 3.2.1.8	Παρασκευάσματα ενδο-1,4- β-γλυκανάσχη και ενδο- 1,4-β-γλυκανάσχη που παράγονται από <i>Aspergillus</i> <i>niger</i> (CBS 600.94) που παρασιάζει ελάχιστη δραστικότητα: Επικαλυμμένη μορφή: 10 000 BGU/g 4 000 FXU(°)/g Υγρή μορφή: 20 000 BGU/g 4 000 FXU/g	Κοτόπουλα παχυνόμενα	-	3 000 BGU 1 200 FXU	10 000 BGU 4 000 FXU	1. Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμύκματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά kg πλήρους ζωοτροφής: 3 000-10 000 BGU 1 200 - 4 000 FXU 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινόζυλάνες και β-γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 60% κριθή	1.4.2004 (°)
			Χοιρδία	4 μήνες	3 000 BGU 1 200 FXU	5 000 BGU 2 000 FXU	1. Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμύκματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά kg πλήρους ζωοτροφής: 3 000-5 000 BGU 1 200 - 2 000 FXU 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινό-ζυλάνες και β-γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 30% κριθή	1.4.2004 (°)
			Όρνιθες αυγο- παραγωγής	-	5 000 BGU 2 000 FXU	-	1. Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμύκματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά χλγρ. πλήρους ζωοτροφής: 5 000 BGU 2 000 FXU 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινόζυλάνες και β-γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 60% κριθή	1.4.2004 (°)

Αριθμός Ε.Ε.	Προσθετικό	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη συνέ- ντωση		Μέγιστη συνέ- ντωση	Άλλες προνοίες	Λήξη της περιόδου έγκρισης
					Μονάδες δραστηκότητας ανά kg πλήρους ζωοτροφής	Μονάδες δραστηκότητας ανά kg πλήρους ζωοτροφής			
		Παρασκευάσμα ενδο-1,4-β-γλυκανάσης και ενδο-1,4-β-γλυκανάσης που παράγεται από <i>Aspergillus niger</i> (CBS 600.94) που παρουσιάζει ελάχιστη δραστηκότητα: Στερεή μορφή: 20 000 BGU(9)/g 8 000 FXU(8)/g	Κοιτόπουλα παχυνόμενα	-	3 000 BGU 1 200 FXU	10 000 BGU 4 000 FXU	1. Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμυλνματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη ζωοτροφής: 3 000 - 10 000 BGU 1 200 - 4 000 FXU 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινοξυλάνες και β-γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 80% κριθή	30.9.2004 (*)	
			Χοιρίδια	4 μήνες	3 000 BGU 1 200 FXU	5 000 BGU 2 000 FXU	1. Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμυλνματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη ζωοτροφής: 3 000 - 5 000 BGU 1 200 - 2 000 FXU 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινοξυλάνες και β-γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 30% κριθή	30.9.2004 (*)	
			Όρνιθες αυγο- παραγωγής	-	5 000 BGU 2 000 FXU	-	1. Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμυλνματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη ζωοτροφής: 5 000 BGU 2 000 FXU 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινοξυλάνες και β-γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 80% κριθή	30.9.2004(*)	

Αριθμός Ε.Ε.	Προσθετικό	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη συγκέ- ντρωση	Μέγιστη συγκέ- ντρωση	Άλλες πρόνοιες	Λήξη της περίοδου εγκρίσης
					Μονάδες δραστηριότητας ανά kg πλήρους ζωοτροφής			
9	Ενδο-1,4-β- γυλανόση EC 3.2.1.8	Παρασκευάσμα ενδο-1,4- β-γυλανόσης που παράγεται από <i>Aspergillus niger</i> (CBS 270.95) που παρουσιάζει ελάχιστη δραστηριότητα: Στερεή μορφή: 28 000 EXU (10) ⁹ Υγρή μορφή: 14 000 EXU/ml	Κοτόπουλα παχυνόμενα	-	1 400 EXU	-	1. Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του πρωτομυκτασ πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά kg πλήρους ζωοτροφής: 1 400 EXU 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινοξυλάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 50% σίτο	30.6.2004 (1)
			Όρνιθες αυγοπαράγω- γής	-	2 400 EXU	-	1. Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του πρωτομυκτασ πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά kg πλήρους ζωοτροφής: 2 400- 7 400 EXU 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινοξυλάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 30% σίτο και 30% δικαλη	1.4.2004 (1)
			Γάλοι παχυνόμενοι	-	2 400 EXU	-	1. Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του πρωτομυκτασ πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά kg πλήρους ζωοτροφής: 2 400- 5 600 EXU 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινοξυλάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 30% σίτο και 30% δικαλη	1.4.2004 (1)

Αριθμός Ε.Ε.	Προσθετικό	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μένιστη ηλικία	Ελάχιστη συνέ- ντρωση	Μένιστη συνέ- ντρωση	Άλλες προνοιες	Λήξη της περίοδου έγκρισης
					Μονάδες δραστηκότητας ανά kg πλήρους ζωοτροφής	ανά kg πλήρους ζωοτροφής		
10	α-αμυλάση: EC 3.2.1.1	Παρασκευάσμα α- αμυλάσης που παράγεται από τον <i>Bacillus</i> <i>amyloliquefaciens</i> (CBS 380.94) που παρουσιάζει ελάχιστη δραστηκότητα: Στερεή μορφή: 45 000 RAU ⁽¹⁾ /g Υγρή μορφή: 20 000 RAU/ml	Χοιρίδια	4 μήνες	1 800 RAU	-	1. Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμυγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμψηξη	30.6.2004 (*)
							2. Ενδεδειγμένη δόση ανά kg πλήρους ζωοτροφής: 1 800 RAU	
							3. Προς χρήση αποκλειστικά σε σύνθετες ζωοτροφές για συστήματα υψηλής διατροφής που περιέχουν υλικά τίτλου σε άμυλο (δηλαδή που περιέχουν πάνω από 35% άμυλο)	
			Χοίροι παχυνόμενοι	-	1 800 RAU	-	1. Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμυγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμψηξη	30.6.2004 (*)
							2. Ενδεδειγμένη δόση ανά kg πλήρους ζωοτροφής: 1 800 RAU	
							3. Προς χρήση αποκλειστικά σε σύνθετες ζωοτροφές για συστήματα υψηλής διατροφής που περιέχουν υλικά τίτλου σε άμυλο (δηλαδή που περιέχουν πάνω από 35% άμυλο)	
			Γουρούνες	-	1 800 RAU	-	1. Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμυγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμψηξη	30.6.2004 (*)
							2. Ενδεδειγμένη δόση ανά kg πλήρους ζωοτροφής: 1 800 RAU	
							3. Προς χρήση αποκλειστικά σε σύνθετες ζωοτροφές για συστήματα υψηλής διατροφής που περιέχουν υλικά τίτλου σε άμυλο (δηλαδή που περιέχουν πάνω από 35% άμυλο)	

Αριθμός Ε.Ε.	Προσθετικό	Χημικός τύπος, περίγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μένιστη ηλικία	Ελάχιστη συγκέ- ντρωση	Μένιστη συγκέ- ντρωση	Άλλες προνοιες	Λήξη της περιόδου έγκρισης
					Μονάδες δραστηκότητας ανά kg πλήρους ζωοτροφής			
11	Ενδο-1,4-β- γλυκανάση EC3.2.1.4	Παρασκευάσμα ενδο-1,4- β-γλυκανάσης και ενδο- 1,3(4)-β-γλυκανάσης και ενδο-1,4-β-ξυλανάσης που παράγεται από Trichoderma longibrachiatum (ATCC 74252) που παράγει ελάχιστη δραστηκότητα: σε μορφή κόκκων και σε υγρή μορφή: Ενδο-1,4-β-γλυκανάση: 8 000 U (¹⁵) /g ή ml Ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάση: 18 000 U (¹⁵) /g ή ml Ενδο-1,4-β-ξυλανάση: 26 000 U (¹⁵) /g ή ml	Ορνίθες αυγοπα- γωγής	-	Ενδο-1,4-β- γλυκανάση: 400 U	-	1. Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμυγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμψηξη 2. Ενδεξιμένη δόση ανά kg πλήρους ζωοτροφής: Ενδο-1,4-β-γλυκανάση: 400-1 280 U Ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάση: 900 - 2 880 U Ενδο-1,4-β-ξυλανάση: 1 300 - 4 160 U 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινοξυλάνες και β-γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 40% σίτο, τριπλά ή κριθάρι.	1.1.2007
	Ενδο-1,4-β- γλυκανάση EC3.2.1.6				Ενδο-1,3(4)- β-γλυκα- νάση: 900 U	-		
	Ενδο-1,4-β- γλυκανάση EC3.2.1.8				Ενδο-1,4-β- ξυλανάση: 1 300 U	-		
			Χοιρίδια	-	Ενδο-1,4-β- γλυκανάση: 400 U	-	1. Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμυγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμψηξη 2. Ενδεξιμένη δόση ανά kg πλήρους ζωοτροφής: Ενδο-1,4-β-γλυκανάση: 400-1 600 U Ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάση: 900 - 3 600 U Ενδο-1,4-β-ξυλανάση: 1 300 - 5 200 U 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινοξυλάνες και β-γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 40% σίτο τριπλά ή αραβόσιτο και 20% σίκαλη	1.1.2007
			Ενδο-1,3(4)- β-γλυκα- νάση: 900 U	-	Ενδο-1,4-β- ξυλανάση: 1 300 U	-		

Αριθμός Ε.Ε.	Προσθετικό	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη συγκέντρωση	Μέγιστη συγκέντρωση	Άλλες προνοιες	Λήξη της περιόδου έγκρισης
					Μονάδες δραστηκότητας ανά kg πλήρους ζωοτροφής	Μονάδες δραστηκότητας ανά kg πλήρους ζωοτροφής		
11	Ενδο-1,4-β-γλυκανάσι EC 3.2.1.4 Ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάσι EC 3.2.1.6 Ενδο-1,4-β-γλυκανάσι EC 3.2.1.8	Παρασκευάσμα ενδο-1,4-β-γλυκανάσις, ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάσις και ενδο-1,4-β-γλυκανάσις που παράγεται από Trichoderma longibrachiatum (ATCC 74252) που παρουσιάζει ελάχιστη δραστηκότητα: Υψηλή μορφή: Ενδο-1,4-β-γλυκανάσις: 8 000 U ⁽¹⁵⁾ /ml Ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάσις: 18 000 U ⁽¹⁵⁾ /ml Ενδο-1,4-β-γλυκανάσις: 28 000 U ⁽¹⁴⁾ /ml	Κοτόπουλα παχυνόμενα	-	Ενδο-1,4-β-γλυκανάσις: 400 U Ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάσις: 900 U Ενδο-1,4-β-γλυκανάσις: 900 U Ενδο-1,4-β-γλυκανάσις: 1 300 U	-	1. Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του τροφίμου πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη 2. Ενδοεγγεγμένη δόση ανά kg πλήρους ζωοτροφής: Ενδο-1,4-β-γλυκανάσις: 400-1 600 U Ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάσις: 900 - 3 600 U Ενδο-1,4-β-γλυκανάσις: 1 300 - 5 200 U 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες (κυρίως αραβινοξυλάνες και β-γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 30% σίτη ή κρήνη και 10% σίκαλη	30.6.2004 (7)
	Ενδο-1,4-β-γλυκανάσι EC 3.2.1.4 Ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάσι EC 3.2.1.6 Ενδο-1,4-β-γλυκανάσι EC 3.2.1.8	Παρασκευάσμα ενδο-1,4-β-γλυκανάσις, ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάσις και ενδο-1,4-β-γλυκανάσις που παράγεται από Trichoderma longibrachiatum (ATCC 74252) που παρουσιάζει ελάχιστη δραστηκότητα: Σε μορφή κόκκων: Ενδο-1,4-β-γλυκανάσις: 8 000 U ⁽¹⁵⁾ /ml Ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάσις: 18 000 U ⁽¹⁵⁾ /ml Ενδο-1,4-β-γλυκανάσις: 28 000 U ⁽¹⁴⁾ /ml	Κοτόπουλα παχυνόμενα	-	Ενδο-1,4-β-γλυκανάσις: 400 U Ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάσις: 900 U Ενδο-1,4-β-γλυκανάσις: 900 U Ενδο-1,4-β-γλυκανάσις: 1 300 U	-	1. Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του τροφίμου πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη 2. Ενδοεγγεγμένη δόση ανά kg πλήρους ζωοτροφής: Ενδο-1,4-β-γλυκανάσις: 400-1 600 U Ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάσις: 900 - 3 600 U Ενδο-1,4-β-γλυκανάσις: 1 300 - 5 200 U 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες (κυρίως αραβινοξυλάνες και β-γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 30% σίτη ή κρήνη και 10% σίκαλη	31.5.2005 (7)

Αριθμός Ε.Ε.	Προσθετικό	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη συγκέ- ντρωση Μονάδες δραστηριότητας ανά kg πλίνθους ζωοτροφής		Μέγιστη συγκέ- ντρωση ντρωση	Άλλες προνοιες	Λήξη της περίόδου έγκρισης
12	Ενδο-1,4-β- γλυκανάση EC 3.2.1.4	Παρασκευάσμα ενδο-1,4- β-γλυκανάσης, ενδο-1,3(4)- β-γλυκανάσης και ενδο- 1,4-β-ξυλανάσης που παράγεται από Trichoderma longibrachiatum (ATCC 74252) που παρουσιάζει ελάχιστη δραστηριότητα: σε υγρή μορφή και σε μορφή κόκκων: Ενδο-1,4-β-γλυκανάση: 8 000 U (¹ / _g) /ml Ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάση: 18 000 U (¹ / _g) /ml Ενδο-1,4-β-ξυλανάση: 28 000 U (¹ / _g) /ml	Γάλοι παχυνόμενοι	-	Ενδο-1,4-β- γλυκανά-ση: 400 U Ενδο-1,3(4)- β-γλυκανά- ση: 900 U Ενδο-1,4-β- ξυλανά-ση: 1 3000 U	-	-	1. Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμηνύματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη 2. Ενδοεγγενής δόση ανά kg πλίνθους ζωοτροφής: Ενδο-1,4-β-γλυκανάση: 400 - 800 U Ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάση: 900 - 1 800 U Ενδο-1,4-β-ξυλανάση: 1 300 - 2 600 U 3. Προς χρήση σε συνθέτες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινοξυλάνες και β-γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 40% κριθή	31.5.2005 (*)
	Ενδο-1,4-β- γλυκανάση EC 3.2.1.4 Ενδο-1,3(4)-β- γλυκανάση EC 3.2.1.6 Ενδο-1,4-β- ξυλανάση EC 3.2.1.8	Παρασκευάσμα ενδο-1,4- β-γλυκανάσης, ενδο-1,3(4)- β-γλυκανάσης και ενδο- 1,4-β-ξυλανάσης που παράγεται από Trichoderma virens (FERM BP-4447) που παρουσιάζει ελάχιστη δραστηριότητα: Ενδο-1,4-β-γλυκανάση: 8 000 U (¹ / _g) /g Ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάση: 18 000 U (¹ / _g) /g Ενδο-1,4-β-ξυλανάση: 28 000 U (¹ / _g) /g	Κοτόπουλα παχυνόμενα	-	Ενδο-1,4-β- γλυκανά-ση: 200 U Ενδο-1,3(4)- β-γλυκανά- ση: 450 U Ενδο-1,4-β- ξυλανάση: 650 U	-	-	1. Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμηνύματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη 2. Ενδοεγγενής δόση ανά kg πλίνθους ζωοτροφής: Ενδο-1,4-β-γλυκανάση: 800 - 1 200 U Ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάση: 1 800 - 2 700 U Ενδο-1,4-β-ξυλανάση: 2 600 - 3 900 U 3. Προς χρήση σε συνθέτες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες (κυρίως αραβινοξυλάνες και β-γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 20% σίτο και 20% κριθή ή/και 25% σίκαλη	30.6.2004 (*)

Αριθμός Ε.Ε.	Προσθετικό	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη συγκέ- ντρωση	Μέγιστη συγκέ- ντρωση	Άλλες πρόνοιες	Λήξη της περιόδου έγκρισης
					Μονάδες δραστηκότητας ανά kg πλήρους ζωοτροφής			
			Όνιτες αуго- παραγωγής	-	Ενδο-1,4-β- γλυκανάση: 640 U Ενδο-1,3(4)- β-γλυκανά- ση:1 440 U Ενδο-1,4-β- ζυλανάση:2 080 U	- - - -	1. Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμύγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά kg πλήρους ζωοτροφής: Ενδο-1,4-β-γλυκανάση: 640 U Ενδο-1,3(4)-β- γλυκανάση: 1 440 - 2 880 U Ενδο-1,4-β-ζυλανάση: 2 080 - 4 160 U 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινοζυλάνες και β-γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 20% αίθο και 20% κριθά ή και 25% σίκαλη	30.6.2004 (*)
		Γάλα παχυνόμενοι		-	Ενδο-1,4-β γλυκανάση: 800 U Ενδο- 1,3 (4)β γλυκανάση: 1 800 U Ενδο-1,4-β ζυλανάση: 2 600 U	- - -	1. Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμύγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά kg πλήρους ζωοτροφής: Ενδο-1,4-β-γλυκανάση: 800 U Ενδο-1,3 (4)-β-γλυκανάση: 1 800-2 700 U Ενδο-1,4-β-ζυλανάση: 2 600-3 900 U 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινοζυλάνες και β-γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 20% αίθο και 20% κριθά.	1.4.2004 (*)

Αριθμός Ε.Ε.	Προσθετικό	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη συγκέντρωση		Μέγιστη συγκέντρωση	Άλλες προνομίες	Λήξη της περιόδου έγκρισης
					Ελάχιστη συγκέντρωση	Μονάδες δραστηριότητας ανά kg πλήρους ζωοτροφής			
13	Ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάσχη EC 3.2.1.6 Ενδο-1,4-β-γλυκανάσχη EC 3.2.1.8	Παρασκευάσματα ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάσχη και ενδο-1,4-β-γλυκανάσχη που παράγονται από Trichoderma longibrachiatum (CBS 357.94) που παρουσιάζει ελάχιστη δραστηριότητα: Μορφή σκόνης: 8 000 BGU/g ⁽⁵⁾ 11 000 EXU ⁽⁵⁾ /g Μορφή κόκκων: 6 000 BGU/g 8 250 EXU/g Υγρή μορφή: 2 000 BGU/ml 2 750 EXU/ml	Κατόπαιλα παχυνόμενα	-	-	100 BGU 130 EXU	-	1. Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμίκματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά kg πλήρους ζωοτροφής: 100 BGU 130 EXU 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινοζυλάνες και β-γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 30% σίτο και 30% κριθή ή 20% σίκαλη	30.6.2004 (1)
			Ορνίθες αυγοπαράγωγής	-	600 BGU 800 EXU	-	-	1. Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμίκματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά kg πλήρους ζωοτροφής: 600 BGU 800 EXU 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές (κυρίως αραβινοζυλάνες και Β-γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 40% σίτο και 30% κριθή.	1.4.2004 (1)
			Γάλοι παχυνόμενοι	-	600 BGU 800 EXU	-	-	1. Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμίκματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά kg πλήρους ζωοτροφής: 600 BGU 800 EXU 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες (κυρίως αραβινοζυλάνες και Β-γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 30% σίτο ή κριθή και 30% σίκαλη	

Αριθμός Ε.Ε.	Προσθετικό	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη συγκέ- ντρωση ανά kg πλήρους ζωοτροφής	Μέγιστη συγκέ- ντρωση ανά kg πλήρους ζωοτροφής	Άλλες προνοίες	Λήξη της περιόδου έγκρισης
14	Ενδο-1,4-β- ξυλανόση EC 3.2.1.8	Παρασκευάσμα ενδο-1,4- β-ξυλανόσης, που παράγεται από <i>Aspergillus</i> <i>niger</i> (CBS 520.94) που παρουσιάζει ελάχιστη δραστικότητα: Στερεή μορφή: Ενδο-1,4-β-ξυλανόση: 600 U (¹⁷)/g Υγρή μορφή: Ενδο-1,4-β-ξυλανόση: 300 U/ml	Κοτόπουλα παχυνόμενα	-	Ενδο-1,4-β- ξυλανόση: 300 U	-	1. Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμεινγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμψηξη. 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά kg πλήρους ζωοτροφής: Ενδο-1,4-β-ξυλανόση: 300-600 U 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινοξυλάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 50% αίπα. 1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμεινγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμψηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά χλνρ. πλήρους ζωοτροφής 300-1 200 U 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινοξυλάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 40% αίπα	24.10.07

Αριθμός Ε.Ε.	Προσθετικό	Χημικός τύπος, περίγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη συγκέ- ντρωση Μονάδες δραστηκότητας ανά kg πλήρους ζωοτροφής	Μέγιστη συγκέ- ντρωση	Άλλες προνοιες	Λήξη της περιόδου έγκρισης
15	Ενδο-1,3(4)-β- γλυκανάση EC 3.2.1.6	Παρασκευάσμα ενδο- 1,3(4)-β-γλυκανάσης, που παράγεται από Trichoderma viride (CBS 517.94) που παρουσιάζει ελάχιστη δραστηκότητα: Στερεή μορφή: Ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάση: 650 U (¹⁵ /g Υγρή μορφή: Ενδο-1,3(4)-γλυκανάση: 325 U /ml	Κοτόπουλα παχυνόμενα	-	Ενδο-1,3(4)- β- γλυκανά- ση: 325 U	-	1. Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμύκνματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά kg πλήρους ζωοτροφής: Ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάση: 325-650 U 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως β-γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 60% κριθή	30.6.2004 (1)
16	Ενδο-1,4(4)-β- γλυκανάση EC 3.2.1.4	Παρασκευάσμα ενδο-1,4- β-ξυλανάσης, που παράγεται από Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) που παρουσιάζει ελάχιστη δραστηκότητα: Υγρή μορφή: 2 000 CU (¹⁵ /ml	Κοτόπουλα παχυνόμενα	-	250 CU	-	1. Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμύκνματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά kg πλήρους ζωοτροφής: 500-1 000 CU 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως β-γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 40% κριθή	30.6.2004 (1)
			Όνιδες αυγοπαρου- γής	-	250 CU	-	1. Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμύκνματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά kg πλήρους ζωοτροφής: 500-1 000 CU 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως β-γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 40% κριθή	30.6.2004 (1)

Αριθμός Ε.Ε.	Προσθετικό	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη συγκέ- ντρωση	Μέγιστη συγκέ- ντρωση	Άλλες προνοιες	Λήξη της περιόδου έγκρισης
					Μονάδες δραστηριότητας ανά kg πλήρους ζωοτροφής			
			Χοιρία	4 μήνες	250 CU	-	1. Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμύγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά kg πλήρους ζωοτροφής: 500-1 000 U 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως β-γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 40% κριθή	30.6.2004 (*)
			Χοίροι παχυνόμενοι	-	250 CU	-	1. Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμύγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά kg πλήρους ζωοτροφής: 500-1 000 U 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως β-γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 40% κριθή	30.6.2004 (*)
		Παρασκευάσμα ενδο-1,4-β-γυλάνσης, που παράγεται από Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) που παρουσιάζει ελάχιστη δραστηριότητα: Στερεή μορφή: 2 000 CU (10 ⁶ /g	Κοτόπουλα παχυνόμενα	-	250 CU	-	1. Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμύγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά kg πλήρους ζωοτροφής: 500-1 000 U 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως β-γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 40% κριθή	17.7.2004 (*)

Αριθμός Ε.Ε.	Προσθετικό	Χημικός τύπος, περίγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη συγκέ- ντρωση	Μέγιστη συγκέ- ντρωση	Άλλες πρόνοιες	Λήξη της περιόδου έγκρισης
					Μονάδες δραστηκότητας ανά kg πλήρους ζωοτροφής	ανά kg πλήρους ζωοτροφής		
			Όρνιθες αυγο- παραγωγής	-	250 CU	-	1. Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμύγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά kg πλήρους ζωοτροφής: 500-1 000 U 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως β-γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 40% κρήνη	17.7.2004 (*)
			Χοιρίδια	4 μήνες	250 CU	-	1. Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμύγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά kg πλήρους ζωοτροφής: 500-1 000 U 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως β-γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 40% κρήνη	17.7.2004 (*)
			Χοίροι παχυνόμενοι	-	250 CU	-	1. Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμύγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά kg πλήρους ζωοτροφής: 500-1 000 U 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως β-γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 40% κρήνη	17.7.2004 (*)

Αριθμός Ε.Ε.	Προσθετικό	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη συγκέ- ντρωση		Μέγιστη συγκέ- ντρωση	Άλλες προνόμιες	Λήξη της περιόδου έγκρισης
					Μονάδες δραστηκότητας ανά kg πλήρους ζωοτροφής				
17	Ενδο-1,4-β- ζυλάνωση EC 3.2.1.8	Παρασκευάσμα ενδο-1,4-β-ζυλάνωσης, που παράγεται από Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) που παρουσιάζει ελάχιστη δραστηκότητα: Υγρή μορφή: 6 000 EPU (²⁵)/ml	Κοτόπουλα παχυνόμενα	-	750 EPU	-	1. Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμύγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη ζωοτροφής: 1 500-3 000 EPU 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινοζυλάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 40% σίτο	30.6.2004 (*)	
			Ορνίθες αυγοσταρα- γωγής	-	750 EPU	-	1. Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμύγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη ζωοτροφής: 1 500-3 000 EPU 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινοζυλάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 40% σίτο	30.6.2004 (*)	
			Χοιρίδια	4 μήνες	750 EPU	-	1. Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμύγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη ζωοτροφής: 1 500-3 000 EPU 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινοζυλάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 40% σίτο	30.6.2004 (*)	

Αριθμός Ε.Ε.	Προσθετικό	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη συνέ- νωση	Μέγιστη συνέ- νωση	Άλλες πρόνοιες	Λήξη της περιόδου έγκρισης
					Μονάδες δραστηκότητας ανά kg πλήρους ζωοτροφής			
		Παρασκεύασμα ενδο-1,4- β-ξυλανόσης που παράγεται από Trichoderma longibrachialum (ATCC 2105) που παρουσιάζει ελάχιστη δραστηκότητα: Στερεή μορφή: 6 000 EPU (7)/g	Χοίροι παχυνόμενοι	-	750 EPU	-	1. Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμύγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά kg πλήρους ζωοτροφής: 1 500-3 000 EPU 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινοζυλάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 40% αίθο	30.6.2004 (7)
							1. Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμύγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά kg πλήρους ζωοτροφής: 1 500-3 000 EPU 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινοζυλάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 40% αίθο	17.7.2004 (7)
		Ορνίθες αυγο- παραγωγής	-	-	750 EPU	-	1. Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμύγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά kg πλήρους ζωοτροφής: 1 500-3 000 EPU 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινοζυλάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 40% αίθο	17.7.2004 (7)
							1. Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμύγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά kg πλήρους ζωοτροφής: 1 500-3 000 EPU 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινοζυλάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 40% αίθο	17.7.2004 (7)

Αριθμός Ε.Ε.	Προσθετικό	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη συγκέ- ντρωση	Μέγιστη συγκέ- ντρωση	Άλλες προνοιες	Λήξη της περιόδου έγκρισης
					Μονάδες δραστηκότητας ανά kg πλήρους ζωοτροφής	ανά kg πλήρους ζωοτροφής		
			Χοιρίδια	4 μήνες	750 EPU	-	1. Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμηνματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά kg πλήρους ζωοτροφής: 1 500-3 000 EPU 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινοζυλάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 40% αμύλο	17.7.2004 ^(*)
							1. Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμηνματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά kg πλήρους ζωοτροφής: 1 500-3 000 EPU 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινοζυλάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 40% αμύλο	
			Χοίροι παχυνόμενοι	-	750 EPU	-	1. Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμηνματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά kg πλήρους ζωοτροφής: 1 500-3 000 EPU 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινοζυλάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 40% αμύλο	17.7.2004 ^(*)
							1. Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμηνματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά kg πλήρους ζωοτροφής: 1 500-3 000 EPU 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινοζυλάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 35% αμύλο	
			Γάλοι παχυνόμενοι	-	750 EPU	-	1. Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμηνματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά kg πλήρους ζωοτροφής: 1 500-3 000 EPU 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινοζυλάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 35% αμύλο	17.7.2004 ^(*)
							1. Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμηνματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά kg πλήρους ζωοτροφής: 1 500-3 000 EPU 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινοζυλάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 35% αμύλο	

Αριθμός Ε.Ε.	Προσθετικό	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη συγκέντρωση Μονάδες δραστηριότητας ανά kg πλήρους ζωοτροφής		Μέγιστη συγκέντρωση ντροση	Άλλες προνοιες	Λήξη της περίόδου έγκρισης
18	Ενδο-1,3(4)-β- γλυκανάσθη EC 3.2.1.6	Παρασκευάσμα ενδο- 1,3(4)-β-γλυκανάσθη που παράγεται από <i>Aspergillus</i> <i>niger</i> (MUCI 39199) που παρουσιάζει ελάχιστη δραστηριότητα: Στερεή μορφή: 2 000 AGL ($^{\circ}$)/g Υγρή μορφή: 500 AGL/ml	Κοτόπουλα παχυνόμενα	-	-	100 AGL	-	1. Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμυγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμικασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά kg πλήρους ζωοτροφής: 100 AGL 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως β-γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 40% κριθή και 20% σίτο	30.6.2004 (1)
19	Ενδο-1,3(4)-β- γλυκανάσθη EC 3.2.1.6	Παρασκευάσμα ενδο- 1,3(4)-β-γλυκανάσθη που παράγεται από <i>Aspergillus</i> <i>niger</i> (MUCI 39199) που παρουσιάζει ελάχιστη δραστηριότητα: Στερεή μορφή: 1 500 AGL ($^{\circ}$)/g Υγρή μορφή: 200 AGL/g	Κοτόπουλα παχυνόμενα	-	-	25 AGL	-	1. Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμυγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμικασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά kg πλήρους ζωοτροφής: 25-100 AGL 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως β-γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 50% κριθή	30.6.2004 (1)
20	Ενδο-1,4-β- γλυκανάσθη EC 3.2.1.8	Παρασκευάσμα ενδο-1,4- β-γλυκανάσθη που παράγεται από <i>Trichoderma</i> <i>longibrachiatum</i> (MUCI 39203) που παρουσιάζει ελάχιστη δραστηριότητα: Στερεή μορφή: 2 000 AXC ($^{\circ}$)/g Υγρή μορφή: 500 AXC/ml	Κοτόπουλα παχυνόμενα	-	-	100 AXC	-	1. Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμυγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμικασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά kg πλήρους ζωοτροφής: 100 AXC 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινόγλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 40% σίτο ή σίκαλη	30.6.2004 (1)

Αριθμός Ε.Ε.	Προσθετικό	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη συγκέ- ντρωση		Μέγιστη συγκέ- ντρωση	Άλλες προνοιες	Λήξη της περιόδου έγκρισης
					Μονάδες δραστηκότητας ανά kg πλήρους ζωοτροφής	Μονάδες δραστηκότητας ανά kg πλήρους ζωοτροφής			
21	Ενδο-1,4-β- ξυλανόση EC 3.2.1.8	Παρασκευάσμα ενδο-1,4- β-ξυλανόσης που παράγεται από Trichoderma longibrachiatum (MUCCL 39203) που παρουσιάζει ελάχιστη δραστηκότητα: Στερεή μορφή: 1 500 AXC (°)/g Υγρή μορφή: 200 AXC/g	Κοτόπουλα παχυνόμενα	-	25 AXC	-	1. Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμιγνύματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά kg πλήρους ζωοτροφής: 25-100 AXC 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινοξυλάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 50% σίτο	30.6.2004 (†)	
22	Ενδο-1,3(4)-β- γλυκανόση EC 3.2.1.6	Παρασκευάσμα ενδο-1,3- β-γλυκανόσης που παράγεται από Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10 W) που παρουσιάζει ελάχιστη δραστηκότητα: Στερεή μορφή: 70 000 BGN(°)/g Υγρή μορφή: 14 000 BGN/ml	Κοτόπουλα παχυνόμενα	-	1 050 BGN	-	1. Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμιγνύματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά kg πλήρους ζωοτροφής: 2 800 BGN 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως β-γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 50% κριθή	30.6.2004 (†)	
23	Ενδο-1,4-β- ξυλανόση EC 3.2.1.8	Παρασκευάσμα ενδο-1,4- β-ξυλανόσης που παράγεται από Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10 W) που παρουσιάζει ελάχιστη δραστηκότητα: Στερεή μορφή: 70 000 IFP(°)/g Υγρή μορφή: 7 000 IFP/ml	Κοτόπουλα παχυνόμενα	-	1 050 IFP	-	1. Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμιγνύματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά kg πλήρους ζωοτροφής: 1 400 IFP 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινοξυλάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 50% σίτο	30.6.2004 (†)	

Αριθμός Ε.Ε.	Προσθετικό	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη συγκέντρωση νιτρώση		Μέγιστη συγκέντρωση νιτρώση	Άλλες προνοιες	Λήξη της περιόδου έγκρισης
					Μονάδες δραστηκότητας ανά kg πλήρους ζωοτροφής				
			Όνθες αυγοπαρ- ωνής	-	560 QXU 2 800 QGU	-	-	1. Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του πρωμίματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά kg πλήρους ζωοτροφής: 560 QXU 2 800 QGU 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε μη αμιλούχα πολυσακχαρίδια (περιέχει κυρίως αραβινοζυλάνες και βήτα- γλυκάνες), πτχ διατροφές που περιέχουν ένα ελάχιστο 20% σπάρη ή/και κριθάρι	1.10.2006
		Γαλοπούλες παχυνόμενες		-	280 QXU 1 400 QGU	840 QXU 4 200 QGU		1. Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του πρωμίματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά kg πλήρους ζωοτροφής: 560 QXU 2 800 QGU 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμιλού (κυρίως αραβινοζυλάνες και β-γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν περισσότερο από 20% σπάρη ή/και κριθάρι.	28.2.2007

Αριθμός Ε.Ε.	Προσθετικό	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη συνέ- ντρωση		Μέγιστη συνέ- ντρωση	Άλλες προνοιες	Λήξη της περιόδου έγκρισης
					Μονάδες δραστηκότητας ανά kg πλήρους ζωοτροφής	Μείωση πρώτης ντρωσης			
25	Ενδο-1,3(4)-β- γλυκανάση EC 3.2.1.6 Ενδο-1,4-β- ξυλανάση EC 3.2.1.8	Παρασκευάσμα ενδο- 1,3(4)-β-γλυκανάσης και ενδο-1,4-β-ξυλανάσης που παράγεται από <i>Aspergillus niger</i> (NRRL 25641) που παρουσιάζει ελάχιστη δραστηκότητα: Ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάση: 1 100 U ⁽²⁵⁾ /g Ενδο-1,4-β-ξυλανάση: 1 600 U ⁽²⁵⁾ /g	Κοτόπουλα παχυνόμενα	-	Ενδο-1,3(4)- β-γλυκανά- ση: 138 U Ενδο-1,4-β- ξυλανά-ση: 200 U	-	1. Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμύγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά kg πλήρους ζωοτροφής: Ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάση: 138 U Ενδο-1,4-β-ξυλανάση: 200 U 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινοξυλάνες και β-γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 50% κριθή ή 30% σίτο και 30% αραβόσιτο	30.6.2004 (*)	
26	Ενδο-1,3(4)-β- γλυκανάση EC 3.2.1.6	Παρασκευάσμα ενδο- 1,3(4)-β-γλυκανάσης που παράγεται από <i>Trichoderma reesei</i> (CBS 526.94) που παρουσιάζει ελάχιστη δραστηκότητα: Στερεή μορφή: 350 000 BU ⁽²⁵⁾ /g Υγρή μορφή: 50 000 BU/g	Κοτόπουλα παχυνόμενα	-	23 000 BU	-	1. Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμύγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά kg πλήρους ζωοτροφής: 23 000 - 50 000 BU 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 20% κριθή ή 30% σίκαλη	30.6.2004 (*)	

Αριθμός Ε.Ε.	Προσθετικό	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη συνέ- ντρωση	Μέγιστη συνέ- ντρωση	Άλλες προνοιες	Λήξη της περιόδου έγκρισης
					Μονάδες δραστηριότητας ανά kg πλήρους ζωοτροφής			
27	Ενδο-1,4-β- γλυκανάση EC 3.2.1.8 Ενδο-1,3(4)-β- γλυκανάση EC 3.2.1.6	Παρασκευάσμα ενδο-1,4- β-γλυκανάσης που παρά- γεται από Trichoderma reesei (CBS 529.94) και ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάσης που παράγεται από Trichoderma reesei (CBS 526.94) που παρουσιάζει ελάχιστη δραστηριότητα: Στερεή μορφή: 200 000 BXU ³⁰ /g 200 000 BU ³⁰ /g Υγρή μορφή: 30 000 BXU/g 30 000 BU/g	Χοιρίδια	4 μήνες	26 000 BU	-	1. Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμυγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά kg πλήρους ζωοτροφής: 28 000 - 35 000 BU 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 60% κριθή ή σίτο	30.6.2004 (*)
						-	1. Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμυγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά kg πλήρους ζωοτροφής: 10 000 BXU 10 000 BU 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινοζυλάνες και β-γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 40% σίτο ή 30% σίκαλη	30.6.2004 (*)
			Χοιρίδια	2 μήνες	7 500 BXU 7 500 BU	-	1. Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμυγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά kg πλήρους ζωοτροφής: 7 500 - 15 000 BXU 7 500 - 15 000 BU 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινοζυλάνες και β-γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 50% κριθή	28.2.2005 (*)

Αριθμός Ε.Ε.	Προσθετικό	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη συγκέ- ντρωση Μονάδες δραστηκότητας ανά kg πλήρους ζωοτροφής	Μέγιστη συγκέ- ντρωση	Άλλες προνοιες	Λήξη της περιόδου έγκρισης
28	3-φυτάση EC 3.1.3.8	Παρασκευασμα 3-φυτάσης που παράγεται από Trichoderma reesei (CBS 528.94) που παρουσιάζει ελάχιστη δραστηκότητα: Στερεή μορφή: 5000 PPUv ²³ /g Υγρή μορφή: 1 000 PPU/g	Χοιρδία	4 μήνες	250 PPU	-	1. Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμύγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά kg πλήρους ζωοτροφής: 500 - 750 PPU 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε φυτικά άλατα, δηλαδή που περιέχουν πάνω από 50% σιτηρά (αραβόδατο, κριθή, σίτο) ταπιάκια, ελαιούχους σπόρους και όσπρια	30.6.2004 (1)
			Χοίροι παχυνόμενοι	-	500 PPU	-	1. Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμύγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά kg πλήρους ζωοτροφής: 500 - 750 PPU 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε φυτικά άλατα, δηλαδή που περιέχουν πάνω από 50% σιτηρά (αραβόδατο, κριθή, σίτο) ταπιάκια, ελαιούχους σπόρους και όσπρια	30.6.2004 (1)
			Κοπάδια παχυνόμενα	-	500 PPU	-	1. Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμύγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά kg πλήρους ζωοτροφής: 500 - 750 PPU 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές, δηλαδή που περιέχουν πάνω από 0,22% φυτικά φωσφορικά άλατα	28.2.2005 (2)

Αριθμός Ε.Ε.	Προσθετικό	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μένιστη ηλικία	Ελάχιστη συνέ- ντρωση		Μένιστη συνέ- ντρωση	Άλλες προνοιες	Λήξη της περιόδου έγκρισης
					Μονάδες δραστηκότητας ανά kg πλήρους ζωοτροφής				
			Όρνιθες αυγοτταρα- γωγής	-	Ενδο-1,3(4)- β-γλυκανά- σι: 100 U Ενδο-1,4-β- ξυλανδ-σι:2 500 U Σουμπτι- λιανη: 800 U	-	-	1. Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμιγνυτός πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά kg πλήρους ζωοτροφής: Ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάσι: 100 U Ενδο-1,4-β-ξυλανάσι: 2 500 U Σουμπτιλιανή: 800 U 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές, δηλαδή που περιέχουν πάνω από 50% σίτο και 25% κριθή	26.7.2004 (*)
42	Ενδο-1,4-β- ξυλανδ EC 3.2.1.8	Παρασκευάσμα ενδο-1,4- β-ξυλανδής που παράγεται από Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) που παρουσιάζει ελάχιστη δραστηκότητα: Στερεή μορφή: Ενδο-1,4-β-ξυλανάσι: 4 000 U(*)/g Χαρακτηριστικά του εγκεκριμένου παρασκευάσματος: Ενδο-1,4-β-ξυλανδής: 1,99% Σίτος: 97,7% Προποτιστικό άλας του ασβεστίου: 0,3% Λεκιθίνη: 0,01%	Χοιρίδια	4 μήνες	Ενδο-1,4-β- ξυλανδ-σι:4 000 U	-	-	1. Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμιγνυτός πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά kg πλήρους ζωοτροφής: Ενδο-1,4-β-ξυλανδής: 4 000 U 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές, πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμιλού (κυρίως αραβινοξυλάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 60% σίτο	26.7.2004 (*)

Αριθμός Ε.Ε.	Προσθετικό	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη συγκέ- ντρωση		Μέγιστη συγκέ- ντρωση	Άλλες προνοιες	Λήξη της περιόδου έγκρισης
					Μονάδες δραστηκότητας ανά kg πλήρους ζωοτροφής				
			Χοίροι παχυνόμενοι	-	Ενδο-1,4-β- ξυλανάση: 4 000 U	-	-	1. Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμυγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμψηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά kg πλήρους ζωοτροφής: Ενδο-1,4-β-ξυλανάση: 4 000 U 3. Προς χρήση σε συνθέτες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινοξυλάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 60% σίτο	17.7.2004 (*)
43	Ενδο-1,4-β- ξυλανάση EC 3.2.1.8 Ενδο-1,3(4)-β- γλυκανάση EC 3.2.1.6 α-αμυλόση EC 3.2.1.1	Παρασκευάσμα ενδο-1,4- β-ξυλανάσης που παράγεται από Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135), ενδο-1,3(4)-β- γλυκανάσης που παράγεται από Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) και α-αμυλόσης που παράγεται από Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) που παρουσιάζει ελάχιστη δραστηκότητα: Ενδο-1,4-β-ξυλανάση: 3 975 U(37)/g Ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάση: 125 U(18)/g α-αμυλόση: 1 000 U(42)/g	Χοιρίδια	4 μήνες	Ενδο-1,4-β- ξυλανάση: 3 975 U Ενδο-1,3(4)- β- γλυκανάση: 125 U α-αμυλόση: 1 000 U	-	-	1. Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμυγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμψηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά kg πλήρους ζωοτροφής: Ενδο-1,4-β-ξυλανάση: 3 975 U Ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάση: 125 U α-αμυλόση: 1 000 U 3. Προς χρήση σε συνθέτες ζωοτροφές πλούσιες σε αμυλούχους και μη αμυλούχους πολυσακχαρίτες (κυρίως αραβινοξυλάνες και β-γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 30% σίτο και 20% κριθή και 20% σίκαλη	30.4.2004 (*)

Αριθμός Ε.Ε.	Προσθετικό	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη συγκέ- ντρωση Μονάδες δραστηριότητας ανά kg πλίνθους ζωοτροφής	Μέγιστη συγκέ- ντρωση ητρωση	Άλλες προνοιες	Λήξη της περιόδου εγκρίσης
44	Ενδο-1,3(4)-β- γλυκανάση EC 3.2.1.6 Ενδο-1,4-β- γλυκανάση EC 3.2.1.8 α-αμυλάση EC 3.2.1.1	Παρασκευάσματα ενδο-1,3(4)- β-γλυκανάσης που παράγεται από <i>Trichoderma</i> <i>longibrachiatum</i> (ATCC 2106), ενδο-1,4-β- γλυκανάσης που παράγεται από <i>Trichoderma</i> <i>longibrachiatum</i> (ATCC 2105) (IMI SD135) και α- αμυλάσης που παράγεται από <i>Bacillus</i> <i>amyloliquefaciens</i> (DSM 9553) που παρουσιάζει ελάχιστη δραστηριότητα: Ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάση: 250 U ⁽⁶⁾ /g Ενδο-1,4-β-γλυκανάση: 400 U ⁽⁷⁾ /g α-αμυλάση: 1 000 U ⁽⁸⁾ /g	Χοιρίδια	4 μήνες	Ενδο-1,3(4)- β- γλυκανάση: 250 U Ενδο-1,4-β- γλυκανάση: 400 U α-αμυλάση: 1 000 U	-	1. Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμπίμματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη ζωοτροφής. Ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάση: 250 U Ενδο-1,4-β-γλυκανάση: 400 U α-αμυλάση: 1 000 U 3. Προς χρήση σε συνθέτες ζωοτροφές πλούσιες σε αμιλούχους και μη αμιλούχους β-γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 50% κριθή	30.4.2004 ^(*)
45	Ενδο-1,3(4)-β- γλυκανάση: EC 3.2.1.6 Ενδο-1,4-β- γλυκανάση EC 3.2.1.8 α-αμυλάση EC 3.2.1.1	Παρασκευάσματα ενδο-1,3(4)- β-γλυκανάσης που παράγεται από <i>Tricho-</i> <i>derma longibrachiatum</i> (ATCC 2106), ενδο-1,4-β- γλυκανάσης που παράγεται από <i>Trichoderma</i> <i>longibrachiatum</i> (ATCC 2105) (IMI SD 135) και α- αμυλάσης που παράγεται από <i>Bacillus</i> <i>amyloliquefaciens</i> που παρουσιάζει ελάχιστη δραστηριότητα: Ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάση: 250 U ⁽⁶⁾ /g Ενδο-1,4-β-γλυκανάση: 400 U ⁽⁷⁾ /g α-αμυλάση: 1 000 U ⁽⁸⁾ /g	Χοιρίδια	4 μήνες	Ενδο-1,3(4)- β-γλυκανά- ση: 250 U Ενδο-1,4-β- γλυκανά-ση: 400 U α-αμυλά- ση: 1 000 U	-	1. Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμπίμματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη ζωοτροφής. Ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάση: 250 U Ενδο-1,4-β-γλυκανάση: 400 U α-αμυλάση: 1 000 U 3. Προς χρήση σε συνθέτες ζωοτροφές πλούσιες σε αμιλούχους και μη αμιλούχους β-γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 35% κριθή	30.4.2004 ^(*)

Αριθμός Ε.Ε.	Προσθετικό	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη συνέ- ντωση		Μέγιστη συνέ- ντωση	Άλλες πρόνοιες	Λήξη της περίοδου έγκρισης
					Μονάδες δραστηριότητας ανά kg πλήρους ζωοτροφής				
46	Ενδο-1,3(4)-β- γλυκανάσι: EC 3.2.1.6 Ενδο-1,4-β- ξυλανάσι EC 3.2.1.8 Πολυγалаκτου- ρονάσι EC 3.2.1.15	Παρασκευάσμα ενδο-1,3(4)- β-γλυκανάσι που παράγε- ται από <i>Trichoderma longi- brachiatum</i> (ATCC 2106) και ενδο-1,4-β-ξυλανάσι που παράγεται από <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (IMI SD 135) και πολυγалаκτουρο- νάσι που παράγεται από <i>Aspergillus aculeatus</i> (CBS 589.94) που παρουσιάζει ελάχιστη δραστηριότητα: Ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάσι: 400 U ^(*) /g Ενδο-1,4-β-ξυλανάσι: 400 U ^(*) /g Πολυγалаκτουρονάσι: 50 U ^(*) /g	Χοίροι παχυνόμενοι	-	Ενδο-1,3(4)- β-γλυκανά- σι: 400 U Ενδο-1,4-β- ξυλανά-σι: 400 U Πολυγαλα- κτουρο- νάσι: 50 U	-	1. Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμίσματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμψηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά kg πλήρους ζωοτροφής: Ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάσι: 400 U Ενδο-1,4-β-ξυλανάσι: 400 U Πολυγалаκτουρονάσι: 50 U 3. Προς χρήση σε συνθέτες ζωοτροφές πλούσιες σε αμινοξέες και μη αμινοξέους πολυσακχαρίτες (κυρίως αραβινοξυλάνες και β-γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 4% κρήνη	30.4.2004 ^(*)	
47	Ενδο-1,3(4)-β- γλυκανάσι EC 3.2.1.6 Ενδο-1,4-β- ξυλανάσι EC 3.2.1.8 α-αμυλάση EC 3.2.1.1 Πολυγалаκτου- ρονάσι EC 3.2.1.15	Παρασκευάσμα ενδο-1,3(4)- β-γλυκανάσι που παράγε- ται από <i>Tricho-derma longi- brachiatum</i> (ATCC 2106), ενδο-1,4-β-ξυλανάσι που παράγεται από <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (IMI SD 135) και α-αμυλάση που παρά- γεται από <i>Bacillus amylol- iquefaciens</i> και πολυγала- κτουρονάσι που παράγε- ται από <i>Aspergillus aculea- tus</i> (CBS 589.94) που παρού- σιάζει ελάχιστη δραστηριότητα: Ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάσι: 150 U ^(*) /g Ενδο-1,4-β-ξυλανάσι: 4 000 U ^(*) /g α-αμυλάσι: 1 000 U ^(*) /g Πολυγалаκτουρονάσι: 25 U ^(*) /g	Χοιρίδια	4 μήνες	Ενδο-1,3(4)- β-γλυκανά- σι: 150 U Ενδο-1,4-β- ξυλανά-σι: 4000 U α-αμυλάσι: 1 000U πολυγαλα- κτουρο- νάσι: 25 U	-	1. Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμίσματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμψηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά kg πλήρους ζωοτροφής: Ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάσι: 150 U Ενδο-1,4-β-ξυλανάσι: 4 000 U α-αμυλάσι: 1 000 U Πολυγалаκτουρονάσι: 25 U 3. Προς χρήση σε συνθέτες ζωοτροφές πλούσιες σε αμινοξέες και μη αμινοξέους πολυσακχαρίτες (κυρίως αραβινοξυλάνες και β-γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 20% κρήνη και 35% σίτη	30.4.2004 ^(*)	

Αριθμός Ε.Ε.	Προσθετικό	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη συνέ- ντρωση	Μέγιστη συνέ- ντρωση	Άλλες προνοιες	Λήξη της περιόδου έγκρισης
					Μονάδες δραστηριότητας ανά kg πλήρους ζωοτροφής			
48	α-αμιλάση EC 3.2.1.1 Ενδο-1,3(4)-β- γλυκανάση EC 3.2.1.6	Παρασκευάσμα ενδο-1,3(4)- β-γλυκανάσης που παράγεται από <i>Trichoderma</i> <i>longibrachiatum</i> (DSM 9553), που παρουσιάζει ελάχιστη δραστηριότητα: Επικαλυμμένη μορφή: α-αμιλάση: 200 KNU(°)/g Ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάση: 350 FBG(°)/g Υγρή μορφή: α-αμιλάση: 130 KNU/ml Ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάση: 225 FBG/ml	Κοτόπουλα παχυνόμενα	-	10 KNU 17 FBG	40 KNU 70 FBG	1. Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμιγνύματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη 2. Ενδοεγινόμενη δόση ανά kg πλήρους ζωοτροφής: 20 KNU 35 FBG 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινοζυλάνες και β-γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 40% κριθή	1.4.2004 (°)
					40 KNU 70 FBG	80 KNU 140 FBG		

Αριθμός Ε.Ε.	Προσθετικό	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη συγκέν- τρωση ανά kg πλήρους ζωοτροφής	Μέγιστη συγκέ- ντρωση	Άλλες προνοιες	Λήξη της περίοδου έγκρισης
49	Ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάση EC 3.2.1.6 Ενδο-1,4-β-ξυλανάση EC 3.2.1.8 α-αμυλάση EC 3.2.1.1 Βακίλλουσινη EC 3.4.24.28 Πολυγалаκτου- ρονάση EC 3.2.1.15	Παρασκευάσματα ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάσης που παράγεται από <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (ATCC 2106), ενδο-1,4-β-ξυλανάσης που παράγεται από <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (IMI SD 135), α-αμυλάση που παράγεται από <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (DSM 9553), Βακίλλουσινη που παράγεται από <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (DSM 9554) και πολυγалаκτου-ρονάση που παράγεται από <i>Aspergillus aculeatus</i> (CBS 589.94) που παρουσιάζει ελάχιστη δραστηριότητα: Ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάση: 150 U(¹⁶)/g Ενδο-1,4-β-ξυλανάση: 1 500 U(¹⁷)/g α-αμυλάση: 500 U(¹²)/g Βακίλλουσινη: 800 U(¹)/g Σουμπιλιτινίνη: 50 U(¹⁵)/g	Κοτόπουλα παχυνόμενα	-	Ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάση: 150 U Ενδο-1,4-β-ξυλανάση: 1 500 U Βακίλλουσινη: 800 U Πολυγалаκτου-ρονάση: 50 U	-	1. Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προιγμματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμψη ζωοτροφής: Ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάση: 150 U Ενδο-1,4-β-ξυλανάση: 1 500 U α-αμυλάση: 500 U Βακίλλουσινη: 800 U Πολυγалаκτου-ρονάση: 50 U 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινοξυλάνες και β-γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 30% στο	17.7.2004 ⁽¹⁾

Αριθμός Ε.Ε.	Προσθετικό	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη συνέ- ντρωση	Μέγιστη συνέ- ντρωση	Άλλες πρόνοιες	Λήξη της περιόδου έγκρισης
					Μονάδες δραστηριότητας ανά kg πλήρους ζωοτροφής			
			Ορνίθες αυγοπαραγω- γής	-	250 FYT	-	1. Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του τρομίνματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά kg πλήρους ζωοτροφής: 500-1 000 FYT 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές, δηλαδή που περιέχουν πάνω από 0,25% φυτικά φωσφορικά άλατα	17.7.2004 ^(*)
			Γάλοι παχυνόμενοι	-	250 FYT	-	1. Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του τρομίνματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά kg πλήρους ζωοτροφής: 500-1 000 FYT 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές, δηλαδή που περιέχουν πάνω από 0,25% φυτικά φωσφορικά άλατα	17.7.2004 ^(*)
			Χοιρίδια	2 μήνες	500 FYT	-	1. Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του τρομίνματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά kg πλήρους ζωοτροφής: 500-1 000 FYT 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές, δηλαδή που περιέχουν πάνω από 0,25% φυτικά φωσφορικά άλατα	17.7.2004 ^(*)

Αριθμός Ε.Ε.	Προσθετικό	Χημικός τύπος, περίγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη συγκε- ντρωση	Μέγιστη συγκε- ντρωση	Άλλες προνοιες	Λήξη της περιόδου έγκρισης
					Μονάδες δραστηκότητας ανά kg πλήρους ζωοτροφής			
51	Ενδο-1,4-β- ξυλανάση: EC 3.2.1.8	Παρασκευάσμα ενδο-1,4- β-ξυλανάση που παράγεται από <i>Bacillus subtilis</i> (LMGS 15136) που παρουσιάζει ελάχιστη δραστηκότητα: Ενδο-1,4-β ξυλανάση: EC3.2.1.8 στερεά και υγρή 100 IU (⁴⁵ /g ή ml	Κατόπικα παχυνόμενα	-	10 IU	-	1. Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμύκματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη	17.7.2004 ^(*)
					-	-	2. Ενδεδειγμένη δόση ανά kg πλήρους ζωοτροφής: 10 IU	
			Χοίροι παχυνόμενοι	-	500 FYT	-	3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές, δηλαδή που περιέχουν πάνω από 0,25% φυτικά φωσφορικά άλατα	1.2.2007
			Θηλυκοί χοίροι	-	750 FYT	-	1. Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμύκματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη	1.2.2007
							2. Ενδεδειγμένη δόση ανά kg πλήρους ζωοτροφής: 750-1 000 FYT	
							3. Για χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές με περιεκτικότητα άνω του 0,25% σε φυτικά φωσφορικά άλατα	
							1. Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμύκματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη	17.7.2004 ^(*)
							2. Ενδεδειγμένη δόση ανά kg πλήρους ζωοτροφής: 10 IU	
							3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές, πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινοξυλάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 40% σίτο	

Αριθμός Ε.Ε.	Προσθετικό	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη συγκέντρωση νιτρωση ανά kg πλήρους ζωοτροφής		Μέγιστη συγκέντρωση νιτρωση ανά kg πλήρους ζωοτροφής	Άλλες προνοιες	Λήξη της περίοδου έγκρισης
					Μονάδες δραστηριότητας	ζωοτροφής			
			Χοιρίδια	2 μήνες	10 IU	-	-	1. Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμύγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη	31.5.2005 (*)
			Γαλοπούλες παχυνόμενες	-	10 IU	-	-	2. Ενδεδειγμένη δόση ανά kg πλήρους ζωοτροφής: 10 IU	
			Πουλερικά παχυνόμενα	-	10 IU	-	-	3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές, δηλαδή που περιέχουν πάνω από 40% σίτο	
			Χοίροι παχυνόμενοι		10IU				1.1.2007

Αριθμός Ε.Ε.	Προσθετικό	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη συγκέντρωση		Μέγιστη συγκέντρωση ντρωσή	Άλλες προνοιες	Λήξη της περιόδου έγκρισης
					Μονάδες δραστηριότητας ανά kg πλήρους ζωοτροφής				
52	Ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάση EC 3.2.1.6 Ενδο-1,4(4)-β-γλυκανάση EC 3.2.1.4 α-αμυλάση: EC 3.2.1.1	Παρασκευάσμα ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάσης που παράγεται από <i>Aspergillus aculeatus</i> (CBS 589.94), ενδο-1,4-β-γλυκανάσης που παράγεται από <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (CBS 592.94) και α-αμυλάσης που παράγεται από <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (DSM 9553) που παρουσιάζει ελάχιστη δραστηριότητα: Υγρή μορφή: Ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάση: 10 000 U(*)/ml Ενδο-1,4(4)-β-γλυκανάση: 120 000 U(*)/ml α-αμυλάση: 400 U(*)/ml	Κοτόπουλα παχυνόμενα	-	Ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάση: 1 000 U Ενδο-1,4(4)-β-γλυκανάση: 12 000 U α-αμυλάση: 40 U	-	1. Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προιμγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη 2. Ενδεχόμενη δόση ανά kg πλήρους ζωοτροφής: Ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάση: 1 000-2 000 U Ενδο-1,4-β-γλυκανάση: 12 000-24 000 U α-αμυλάση: 40-80 U 3. Προς χρήση σε συνθέτες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες (κυρίως αραβινοξυλάνες και β-γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 20% σίτο και 15% σόργο, και 5% αραβόσιτο	17.7.2004 (*)	

Αριθμός Ε.Ε.	Προσθετικό	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη συγκέν- τρωση		Μέγιστη συγκέ- ντρωση	Άλλες πρόνοιες	Λήξη της περιόδου έγκρισης
					Μονάδες δραστηριότητας ανά kg πλήρους ζωοτροφής				
53	Ενδο-1,3(4)-β- γλυκανάση EC 3.2.1.6 Ενδο-1,4(4)-β- γλυκανάση EC 3.2.1.4 α-αμυλάση: EC 3.2.1.1 Βακιλλουσίνη EC 3.4.24.28 Ενδο-1,4-β- ξυλανάση: EC 3.2.1.8	Παρασκευασμα ενδο- 1,3(4)-β-γλυκανάσης που παράγεται από <i>Aspergillus aculeatus</i> (CBS 589.94), ενδο-1,4-β-γλυκανάσης που παράγεται από <i>Trichoderma longibra- chiatum</i> (CBS 582.94), α-αμυλάσης που παράγεται από <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (DSM 9553), βακιλλουσίνης που παράγεται από <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (DSM 9554) και 1,4-β-ξυλανάσης που παράγεται από <i>Trichoderma viride</i> (NIBH FERM BP 4842) που παρασιάζει ελάχιστη δραστηριότητα: Ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάση: 2 350 U ^(*) /g Ενδο-1,4(4)-β-γλυκανάση: 4 000 U ^(*) /g α-αμυλάση: 400 U ^(*) /g Βακιλλουσίνη: 450 U ^(*) /g Ενδο-1,4-β-ξυλανάση: 20 000 U ^(*) /g	Χοιρίδια	2 μήνες	Ενδο-1,3(4)- β- γλυκανάση: 2 350 U Ενδο-1,4(4)- β- γλυκανάση: 4 000 U α-αμυλάση: 400 U Βακιλλουσί- νη 450 U Ενδο-1,4-β- ξυλανάση: 20 000 U	-	1. Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμικτώματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά kg πλήρους ζωοτροφής: Ενδο-1,3(4)-β- γλυκανάση: 2 350 U Ενδο-1,4-β-γλυκανάση: 4 000 U α-αμυλάση: 400 U Βακιλλουσίνη: 450 U Ενδο-1,4-β-ξυλανάση: 20 000 U 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινοξυλάνες και β-γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 25% κριθή και 20% αραβόσιτο	23.11.2004 (*)	

Αριθμός Ε.Ε.	Προσθετικό	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μένιστη ηλικία	Ελέγχιση	Μένιστη	Άλλες προνοιές	Λήξη της περιόδου έγκρισης
					συγκέ- ντρωση	συγκέ- ντρωση		
					Μονάδες δραστηκότητας ανά kg πλήρους ζωοτροφής			
			Κοτόπουλα παχυνόμενα	-	Ενδο-1,3(4)- β- γλυκανάση: 1 175 U Ενδο-1,4(4)- β- γλυκανάση: 2 000 U α-αμυλάση: 200 U Βακilloλυσι νη 225 U Ενδο-1,4-β- ξυλανάση: 10 000 U	-	1. Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμηνύματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά kg πλήρους ζωοτροφής: Ενδο-1,3(4)-β- γλυκανάση: 1 175 - 2 350 U Ενδο-1,4-β-γλυκανάση: 2 000 - 4 000 U α-αμυλάση: 200 - 400 U Βακilloλυσινη: 225 U Ενδο-1,4-β-ξυλανάση: 10 000 - 20 000 U 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλοισίες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινόξυλάνες και β-γλυκανές), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 45% αίτο	23.11.2004 (*)
54	Ενδο-1,3(4)-β- γλυκανάση EC 3.2.1.6 Ενδο-1,4(4)-β- γλυκανάση EC 3.2.1.4 α-αμυλάση: EC 3.2.1.1 Ενδο-1,4-β- ξυλανάση: EC 3.2.1.8	Παρασκευάσμα ενδο-1,3(4)- β-γλυκανάσης που παράγε- ται από Aspergillus acule- atus (CBS 589.94), ενδο- 1,4-β-γλυκανάσης που παράγεται από Trichoderma longibrachiatum (CBS 592.94) και α-αμυλάσης που παράγεται από Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553), και ενδο-1,4-β-ξυλα- νάσης που παράγεται από Trichoderma viride (NIBH FERM BP 4842) που πα- ρουσιάζει ελάχιστη δραστηκ- : Ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάση: 10 000 U (*) /g Ενδο-1,4(4)-β-γλυκανάση: 120 000 U (*) /g α-αμυλάση: 400 U (*) /g Ενδο-1,4-β-ξυλανάση: 210 000 U (*) /g	-	-	Ενδο-1,3(4)- β- γλυκανάση: 1 000 U Ενδο-1,4(4)- β- γλυκανάση: 12 000 U α-αμυλάση: 40 U Ενδο-1,4-β- ξυλανάση: 21 000 U	-	1. Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμηνύματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά kg πλήρους ζωοτροφής: Ενδο-1,3(4)-β- γλυκανάση: 1 000 - 2 000 U Ενδο-1,4-β-γλυκανάση: 12 000 - 24 000 U α-αμυλάση: 40 - 80 U Ενδο-1,4-β-ξυλανάση: 21 000 - 42 000 U 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλοισίες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινόξυλάνες και β-γλυκανές), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 45% αίτο	23.11.2004 (*)

Αριθμός Ε.Ε.	Προσθετικό	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μένιστη ηλικία	Ελάχιστη συγκέ- ντρωση Μονάδες δραστηκότητας ανά kg πλήρους ζωοτροφής	Μένιστη συγκέ- ντρωση	Άλλες προνοιες	Λήξη της περίδου έγκρισης
55	Ενδο-1,3(4)-β- γλυκανάση EC 3.2.1.6 Ενδο-1,4(4)-β- γλυκανάση EC 3.2.1.4 α-αμυλάση: EC 3.2.1.1 Βακιλλολυσίνη EC 3.4.24.28	Παρασκευάσμα ενδο- 1,3(4)-β-γλυκανάσης που παράγεται από <i>Aspergillus</i> <i>aculeatus</i> (CBS 569.94), ενδο-1,4-β-γλυκανάσης που παράγεται από <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (CBS 592.94) και α-αμυλάσης που παράγεται από <i>Bacillus</i> <i>amyloliquefaciens</i> (DSM 9553), και βακιλλολυσίνης που παράγεται από <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (DSM 9554) που παρουσιάζει ελάχιστη δραστηκότητα: Ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάση: 3 000 U ^(*) /g Ενδο-1,4-β-γλυκανάση: 5 000 U ^(*) /g α-αμυλάση: 540 U ^(**) /g Βακιλλολυσίνη: 450 U ^(**) /g	Χοιρίδια	2 μήνες	Ενδο-1,3(4)- β-γλυκανάση: 1 500 U Ενδο-1,4(4)- β- γλυκανάση: 2 500 U α-αμυλάση: 270 U Βακιλλολυσί νη: 225 U	-	1. Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμύγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά kg πλήρους ζωοτροφής: Ενδο-1,3(4)-β- γλυκανάση: 1 500 - 3 000 U Ενδο-1,4-β-γλυκανάση: 2 500 - 5 000 U α-αμυλάση: 270 - 540 U Βακιλλολυσίνη: 225 - 450 U 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως β-γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 35% σίτο και 15% κριθή	23.11.2004 (*)
			Χοίροι παχυνόμενοι	-	Ενδο-1,3(4)- β- γλυκανάση: 1 500 U Ενδο-1,4(4)-β- γλυκανάση: 2 500 U α-αμυλάση: 270 U Βακιλλολυσί νη: 225 U	-	1. Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμύγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη ζωοτροφής: Ενδο-1,3(4)-β- γλυκανάση: 1 500 - 3 000 U Ενδο-1,4-β-γλυκανάση: 2 500 - 5 000 U α-αμυλάση: 270 - 540 U Βακιλλολυσίνη: 225 - 450 U 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινόζυλάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 50% κριθή	23.11.2004 (*)

Αριθμός Ε.Ε.	Προσθετικό	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη συγκέ- ντρωση	Μέγιστη συγκέ- ντρωση	Άλλες πρόνοιες	Λήξη της περιόδου έγκρισης
					Μονάδες δραστηκότητας ανά kg πλήρους ζωοτροφής	Μονάδες δραστηκότητας ανά kg πλήρους ζωοτροφής		
		Κοτόπουλα παχυνόμενα	-	-	Ενδο-1,3(4)- β- γλυκανάσι: 1 500 U Ενδο-1,4(4)- β- γλυκανάσι: 2 500 U α-αμυλάσι: 270 U Βακilloλυσι vη: 225 U	- - - -	1. Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμینگματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά kg πλήρους ζωοτροφής: Ενδο-1,3(4)-β- γλυκανάσι: 1 500 - 3 000 U Ενδο-1,4-β-γλυκανάσι: 2 500 - 5 000 U α-αμυλάσι: 270 - 540 U Βακilloλυσι: 225 - 450 U 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές (κυρίως αραβινοξυλάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 50% αραβόσιτο ή 50% αίθο	23.11.2004 (*)
		Όρνιθες αυγοπαραγω- γής	-	-	Ενδο-1,3(4)- β- γλυκανάσι: 1 500 U Ενδο-1,4(4)- β- γλυκανάσι: 2 500 U α-αμυλάσι: 270 U Βακilloλυσι vη: 225 U	- - -	1. Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμینگματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά kg πλήρους ζωοτροφής: Ενδο-1,3(4)-β- γλυκανάσι: 1 500 - 3 000 U Ενδο-1,4-β-γλυκανάσι: 2 500 - 5 000 U α-αμυλάσι: 270 - 540 U Βακilloλυσι: 225 - 450 U 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές (κυρίως αραβινοξυλάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 40% αραβόσιτο και 10% σίκαλη	23.11.2004 (*)

Αριθμός Ε.Ε.	Προσθετικό	Χημικός τύπος, περίγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη συγκέ- ντρωση Μονάδες δραστηριότητας ανά kg πλήρους ζωοτροφής	Μέγιστη συγκέ- ντρωση	Άλλες προνοιες	Λήξη της περίοδου έγκρισης
56	Ενδο-1,3(4)-β- γλυκανάσχη EC 3.2.1.6 Ενδο-1,4(4)-β- γλυκανάσχη EC 3.2.1.4 α-αμυλάση EC 3.2.1.1 Βακίλλουσινη EC 3.4.24.28	Παρασκευάσμα ενδο-1,3(4)- β-γλυκανάσχη που παράγεται από <i>Aspergillus</i> <i>aculeatus</i> (CBS 589.94), ενδο-1,4-β-γλυκανάσχη που παράγεται από <i>Trichoderma</i> <i>longibrachiatum</i> (CBS 592.94), α-αμυλάσης που παράγεται από <i>Bacillus</i> <i>amyloliquefaciens</i> (DSM 9553), και βακίλλουσινης που παράγεται από <i>Bacillus</i> <i>amyloliquefaciens</i> (DSM 9554) που παρουσιάζει ελάχιστη δραστηριότητα: Ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάσχη: 6 000 U ^(a) /g Ενδο-1,4-β-γλυκανάσχη: 3 500 U ^(a) /g α-αμυλάση: 1 400 U ^(a) /g Βακίλλουσινη: 450 U ^(a) /g	Κοτόπουλα παχυνόμενα	-	Ενδο-1,3(4)- β- γλυκανάσχη: 6 000 U Ενδο-1,4(4)- β- γλυκανάσχη: 3 500 U α-αμυλάση 1 400 U Βακίλλο- λυσίνη: 450 U	-	1. Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προσμίγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά kg πλήρους ζωοτροφής: Ενδο-1,3(4)-β- γλυκανάσχη: 6 000 U . Ενδο-1,4-β-γλυκανάσχη: 3 500 U α-αμυλάση: 1 400 U Βακίλλουσινη: 450 U 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινοζυλάνες και β-γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 40% κρήνη	23.11.2004 ^(c)

Αριθμός Ε.Ε.	Προσθετικό	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μένιστη ηλικία	Ελάχιστη συγκέντρωση Μονάδες δραστηριότητας ανά kg πλήρους ζωοτροφής	Μένιστη συγκέντρωση ντρώση	Άλλες προνοιες	Λήξη της περιόδου έγκρισης
57	Ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάση EC 3.2.1.6 Ενδο-1,4(4)-β-γλυκανάση EC 3.2.1.4 α-αμυλάση: EC 3.2.1.1 EC 3.4.24.28 Βακίλλουσινη	Παρασκευάσματα ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάσης που παράγεται από <i>Aspergillus aculeatus</i> (CBS 589.94), ενδο-1,4-β-γλυκανάσης που παράγεται από <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (CBS592.94), α-αμυλάσης που παράγεται από <i>Bacillus</i> <i>amyloliquefaciens</i> (DSM 9553) και βακίλλουσινης που παράγεται από <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (DSM 9554) που παρουσιάζει ελάχιστη δραστηριότητα: Ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάση: 3 000 U ^(*) /g Ενδο-1,4(4)-β-γλυκανάση: 9 000 U ^(*) /g α-αμυλάση: 540 U ^(*) /g Βακίλλουσινη: 450 U ^(*) /g	Κοτόπουλα παχυνόμενα	-	Ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάση: 3 000 U Ενδο-1,4(4)-β-γλυκανάση: 9 000 U α-αμυλάση: 540 U Βακίλλουσινη: 450 U	-	1. Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμυγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη ζωοτροφής: Ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάση: 3 000 U Ενδο-1,4-β-γλυκανάση: 9 000 U α-αμυλάση: 540 U Βακίλλουσινη: 450 U 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε αμυλούχους και μη αμυλούχους πολυσακχαρίτες (κυρίως κυταρίνη και ημικυταρίνη), π.χ. που περιέχουν πάνω από 20% θλειρο ηλάνθου και 10% σογιάνευρο	23.11.2004 (*)

Αριθμός Ε.Ε.	Προσθετικό	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη συγκέντρωση νιτρώση Μονάδες δραστηριότητας ανά kg πλήρους ζωοτροφής	Μέγιστη συγκέντρωση νιτρώση	Άλλες προναιες	Λήξη της περιόδου έγκρισης
58	Ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάση EC 3.2.1.6 Ενδο-1,4(4)-β-γλυκανάση EC 3.2.1.4 α-αμυλάση: EC 3.2.1.1 Βακιλλολυσίνη EC 3.4.24.28	Παρασκευάσμα ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάσης που παράγεται από <i>Aspergillus aculeatus</i> (CBS 589.94), ενδο-1,4-β-γλυκανάσης που παράγεται από <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (CBS 592.94), α-αμυλάσης που παράγεται από <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (DSM 9553) και βακιλλολυσίνης που παράγεται από <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (DSM 9553) που παρουσιάζει ελάχιστη δραστηριότητα: Ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάση: 2 350 U(^α)/g Ενδο-1,4(4)-β-γλυκανάση: 5 000 U(^α)/g α-αμυλάση: 400 U(^α)/g Βακιλλολυσίνη: 5 000 U(^α)/g	Χοιρίδια	2 μήνες	Ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάση: 2 350 U Ενδο-1,4(4)-β-γλυκανάση: 5 000 U α-αμυλάση: 400 U Βακιλλολυσίνη: 5 000 U	-	1. Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμιγνύματος πρέπει να αναφέρεται η θερμικρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά kg πλήρους ζωοτροφής: Ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάση: 2 350 U Ενδο-1,4-β-γλυκανάση: 5 000 U α-αμυλάση: 400 U Βακιλλολυσίνη: 5 000 U 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινοζυκάνες και β-γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 30% κριθή	23.11.2004 (^β)

Αριθμός Ε.Ε.	Προσθετικό	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη συγκέντρωση		Μέγιστη συγκέντρωση ντρώση	Άλλες προνοίες	Λήξη της περιόδου έγκρισης
					Μονάδες δραστηριότητας ανά kg πλήρους ζωοτροφής				
59	Ενδο-1,4-β- γλυκανάση EC 3.2.1.8 Ενδο-1,3(4)-β- γλυκανάση EC 3.2.1.6 Σουμπτιλίνη: EC 3.4.21.62 α-αμυλάση: EC 3.2.1.1 Πολυγалаκτου- ρονάση EC 3.2.1.15	Παρασκευάσματα ενδο-1,4-β- γλυκανάσης που παράγονται από <i>Trichoderma longibra- chiatum</i> (ATCC 2105), ενδο- 1,3(4)-β-γλυκανάσης και α- αμυλάσης που παράγεται από τον <i>Bacillus</i> <i>amyloliquefaciens</i> (DSM 9553), σουμπτιλίνη που παράγεται από <i>Bacillus</i> <i>subtilis</i> (ATCC 2107), πολυγалаκτου- ρονάση που παράγεται από <i>Aspergillus</i> <i>aculeatus</i> (CBS 589.94) που παρουσιάζει ελάχιστη δραστηριότητα: Ενδο-1,4-β-γλυκανάση: 3050 U ^(*) /g Ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάση: 150 U ^(**) /g Σουμπτιλίνη: 4 000 U ^(*) /g α-αμυλάση: 400 U ^(**) /g Πολυγалаκτουρονάση: 25 U ^(*) /g	Κοτόπουλα παχυνόμενα	-	Ενδο-1,4-β- γλυκανάση: 300 U Ενδο-1,3(4)- β- γλυκανάση: 150 U Σουμπτιλ- ίνη: 4 000 U α-αμυλάση: 400 U πολυγала- κτουρονά- ση: 25 U	-	1. Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμπίματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμψηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά kg πλήρους ζωοτροφής: Ενδο-1,4-β- γλυκανάση: 300 U Ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάση: 150 U Σουμπτιλίνη: 4 000 U α-αμυλάση: 400 U Πολυγалаκτουρονάση: 25 U 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινοζυάνες και β-γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 40% αραβόσιτο	28.2.2005 ^(*)	
60	Ενδο-1,4-β- γλυκανάση EC 3.2.1.8 Ενδο-1,3(4)-β- γλυκανάση EC 3.2.1.6	Παρασκευάσματα ενδο-1,4- β-γλυκανάσης που παράγονται από <i>Trichoderma longibra- chiatum</i> (ATCC 2105) και ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάσης που παράγονται από <i>Trichoderma</i> <i>longibrachiatum</i> (ATCC 2106) που παρουσιάζει ελάχιστη δραστηριότητα: Ενδο-1,4-β-γλυκανάση: 5 000 U ^(*) /ml Ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάση: 50 U ^(*) /ml	Κοτόπουλα παχυνόμενα	-	Ενδο-1,4(β)- γλυκανάση: 500 U Ενδο-1,3(4)- β-γλυκανά- ση: 5 U	-	1. Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμπίματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμψηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά kg πλήρους ζωοτροφής: Ενδο-1,4-β- γλυκανάση: 500 - 2 500 U Ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάση: 5 - 25 U 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινοζυάνες και β-γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 20% κριθή και 40% σίτο	28.2.2005 ^(*)	

Αριθμός Ε.Ε.	Προσθετικό	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη συγκέ- ντρωση Μονάδες δραστηριότητας ανά kg πλήρους ζωοτροφής	Μέγιστη συγκέ- ντρωση	Άλλες προνοιες	Λήξη της περίοδου έγκρισης
61	Ενδο-1,4-β- ξυλανόση EC 3.2.1.8 Ενδο-1,3(4)-β- γλυκανόση EC 3.2.1.6	Παρασκευάσματα ενδο-1,4- β-ξυλανόσης που παράγονται από Trichoderma reesei (CBS 529.94) και ενδο- 1,3(4)-β-γλυκανόσης που παράγεται από Trichoderma reesei (CBS 526.94) που παρουσιάζει ελάχιστη δραστηριότητα: Μορφή σκόνης: Ενδο-1,4-β-ξυλανόση: 17 000 U ^(*) /g Ενδο-1,3(4)-β-γλυκανόση: 11 000 U ^(*) /g Υγρή μορφή: Ενδο-1,4-β-ξυλανόση: 22 000 BXU/ml Ενδο-1,3(4)-β-γλυκανόση: 15 000 BU/ml	Κοτόπουλα παχυνόμενα	-	Ενδο-1,4-β- ξυλανόση: 17 000 BXU Ενδο-1,3(4)- β-γλυκανά- ση: 11 000 BU	-	1. Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμίσγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά kg πλήρους ζωοτροφής: Ενδο-1,4-β- ξυλανόση: 17 000 BXU Ενδο-1,3(4)-β-γλυκανόση: 11 000 BU 3. Προς χρήση σε συνθέτες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινόγλυκάνες και β-γλυκάνες), δολαφή που περιέχουν πάνω από 40% κριθή ή 55% σίτο	28.2.2005 ^(*)

Αριθμός Ε.Ε.	Προσθετικό	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη συγκέ- ντρωση	Μέγιστη συγκέ- ντρωση	Άλλες πρόνοιες	Λήξη της περιόδου έγκρισης		
					Μονάδες δραστηριότητας ανά kg πλήρους ζωοτροφής	Μονάδες δραστηριότητας ανά kg πλήρους ζωοτροφής				
1	ΙΕ. Μικρο- οργανισμοί <i>Bacillus cereus</i> var. <i>toyo</i> NCIMB 40112/ CNCM 1-1012	Παρασκευάσματα του <i>Bacillus cereus</i> var. <i>toyo</i> που περιέχει τουλάχιστον 1X 10 ⁸ CFU/g πρόσθετη ύλη	Κοτόπουλα παχυνόμενα	-	0,2 X10 ⁹	1 X10 ⁹	Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμήγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης, και η σταθερότητα στη σύμπτυξη Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σύνθετες ζωοτροφές που περιέχουν τα εγκεκριμένα κοκκιοδιασταλικά: monensin sodium, lasolacide sodium, salinomycine sodium, decoquinolate, robenidine narasin, halofuginone	7.10.2004		
							0,2 X10 ⁹	1 X10 ⁹	Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμήγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στην σύμπτυξη	7.10.2004
							0,5 X10 ⁹	1 X10 ⁹	Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμήγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στην σύμπτυξη	7.10.2004

Αριθμός Ε.Ε.	Προσθετικό	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη συγκέν- τρωση Μονάδες δραστηριότητας ανά kg πλάνους ζωοτροφής	Μέγιστη συγκέν- τρωση	Άλλες προνοιες	Λήξη της περιόδου έγκρισης
			Βοοειδή παχυνόμενα	-	0,2 X10 ⁹	0,2 X10 ⁹	Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμηνματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στην σύμπτυξη Η ποσότητα του <i>Bacillus cereus</i> van. <i>loyal</i> στην καθημερινή μερίδα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 0,1 X10 ⁸ CFU ανά 100 kg σωματικού βάρους. Προσθέστε 0,2 X10 ⁹ CFU για κάθε επιπλέον 100kg σωματικού βάρους	7.10.2004
			Θηλυκά κουνέλια αναπαραγω- γής	-	0,1 X10 ⁹	5 X10 ⁹	Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμηνματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στην σύμπτυξη Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σύνθετες ζωοτροφές που περιέχουν το ενγκεκρίμενο κοκκιδιοστατικό: robenidine	7.10.2004
			Κουνέλια παχυνόμενα	-	0,1 X10 ⁹	5 X10 ⁹	Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμηνματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στην σύμπτυξη Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σύνθετες ζωοτροφές που περιέχουν το ενγκεκρίμενο κοκκιδιοστατικό: robenidine, salinomycin sodium	7.10.2004

Αριθμός Ε.Ε.	Προσθετικό	Χημικός τύπος, περίγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη συγκέ- ντρωση	Μέγιστη συγκέ- ντρωση	Άλλες προνοιές	Λήξη της περιόδου έγκρισης
					Μονάδες δραστηκότητας ανά kg πλήρους ζωοτροφής	5 x 10 ⁹		
3	Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47	Παρασκεύασμα Saccharomyces cerevisiae που περιέχει τουλάχιστον: 5 x 10 ⁹ CFU/g προσθετικού	Κουνέλια παχυνόμενα	-	2,5 x 10 ⁹	5 x 10 ⁹	Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμήγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη Δύνανται να χρησιμοποιηθεί σε συνθέτες ζωοτροφές που περιέχουν τα επιτρεπόμενα κοκκιοστατικά: μετικλοριπιντόλια	30.6.2004 (*)
					5 x 10 ⁹	2,5 x 10 ⁹	Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμήγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη	30.6.2004 (*)
			Χοιρίδια	4 μήνες	5 x 10 ⁹	1 x 10 ¹⁰	Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμήγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη	30.6.2004 (*)

Αριθμός Ε.Ε.	Προσθετικό	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη συγκέ- ντρωση	Μέγιστη συγκέ- ντρωση	Άλλες προνοιες	Λήξη της περιόδου έγκρισης
					Μονάδες δραστηριότητας ανά kg πλήρους ζωοτροφής			
			Ανέλδες γαλακτο- παραγωγής	-	4 x 10 ⁸	2 x 10 ⁹	Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμήγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμψηξη. Η ποσότητα του <i>Saccharomyces cerevisiae</i> στο ημερήσιο σιτηρέσιο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 5,6 x 10 ⁹ CFU ανά 100 kg σωματικού βάρους. Για κάθε επιπλέον 100 kg προστίθενται 8,75 x 10 ⁹ CFU.	31.5.2005 (*)
5	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> CBS 493.94	Παρασκεύασμα <i>Saccharomyces cerevisiae</i> που περιέχει τουλάχιστον: 1 x 10 ⁹ CFU/g προσθετικού	Δομάδια	6 μήνες	2 x 10 ⁸	2 x 10 ⁹	Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμήγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμψηξη	30.6.2004 (*)
			Βοοειδή παχυνόμενα	-	1,7 x 10 ⁸	1,7 x 10 ⁹	Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμήγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμψηξη. Η ποσότητα του <i>Saccharomyces cerevisiae</i> στο ημερήσιο σιτηρέσιο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 7,5 x 10 ⁹ CFU ανά 100 kg σωματικού βάρους. Για κάθε επιπλέον 100 kg προστίθενται 1x 10 ⁹ CFU.	30.6.2004 (*)

Αριθμός Ε.Ε.	Προσθετικό	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη συγκέ- ντρωση	Μέγιστη συγκέ- ντρωση	Άλλες προνοιες	Λήξη της περιόδου έγκρισης
					Μονάδες δραστηριότητας ανά kg πλήρους ζωοτροφής	νιτρική		
			Αγέλες γαλακτο- παραγωγής	-	5×10^7	$3,5 \times 10^8$	Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του τροφίματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη. Η ποσότητα του <i>Saccharomyces cerevisiae</i> στο ημερήσιο σιτηράσιο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα $1,2 \times10^8$ CFU ανά 100 kg σωματικού βάρους. Για κάθε επιπλέον 100 kg προστίθενται $1,7 \times 10^8$ CFU.	31.5.2005 (*)
6	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> CNCM I-1079	Παρασκήνισμα <i>Saccharomyces cerevisiae</i> που περιέχει τουλάχιστον: 2×10^{10} CFU/g προσθετικού	Γουρουνές	-	2×10^9	1×10^{10}	Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του τροφίματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη.	30.6.2004 (*)
			Χοιρίδια	4 μήνες	6×10^9	3×10^{10}	Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του τροφίματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη.	30.6.2004 (*)

Αριθμός Ε.Ε.	Προσθετικό	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη συγκέ- ντρωση	Μέγιστη συγκέ- ντρωση	Άλλες πρόνοιες	Λήξη της περιόδου έγκρισης
					Μονάδες δραστηριότητας ανά kg πλήρους ζωοτροφής	Μονάδες δραστηριότητας ανά kg πλήρους ζωοτροφής		
7	Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077	Παρασκεύασμα Saccharomyces cerevisiae που περιέχει τουλάχιστον: 2×10^{10} CFU/g προσθετικού	Αγλαδές γαλακτο- παραγωγής	-	$5,5 \times 10^9$	$2,1 \times 10^9$	Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμήγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη. Η ποσότητα του Saccharomyces cerevisiae στο ημερήσιο σιτηρέσιο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα $8,4 \times$ 10^9 CFU ανά 100 kg σωματικού βάρους. Για κάθε επιπλέον 100 kg προστίθενται $1,8 \times 10^9$ CFU.	30.6.2004 (*)
			Βοοειδή παχυνόμενα	-	1×10^9	$1,5 \times 10^9$	Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμήγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη. Η ποσότητα του Saccharomyces cerevisiae στο ημερήσιο σιτηρέσιο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα $4,6 \times$ 10^9 CFU ανά 100 kg σωματικού βάρους. Για κάθε επιπλέον 100 kg προστίθενται 2×10^9 CFU.	30.6.2004 (*)

Αριθμός Ε.Ε.	Προσθετικό	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη συγκέ- ντρωση	Μέγιστη συγκέ- ντρωση	Άλλες προνοιες	Λήξη της περιόδου έγκρισης
					Μονάδες δραστηκότητας ανά kg πλήρους ζωοτροφής	ανά kg πλήρους ζωοτροφής		
8	Enterococcus faecium ATCC 53519 Enterococcus faecium ATCC 55593 [Σε αναλογία 1/1]	Μίγμα: ενθλακωμένου Enterococcus faecium ATCC 53519 και ενθλακωμένου Enterococcus faecium ATCC 55593 περιέχει τουλάχιστον 2×10^8 CFU/g προσθετικού (ήτοι τουλάχιστον 1×10^8 CFU/g κάθε βακτηρίου)	Κοτόπουλα παχυνόμενα	-	1×10^9	1×10^8	Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμύγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη. Δύναται να χρησιμοποιηθεί σε σύνθετες ζωοτροφές που περιέχουν τα επιτρεπόμενα κοκκιοστατικά: ντεκοκλινέλ, αλοφουζιλόνη, λασαλοσινικό νάτριο, μαντουραμικινικό αμμόνιο, μονενσινικό νάτριο, ναραζίνη, σαλινουμινικό νάτριο	30.6.2004 (*)
9	Pediacoccus acidilactici CNCM MA 18/4R	Παρασκεύασμα: Pediacoccus acidilactici που περιέχει τουλάχιστον 1×10^{10} CFU/g προσθετικού	Κοτόπουλα παχυνόμενα	-	1×10^9	1×10^{10}	Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμύγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη. Δύναται να χρησιμοποιηθεί σε σύνθετες ζωοτροφές που περιέχουν τα επιτρεπόμενα κοκκιοστατικά: ντεκοκλινέλ, αλοφουζιλόνη, ναραζίνη, σαλινουμινικό νάτριο, μαντουραμικινικό αμμόνιο, δικλαζουρίλη	30.6.2004 (*)
			Χοιρία	4 μήνες	1×10^9	1×10^8	Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμύγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη	30.6.2004 (*)

Αριθμός Ε.Ε.	Προσθετικό	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη συγκέντρωση ντρώση ανά kg πλήρους ζωοτροφής		Μέγιστη συγκέντρωση ντρώση	Άλλες προνοιες	Λήξη της περιόδου έγκρισης
					Μονάδες δραστηριότητας	ζωοτροφής			
			Χοίροι παχυνόμενοι	-	1×10^9	1×10^9		Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμύγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη	30.6.2004 ⁽⁵⁾
10	Enterococcus faecium NCIMB 10415	Παρασκευάσμα Enterococcus faecium που περιέχει τουλάχιστον: Μικροενθλασμένη μορφή: $1,0 \times 10^{10}$ CFU/g προσθετικού $1,75 \times 10^{10}$ CFU/g προσθετικού	Κοτόπουλα παχυνόμενα	-	$0,3 \times 10^9$	$2,8 \times 10^9$		Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμύγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη. Δύναται να χρησιμοποιηθεί σε σύνθετες ζωτροφές που περιέχουν τα επιτρεπόμενα κοκκιοστατικά: αμπρολιόνη, δικλαζουρίλη, αλοφουζιόνη, μαντουραμυκινικό αμμόνιο, μονενασινικό νάτριο, ρομπενιδίνη, σολινομυκινικό νάτριο	30.6.2004 ⁽⁵⁾
			Χοίροι παχυνόμενοι	-	$0,35 \times 10^9$	$1,5 \times 10^9$		Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμύγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη	30.6.2004 ⁽⁵⁾
			Γουρούνες	-	$0,2 \times 10^9$	$1,25 \times 10^9$		Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμύγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη	30.6.2004 ⁽⁵⁾

Αριθμός Ε.Ε.	Προσθετικό	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη συνέ- ντρωση Μονάδες δραστηκότητας ανά kg πλίνθους ζωοτροφής	Μέγιστη συνέ- ντρωση		Άλλες προνοιες	Λήξη της περιόδου έγκρισης
						Ελάχιστη συνέ- ντρωση	Μέγιστη συνέ- ντρωση		
			Βοοειδή παχυνόμενα	-	$0,25 \times 10^9$	$0,8 \times 10^9$		Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμύγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη. Η ποσότητα του <i>Enterococcus faecium</i> στο ημερήσιο σιτηρέσιο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 1×10^8 CFU ανά 100 kg σωματικού βάρους. Για κάθε επιπλέον 100 kg προστίθενται 1×10^8 CFU.	30.6.2004 ^(b)
		Παρασκεύασμα <i>Enterococcus faecium</i> που περιέχει τουλάχιστον: Μικροενθυλακωμένη μορφή: $1,0 \times 10^{10}$ CFU/g προσθετικού $1,75 \times 10^{10}$ CFU/g προσθετικού και σε μορφή κόκκων: $3,5 \times 10^{11}$ CFU/g προσθετικού	Χοιρίδια	4 μήνες	$0,3 \times 10^9$	$1,4 \times 10^9$		Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμύγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη. Σε μορφή κόκκων να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά σε υποκατάστατα γάλακτος.	30.6.2004 ^(b)
			Δαμάκια	6 μήνες	$0,35 \times 10^9$	$6,6 \times 10^9$		Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμύγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη. Σε μορφή κόκκων να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά σε υποκατάστατα γάλακτος.	30.6.2004 ^(b)

Αριθμός Ε.Ε.	Προσθετικό	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη συγκέ- ντρωση Μονάδες δραστηκότητας ανά kg πλίνθους ζωοτροφής	Μέγιστη συγκέ- ντρωση	Άλλες προνοιες	Λήξη της περιόδου έγκρισης
11	<i>Enterococcus faecium</i> DSM 5464	Παρασκεύασμα <i>Enterococcus faecium</i> που περιέχει τουλάχιστον: 5×10^6 CFU/g προσθετικού	Χοιρίδια	4 μήνες	$0,5 \times 10^9$	1×10^9	Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμύγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη.	30.8.2004 (*)
			Κοτόπουλα παχυνόμενα		$0,5 \times 10^9$	1×10^9	Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμύγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη. Δύναται να χρησιμοποιηθεί σε σύνθετες ζωοτροφές που περιέχουν τα επιτρεπόμενα κοκκιοστατικά: ολεψουζινόνη, δικλαζουρίλη, νιφουράδλη	1.4.2004 (*)
			Δαμάδια	4 μήνες	$0,5 \times 10^9$	1×10^9	Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμύγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη.	1.4.2004 (*)
12	<i>Lactobacillus farcininis</i> CNCM IMA 67/4R	Παρασκεύασμα <i>Lactobacillus farcininis</i> που περιέχει τουλάχιστον 1×10^6 CFU/g προσθετικού	Χοιρίδια	4 μήνες	1×10^9	1×10^{10}	Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμύγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη.	30.8.2004 (*)

Αριθμός Ε.Ε.	Προσθετικό	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη συγκέντρωση ντρώση	Μέγιστη συγκέντρωση ντρώση	Άλλες προνοιες	Λήξη της περιόδου έγκρισης
					Μονάδες δραστηριότητας ανά kg πλήρους ζωοτροφής			
13	Enterococcus faecium DSM 10 663 NCIMB 10 415	Παρασκευάσμα Enterococcus faecium που περιέχει τουλάχιστον: Σε μορφή σκόνης και κόκκων: $3,5 \times 10^{10}$ CFU/g προσθετικού Επικαλυμμένη μορφή: $2,0 \times 10^{10}$ CFU/g προσθετικού Υγρή μορφή: 1×10^{10} CFU/ml προσθετικού	Χοιρίδια	4 μήνες	1×10^9	1×10^{10}	Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του τροπύμματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη.	30.6.2004 (*)
			Δαμάδια	6 μήνες	1×10^9	1×10^{10}	Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του τροπύμματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη.	26.7.2004 (*)
			Κοτόπουλα παχυνόμενα	-	1×10^9	1×10^{10}	Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του τροπύμματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη. Δύνανται να χρησιμοποιηθεί σε σύνθετες ζωοτροφές που περιέχουν τα επιτρεπόμενα κοκκιδαστατικά: ντεκοκούλεϊτ, δικλαζουρίλη, αλαφουζινόνη, λασολασινικό νάτριο, μαντουραμικινικό αμμόνιο, μονενσινικό νάτριο, ναραζίνη, ρομπτενιδίνη, σαλινομυκινικό νάτριο	26.7.2004 (*)

Αριθμός Ε.Ε.	Προσθετικό	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη συγκέν- τρωση Μονάδες δραστηκότητας ανά kg πλήρους ζωοτροφής	Μέγιστη συγκέν- τρωση 1 x 10 ⁹	Άλλες προνοιες	Λήξη της περιόδου έγκρισης
			Γάλοι παχυνόμενοι		1 x 10 ⁷	1 x 10 ⁹	1. Στις οδηγίες χρήσεως της πρώτης ύλης και του προμείματος, να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης και η σταθερότητα έναντι σχηματισμού συσφαιρωμάτων. 2. Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται σε σύνθετες ζωοτροφές που περιέχουν τα επιτρεπόμενα κοκκιοδραστικά: amprolium- ethiopabai, diclazuril, halofuginone, lasalocid sodium, maduramicin ammonium, monensin sodium, robenidine	Από 18.10.2003 έως 18.10.2007

Αριθμός Ε.Ε.	Προσθετικό	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη συγκέν- τρωση		Μέγιστη συγκέν- τρωση	Άλλες προνοιες	Λήξη της περιόδου έγκρισης
					Μονάδες δραστηκότητας ανά kg πλήρους ζωοτροφής				
14	Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885	Παρασκευάσμα Saccharomyces cerevisiae που περιέχει τουλάχιστον: Σε μορφή σκόνης, σφαιρικών και ισοειδών κόκκων: 1 x 10 ⁹ CFU/g προσθετικού	Χοιρία	4 μήνες	3 x 10 ⁹	3 x 10 ⁹	3 x 10 ⁹	Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμύγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη.	30.6.2004 (*)
15	Enterococcus faecium NCIMB 11181	Παρασκευάσμα Enterococcus faecium που περιέχει τουλάχιστον: Μορφή σκόνης: 4 x 10 ¹¹ CFU/g προσθετικού Επικαλυμμένη μορφή: 5 x 10 ¹⁰ CFU/g προσθετικού	Βοειδή παχυνόμενα	-	9 x 10 ⁹	9 x 10 ⁹	9 x 10 ⁹	Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμύγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη. Η ποσότητα του Saccharomyces cerevisiae στο ημερήσιο σιτηρέσιο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 1,6 x 10 ¹⁰ CFU ανά 100 kg σωματικού βάρους. Για κάθε επιπλέον 100 kg προστίθενται 3,2 x 10 ⁹ CFU	30.6.2004 (*)
			Δαμάδια	6 μήνες	5 x 10 ⁹	2 x 10 ⁹	2 x 10 ⁹	Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμύγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη.	30.4.2004 (*)

Αριθμός Ε.Ε.	Προσθετικό	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη συγκέ- ντρωση Μονάδες δραστηριότητας ανά kg πλήρους ζωοτροφής	Μέγιστη συγκέ- ντρωση	Άλλες προνοίες	Λήξη της περιόδου έγκρισης
			Χοιρδία	4 μήνες	5×10^8	2×10^9	Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του τροφίμου πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη.	30.4.2004 (*)
16	Enterococcus faecium DSM 7134 Lactobacillus rhamnosus DSM 7133	Μίγμα από: Παρασκευάσματα Enterococcus faecium που περιέχει τουλάχιστον: 7×10^8 CFU/g μίγματος και Lactobacillus rhamnosus που περιέχει τουλάχιστον: 3×10^9 CFU/g μίγματος	Δαμάκια	6 μήνες	1×10^9	6×10^9	Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του τροφίμου πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη.	30.4.2004 (*)
			Χοιρδία	4 μήνες	1×10^9	5×10^9	Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του τροφίμου πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη.	30.4.2004 (*)
17	Lactobacillus casei NCIMB 30098 Enterococcus faecium NCIMB 30098	Μίγμα από: Lactobacillus casei και Enterococcus faecium που περιέχει τουλάχιστον: Lactobacillus casei 2×10^8 CFU/g μίγματος και Enterococcus faecium 6×10^9 CFU/g μίγματος	Δαμάκια	6 μήνες	Lactobacillus casei $0,5 \times 10^9$ Enterococcus faecium $1,5 \times 10^9$	Lactobacillus casei 1×10^9 Enterococcus faecium 3×10^9	Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του τροφίμου πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη.	30.4.2004 (*)

Αριθμός Ε.Ε.	Προσθετικό	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη συγκέ- ντρωση Μονάδες δραστηριότητας ανά kg πλήρους ζωοτροφής	Μέγιστη συγκέ- ντρωση	Άλλες προνοιες	Λήξη της περιόδου έγκρισης
18	Enterococcus faecium CECT 4515	Παρασκευάσμα Enterococcus faecium που περιέχει τουλάχιστον 1 x 10 ⁹ CFU/g παρασκευάσματος	Χοιρδία	4 μήνες	1 x 10 ⁹	1 x 10 ⁹	Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμύγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη.	1.4.2004 (*)
19	Streptococcus- infantarius CNCM I-841 Lactobacillus plantarum CNCM I-840	Μίγμα από: Streptococcus infantarius και Lactobacillus plantarum που περιέχει τουλάχιστον: Streptococcus-infantarius 0,5 x 10 ⁹ CFU/g μύγματος και Lactobacillus plantarum 2 x 10 ⁹ CFU/g μύγματος	Δαμάδια	6 μήνες	1 x 10 ⁹	1 x 10 ⁹	Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμύγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη.	1.4.2004 (*)
20	Bacillus licheniformis DSM 5749 Bacillus subtilis DSM 5750 [σε αναλογία 1/1]	Μίγμα Bacillus licheniformis και Bacillus subtilis που περιλαμβάνει ελάχιστη ποσότητα 3,2 x 10 ⁹ CFU/g προσθετικού (1,6 x 10 ⁹ CFU/g από κάθε βακτήριο)	Γουρούνες	15 ημέρες πιο του τοκετού και κατά την περίοδο γαλακτο- φορίας	0,96 x 10 ⁹	1,92 x 10 ⁹	Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμύγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη.	23.11.2004 (*)
			Χοίροι παχυνόμενοι	-	0,48 x 10 ⁹	1,28 x 10 ⁹	Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμύγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη.	23.11.2004 (*)

Αριθμός Ε.Ε.	Προσθετικό	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη συγκέ- ντρωση Μονάδες δραστηριότητας ανά kg πλήρους ζωοτροφής		Μέγιστη συγκέ- ντρωση Μονάδες δραστηριότητας ανά kg πλήρους ζωοτροφής	Άλλες προνοιες	Λήξη της περιόδου έγκρισης
			Κοτόπουλα παχυνόμενα	-	3,2 x 10 ⁹	3,2 x 10 ⁹	3,2 x 10 ⁹	Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμύγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμψηξη. Δύνανται να χρησιμοποιηθεί σε σύνθετες ζωοτροφές που περιέχουν τα επιτρεπόμενα κακιδόστατικά: δικλαζουρίλη, αλαφουζινόνη, μονενανικό νάτριο, ρομπενιδίνη και σαλινωμικινικό νάτριο	23.11.2004 (*)
			Γόλοι παχυνόμενοι	-	1,28 x 10 ⁹	3,2 x 10 ⁹	3,2 x 10 ⁹	Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμύγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμψηξη. Δύνανται να χρησιμοποιηθεί σε σύνθετες ζωοτροφές που περιέχουν τα επιτρεπόμενα κακιδόστατικά: δικλαζουρίλη, αλαφουζινόνη, μονενανικό νάτριο, νφουράβλη και ρομπενιδίνη	23.11.2004 (*)
			Δαμάδια	6 μήνες	1,28 x 10 ⁹	1,6 x 10 ⁹	1,6 x 10 ⁹	Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμύγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμψηξη.	28.2.2005 (*)

Αριθμός Ε.Ε.	Προσθετικό	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη συγκέ- ντρωση Μονάδες δραστηριότητας ανά kg πλήρους ζωοτροφής	Μέγιστη συγκέ- ντρωση ντρώσεως	Άλλες προνοιες	Λήξη της περιόδου έγκρισης
21	<i>Enterococcus faecium</i> DSM 3530	Παρασκεύασμα <i>Enterococcus faecium</i> που περιέχει τουλάχιστον:	Δαμάδια	6 μήνες	1×10^9	1×10^9	Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμύγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη.	28.2.2005 (*)
22	<i>Enterococcus faecium</i> DSM 7134	Παρασκεύασμα <i>Enterococcus faecium</i> το οποίο περιέχει τουλάχιστον: Σκόνη: 1×10^{10} CFU/g Κόκκοι (μικροενθυλακωμένοι): 1×10^{10} CFU/g πρόσθετης ώλης	Χοιρίδια		$0,5 \times 10^9$	4×10^9	Οι οδηγίες χρήσης πρέπει να δηλώνουν τη θερμοκρασία αποθήκευσης το χρόνο ζωής και τη σταθερότητα στη σύμπτυξη τόσο του προσθετικού όσο και του προμύγματος	15.4.2007
23	<i>Lactobacillus acidophilus</i> D2/CSL CECT4 529	Παρασκεύασμα <i>Lactobacillus acidophilus</i> το οποίο περιέχει τουλάχιστον: 50×10^9 CFU/g πρόσθετης ώλης	Χοίροι παχυνόμενοι Χοιρομήτρες		$0,2 \times 10^9$ $0,5 \times 10^9$	1×10^9 1×10^9	Χοιρομήτρες 25 ημέρες πριν τον τοκετό και κατά τον θηλασμό	14.12.2007
			Ωοτόκες ορνέθες	-	1×10^9	1×10^9	Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ώλης και του μύγματος πρέπει να αναφέρονται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη.	14.12.2007

(*) Πρώτη έγκριση με την οδηγία 97/72/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 351 της 23.12.1997, σ.55).

(*) Πρώτη έγκριση με την οδηγία 96/66/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 272 της 25.10.1996, σ.32).

(*) Πρώτη έγκριση με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2316/98 της Επιτροπής (ΕΕ L 289 της 28.10.1998, σ.4).

(*) Πρώτη έγκριση με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 639/1999 της Επιτροπής (ΕΕ L 82 της 26.3.1999, σ.6).

(*) Πρώτη έγκριση με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1245/1999 της Επιτροπής (ΕΕ L 150 της 17.6.1999, σ.15).

(*) Πρώτη έγκριση με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1436/98 της Επιτροπής (ΕΕ L 191 της 7.7.1998, σ.15).

(*) Πρώτη έγκριση με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 866/1999 της Επιτροπής (ΕΕ L 108 της 27.4.1999, σ.21).

(*) Πρώτη έγκριση με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1411/99 της Επιτροπής (ΕΕ L 164 της 30.6.1999, σ.56).

(*) Πρώτη έγκριση με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2374/98 της Επιτροπής (ΕΕ L 295 της 4.11.1998, σ.3).

(*) Πρώτη έγκριση με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1636/1999 της Επιτροπής (ΕΕ L 194 της 27.7.1999, σ.17).

- (¹) Πρώτη έγκριση με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2690/1999 της Επιτροπής (ΕΕ L 326 της 18.12.1999, σ.33).
- (²) Πρώτη έγκριση με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 654/2000 της Επιτροπής (ΕΕ L 79 της 30.3.2000, σ.26).
- (³) Πρώτη έγκριση με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1353/2000 της Επιτροπής (ΕΕ L 155 της 28.6.2000, σ.15).
- (⁴) Πρώτη έγκριση με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1887/2000 της Επιτροπής (ΕΕ L 227 της 7.9.2000, σ.13).
- (⁵) Πρώτη έγκριση με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2437/2000 της Επιτροπής (ΕΕ L 280 της 4.11.2000, σ.28).
- (⁶) Πρώτη έγκριση με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2697/2000 της Επιτροπής (ΕΕ L 319 της 16.12.2000, σ.1).
- (⁷) Πρώτη έγκριση με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 418/2001 της Επιτροπής (ΕΕ L 62 της 2.3.2001, σ.3).
- (⁸) Πρώτη έγκριση με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 937/2001 της Επιτροπής (ΕΕ L 130 της 12.5.2001, σ.25).
- (⁹) Πρώτη έγκριση με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1334/2001 της Επιτροπής (ΕΕ L 180 της 3.7.2001, σ.18).
- (¹⁰) Εφόσον δεν έχει καθοριστεί, σε περίπτωση που απαιτείται, ειδικό μέγιστο όριο με βάση επαρκή στοιχεία σχετικά με την παρουσία διοξινίων, θα ισχύσει, από 15 Αυγούστου 2000, το μέγιστο όριο των 500 pg WHO-PCDD/F-TEQ/kg.
- (¹¹) 1 FTY είναι η ποσότητα ενζύμου που ελευθερώνει 1 μικρογραμμομόριο ανόργανου φωσφορικού άλατος από φυτικό νάτριο ανά λεπτό σε pH 5,5 και 37°C.
- (¹²) 1 FTY είναι η ποσότητα ενζύμου που ελευθερώνει 1 μικρογραμμομόριο ανόργανου φωσφορικού άλατος από φυτικό νάτριο ανά λεπτό σε pH 5,5 και 37°C.
- (¹³) 1 GALU είναι η ποσότητα ενζύμου που υδrolύει 1 μικρογραμμομόριο p-νιτροφαινόλη-α-γλακτοπιρανοζίνη ανά λεπτό σε pH 5,5 και 37°C.
- (¹⁴) 1 FBG είναι η ποσότητα ενζύμου που ελευθερώνει 1 μικρογραμμομόριο αναγόντων σακχάρων (ισοδυνάμων γλυκόζης) από B-γλυκάνη κριθαριού ανά λεπτό σε pH 5,0 και 30°C.
- (¹⁵) 1 FXU είναι η ποσότητα ενζύμου που ελευθερώνει 7,8 μικρογραμμομόρια αναγόντων σακχάρων (ισοδυνάμων ξυλόζης) από αζω-αραβοξυλάνη σιταριού ανά λεπτό σε pH 6,0 και 50°C.
- (¹⁶) 1 FXU είναι η ποσότητα ενζύμου που ελευθερώνει 3,1 μικρογραμμομόρια αναγόντων σακχάρων (ισοδυνάμων ξυλόζης) από αζω-αραβοξυλάνη σιταριού ανά λεπτό σε pH 6,0 και 50°C.
- (¹⁷) 1 FXU είναι η ποσότητα ενζύμου που ελευθερώνει 0,15 μικρογραμμομόρια γλυκόζης από ξυλάνη ενωμένη με σταυροδεσμούς με αζουρίνη ανά λεπτό σε pH 5,0 και 40°C.
- (¹⁸) 1 BGU είναι η ποσότητα ενζύμου που ελευθερώνει 0,15 μικρογραμμομόρια γλυκόζης από B-γλυκάνη ενωμένη με σταυροδεσμούς με αζουρίνη ανά λεπτό σε pH 5,0 και 40°C.
- (¹⁹) 1 EXU είναι η ποσότητα ενζύμου που ελευθερώνει 1 μικρογραμμομόριο αναγόντων σακχάρων (ισοδυνάμων ξυλόζης) από αραβινοξυλάνη ανά λεπτό σε pH 3,5 και 55°C.
- (²⁰) 1 RAU είναι η ποσότητα του ενζύμου που μετατρέπει 1 μικρογραμμομόριο διαλυτού αμύλου σε προϊόν με απορρόφηση ίση με εκείνη μιας χρωστικής αναφοράς σε μήκος κύματος 620 nm μετά από αντίδραση με ιώδιο, ανά λεπτό σε pH 6,0 και 30°C.
- (²¹) 1 U είναι η ποσότητα του ενζύμου που απελευθερώνει 0,1 μικρογραμμομόριο γλυκόζης από καρβοξυμεθυλο-κυτταρίνη ανά λεπτό σε pH 5,0 και 40°C.
- (²²) 1 U είναι η ποσότητα του ενζύμου που απελευθερώνει 0,1 μικρογραμμομόριο γλυκόζης από B-γλυκάνη κριθαριού ανά λεπτό σε pH 5,0 και 40°C.
- (²³) 1 U είναι η ποσότητα του ενζύμου που απελευθερώνει 0,1 μικρογραμμομόριο γλυκόζης από ξυλάνη βρώμης (oat spelt) ανά λεπτό σε pH 5,0 και 40°C.
- (²⁴) 1 BGU είναι η ποσότητα ενζύμου που ελευθερώνει 0,278 μικρογραμμομόρια αναγόντων σακχάρων (ισοδυνάμων γλυκόζης) από B-γλυκάνη κριθαριού ανά λεπτό σε pH 3,5 και 40°C.
- (²⁵) 1 EXU είναι η ποσότητα ενζύμου που ελευθερώνει 1 μικρογραμμομόριο αναγόντων σακχάρων (ισοδυνάμων ξυλόζης) από αραβινοξυλάνη σιταριού ανά λεπτό σε pH 3,5 και 55°C.
- (²⁶) 1 U είναι η ποσότητα ενζύμου που ελευθερώνει 1 μικρογραμμομόριο γλυκόζης από ξυλάνη ξύλου σημύδας ανά λεπτό σε pH 5,3 και 50°C.
- (²⁷) 1 U είναι η ποσότητα ενζύμου που ελευθερώνει 1 μικρογραμμομόριο αναγόντων σακχάρων (ισοδυνάμων γλυκόζης) από B-γλυκάνη κριθαριού ανά λεπτό σε pH 5,0 και 30°C.

- [illegible]

- (³⁹) 1 U είναι η ποσότητα ενζύμου που ελευθερώνει 1 μικρογραμμομόριο αναγόντων σακχάρων (ισοδυνάμιον γλυκόζης) από ξυλάνη βρώμης ανά λεπτό σε pH 4,0 και 30°C.
- (⁴⁰) 1 U είναι η ποσότητα ενζύμου που ελευθερώνει 1 μικρογραμμομόριο αναγόντων σακχάρων (ισοδυνάμιον γλυκόζης) από άμυλο σίτου ανά λεπτό σε pH 4,0 και 30°C.
- (⁴¹) 1 U είναι η ποσότητα ενζύμου που ελευθερώνει 1 μικρογραμμομόριο φαινολικού σκευάσματος (ισοδύναμο τυροσίνης) από υπόστρωμα καζέινης ανά λεπτό σε pH 7,5 και 40°C.
- (⁴²) 1 U είναι η ποσότητα ενζύμου που υδρολύει 1 μικρογραμμομόριο γλυκοσιδικών δεσμών από αδιάλυτο στο νερό αμυλούχο σταυροπολυμερές ανά λεπτό σε pH 6,5 και 37°C.
- (⁴³) 1 U είναι η ποσότητα ενζύμου που ελευθερώνει 1 μικρογραμμομόριο ανάγοντος υλικού (ισοδυνάμιον ενύσεως του γαλακτουρονικού οξέος) από πολυ-Δ-γαλακτουρονικό υπόστρωμα ανά λεπτό σε pH 5,0 και 40°C.
- (⁴⁴) 1 KNU είναι η ποσότητα ενζύμου που ελευθερώνει 672 μικρογραμμομόρια αναγόντων σακχάρων (ισοδυνάμιον γλυκόζης) από διαλυτό άμυλο ανά λεπτό σε pH 5,6 και 37°C.
- (⁴⁵) 1 IU είναι η ποσότητα ενζύμου που ελευθερώνει 1 μικρογραμμομόριο αναγόντων σακχάρων (ισοδυνάμιον ξυλόζης) από ξυλάνη σημύδας ανά λεπτό σε pH 4,5 και 30°C.
- (⁴⁶) 1 U είναι η ποσότητα ενζύμου που ελευθερώνει 0,0056 μικρογραμμομόρια αναγόντων σακχάρων (ισοδυνάμιον γλυκόζης) από B-γλυκάνη κριθής ανά λεπτό σε pH 7,5 και 30°C.
- (⁴⁷) 1 U είναι η ποσότητα ενζύμου που ελευθερώνει 0,0056 μικρογραμμομόρια αναγόντων σακχάρων (ισοδυνάμιον γλυκόζης) από καρβοξυμεθυλο-κυτταρίνη ανά λεπτό σε pH 4,8 και 50°C.
- (⁴⁸) 1 U είναι η ποσότητα ενζύμου που υδρολύει 1 μικρογραμμομόριο γλυκόζης από αμυλούχο σταυροπολυμερές ανά λεπτό σε pH 7,5 και 37°C.
- (⁴⁸) 1 U είναι η ποσότητα ενζύμου που υδρολύει 1 μικρογραμμομόριο γλυκοσιδικών δεσμών από αδιάλυτο στο νερό αμυλούχο σταυροπολυμερές ανά λεπτό σε pH 7,5 και 37°C.
- (⁵⁰) 1 U είναι η ποσότητα ενζύμου που καθιστά 1 μικρογραμμομόριο αζωκαζέινης διαλυτό σε τριχλωροξικό οξύ ανά λεπτό υπό pH 7,5 και σε θερμοκρασία 37°C.
- (⁵¹) 1 U είναι η ποσότητα ενζύμου που ελευθερώνει 0,0067 μικρογραμμομόρια αναγωγικών σακχάρων (ισοδυνάμιον ξυλόζης) από ξυλάνη σημύδας ανά λεπτό υπό pH 5,3 και σε θερμοκρασία 50°C.

ΤΙΜΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ,
Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων
και Περιβάλλοντος.